Zool. 212-1

<36618545670016

<36618545670016

Bayer. Staatsbibliothek

Fol. 212 /a

Historia naturalis. Regnum animale.

Classis V. Insecta 361.

Zool: N° 259.

Zh: 6 ~~2107~~ 2722 2

ENTOMOLOGISCHE
BEYTRÄGE
ZU
DES RITTER LINNE'
ZWÖLFTEN AUSGABE
DES NATURSYSTEMS
VON

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE
Paſtor an der Kirche S. Blaſii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede
der Geſellſchaft Naturforſchender Freunde in Berlin, und
der Herzoglichen deutſchen Geſellſchaft
in Helmſtädt.

ERSTER THEIL.

Leipzig,
bey Weidmanns Erben und Reich. 1777.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

MEINEN FREUNDEN

dem königlich-dänischen Herrn Etaatsrath

HERRN

OTTO FRIEDRICH

MÜLLER

und

dem herzoglich-braunschweig-lüneburgischen

Leibarzt

HERRN

KARL GOTTLIEB

WAGLER

mit den wärmſten Empfindungen

Ihrer Verdienſte

VORREDE.

Ob ich zu viel gewagt habe, über des unsterblichen *Linné* Natursystem einige *entomologische Beyträge* herauszugeben, mag das Publikum entscheiden. Blos *Beyträge* nenn' ich sie, diese Zusätze, weil ich den ungeheuren Umfang dieses Feldes; weil ich die unendliche Menge aller über diesen Gegenstand sprechenden Urkunden; weil ich meine geringe Kenntnisse selbst verkennen müste, wenn ich ihnen einen andern Namen geben, oder eine Vollständigkeit beylegen wollte, die sie jezt nach Mafsgebung der Umstände noch nicht haben können. Denn je wei-

ter ich mich bisher in der Entomologie umfahe; desto mehr Verwirrung, desto mehr verfchiedene Namen eines und eben deffelben Gefchlechts, oder derfelben Art der Infekten fielen mir in die Augen. Dies brachte mich auf die Idée, alles zu fammlen, zu vergleichen, zu berichtigen, was über das *Linnéifche* Syftem einiges Licht verbreiten könnte, um, wo möglich, die noch herrfchenden Unrichtigkeiten einigermafsen in Ordnung zu bringen. Und das ift der Urfprung gegenwärtiger *Beyträge*. Belohnung genug für mich, wenn fie in der Wiffenfchaft, die in unfern Zeiten fo viele Liebhaber findet, einigen Nutzen ftiften follten!

Bey der Einrichtung des Werks hab' ich mir vorzüglich folgende Gefetze vorgefchrieben:

1. Von der Oekonomie der *Gefchlechter*, wo es mir nöthig fchien, einen kurzen, aber richtigen Begriff zu geben.

2. Bey

2. Bey jedem *Geſchlecht* ſowohl, als bey jeder *Art*, alle mir bekannte Schriftſteller, alte und neue, anzuführen, die das Inſekt entweder beſchrieben, oder abgebildet, oder beydes zugleich gethan haben. Die meiſten derſelben finden ſich im *Linné* gar nicht, und wo ich ja einige beybehalten habe, die der Ritter ſelbſt angeführet hat; ſo iſt es theils nur dann geſchehen, wenn ein ſolcher Schriftſteller dem Inſekt einen andern Namen gab, theils eine Unrichtigkeit zu bemerken, oder die vollſtändige Beſchreibung aus gedachtem Schriftſteller beyzufügen, wie ich denn die Genauigkeit und Richtigkeit der Beſchreibungen eines *Scopoli* in Entom. carn. und anno 5 hiſt. nat. bey der bündigſten Kürze, und des Herrn Staatsrath *Müllers* in Prodr. Zool. Dan. welches Werkchen ſich durch gleiche Vorzüge auszeichnet, nicht genug empfehlen kann.

3. Bey jeder Art, wo es nöthig und mir bekannt war, die *vorzüglichſte Merkwürdigkeit* anzugeben.

4. Alle mögliche *Synonymen* der Schriftſteller in allen Sprachen, die ich habe auffinden können, beyzufügen, um dadurch den Leſer in den Stand zu ſetzen, jedes Inſekt, wo er es in einem der angeführten Schriftſteller findet, bey Vergleichung dieſes Werkchens, ſogleich für das, was es iſt, zu erkennen. Ein Jeder kann ſich alſo hieraus belehren, ob er das Inſekt, was er näher zu kennen wünſcht, bey einem aus- oder vaterländiſchen Schriftſteller zu ſuchen habe. Wenigſtens wird jeder unpartheyiſche erkennen, wie viel der *zwölften Ausgabe des Linné*, bey allen ihren Verdienſten, in dieſem Fache bisher noch gefehlt habe, und wie viel, wenn wir das Ganze nehmen, meinen Beyträgen ſelbſt noch fehlen mögte. Indeſſen mögen andere urtheilen, ob meine Arbeit etwas mehr als bloſse Kompilation zu nennen ſey.

5. Hab'

5. Hab' ich jedes *Geſchlecht* mit einem anſehnlichen Verzeichniſs *neuer Arten*, aus den neueſten und berühmteſten entomologiſchen Schriftſtellern, einem *Voet*, *Drury*, *Pallas*, *Lepechin*, *Schaeffer*, *Müller*, *Sulzer*, *Degeer*, *Forſter*, u. ſ. w. bereichert, und ſolche nach der *Linnéiſchen Eintheilung* ſo zuſammengeordnet, daſs ſie der Leſer mit einem Blick überſehen kann, und nicht erſt nöthig hat, ſie in dieſen koſtbaren Werken mühſam aufzuſuchen, worinn ſie oft ſehr zerſtreuet anzutreffen ſind. Sollte ich einige nicht in die Klaſſe gebracht haben, worinn ſie nach anderer Meynung ſtehen müſſen; ſo bin ich ihres Karakters wegen zweifelhaft geweſen.

6. Werden meine Leſer ſelbſt ein Paar neue Geſchlechter finden, als Ligniperda und Ciſtela, die im *Linné* nicht ſtehen, weil mir die Gründe eines *Pallas*, *Scopoli*, *Schaeffer*, *Füeßlin* und *Müller* überwiegend ſchienen, ſie dafür aufzunehmen.

Ob ich

7. in Abſicht der *neuen Namen*, die ich einigen beyzulegen gewagt habe, glücklich geweſen bin, wird auf den Ausſpruch der Kenner ankommen. Wenigſtens hab' ich immer ſolche gewählt, die entweder den weſentlichen Karakter des Inſekts in ſich faſsten, oder doch die Namen des ſel. Prof. *Müllers*, die zum Theil ins Poſſierliche fallen, etwas geſetzter ausdrückten. Bey den *Ausländiſchen* hab' ich das Vaterland zugleich mit angeführt. Da auch in allen Geſchlechtern ſo viele mit einerley Namen vorkommen, als 2, 3, 4, punctatus, maculatus, puſtulatus, guttatus — ferner marginatus, marginalis, rufipes, ruficollis, ſanguinolentus, craſſipes, u. ſ. w. ſo war es nothwendig, die deutſchen Namen entweder durch das Vaterland, oder durch einen andern Karakter, noch genauer zu beſtimmen. Bey der Erfindung neuer Inſektennamen giebt es *zween*

Abwege:

Abwege: man fällt entweder ins Schwankende und Weitläuftige, oder ins Undeutliche und Poſſierliche. Mir ſelbſt kommen noch verſchiedene, die ich gewählt habe, ſteif und gezwungen vor; allein es war über meine Kräfte, beſſere, aber *zweckmäßige* zu finden. Ich bitte alſo alle, die mich tadeln werden, dieſen Verſuch erſt ſelbſt zu machen.

8. Bey jedem *Linnéiſchen* Inſekt hab' ich überdem bemerkt, ob es *abgebildet* ſey, oder nicht, und hinten am Ende jedes Geſchlechts allemal die Rekapitulation der *unabgebildeten* beygefügt, damit die Liebhaber wiſſen, welche noch abzubilden ſind, und andere abgehalten werden, ſchon abgebildete noch einmal ſtechen zu laſſen, welches Koſten macht, und keinen Nutzen hat. Es wäre überhaupt gut, wenn viele vaterländiſche Inſekten nicht eher abgebildet würden, bis man ihre ganze Geſchichte vollſtändig wüſte.

Indeſſen

Indeſſen iſts möglich, daſs einige von mir als *unabgebildet* angegebene, in einigen groſsen koſtbaren Werken, die ich noch nicht beſitze, abgebildet ſtehen können; allein meine Leſer werden dabey nicht viel verlieren, weil ſie darinn gemeiniglich, z. E. in dem *Edwardiſchen* und *Seligmanniſchen* Vögelwerken, blos im Bilde, ohne genaue Beſchreibung ſtehen, folglich bleibt es immer ſchwer zu beſtimmen, welcher Schmetterling, oder Käfer, oder anderes Inſekt eigentlich gemeynet ſey.

In eben dieſer Ordnung werden die *künftigen Bände* folgen. Wie viel es aber noch werden mögten, kann ich jezt ſelbſt nicht beſtimmen, da ich mich wundere, daſs dieſer erſte Band nur die Coleoptera begreift, und gleichwohl ſo ſtark angewachſen iſt. Beyträge von andern, Nachweiſungen der Schriften, die mir etwan entwiſcht ſeyn könnten, beſonders der neueſten Reiſebeſchrei-

ſchreibungen, Magazine und dergleichen, werden mir allezeit willkommen ſeyn. Denn ich ſehe es zum voraus, daſs ſich dieſe Beyträge, in unſern Zeiten, bey jeder Meſſe werden vermehren laſſen. Wenn ſich alſo Liebhaber dieſen erſten Band in zween Theile abſondern, und mit Papier durchſchieſsen lieſsen; ſo würden ſie auf die bequemſte Weiſe alles was in Zukunft herauskäme, beytragen können.

Druck und Papier machen dem Herrn Verleger Ehre. Inſonderheit hab' ich Urſache, die Genauigkeit der Korrektur zu rühmen, welche bey dieſer Art von Schriften nothwendig iſt. Doch wolle der geneigte Leſer zu Pag. 141. bey *Linn.* Dermeſtes Surinamenſis No. 29. noch hinzufügen:

Degeer Inſ. Tom. V. p. 54. No. 5. t. 13. f. 12. und das *unabgebildete* zurücknehmen,

Tenebrion de Surinam

TENEBRIO (Surinamenſis) *alatus*, elongatus, teſtaceo-fuſcus; *elytris* ſtriatis; *thorace* ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato.

Und pag. 151. **) unten ſtatt taotis *tactis*; pag. 161-163. aber ſtatt Altelabus allezeit *Attelabus* und pag. 189. *) ſtatt No. 40. — No. 53. leſen.

Den Namen des Herrn von *Geer* hab' ich in dem Werke ſelbſt *von Geer*, *de Geer*, *von Geeriſch*, unrecht geſchrieben, indem es *Degeer*, *Degeeriſch* heiſsen muſs, weil mir dieſer berühmte Naturforſcher ſelbſt gemeldet hat, daſs das *de* in ſeinem Namen nicht der Deutſchen *von* ſey; ſondern weſentlich zu demſelben gehöre.

Ein *Regiſter* hätte man bey dieſem Bande erwarten können; allein ich hab' es lieber bis zum Ende des ganzen Werks verſparen, und alsdann nach der Art, wie bey des ſel. *Müllers* Erklärung des Linnéiſchen Syſtems, einen *eigenen Regiſter-*

band

band über daſſelbe liefern wollen. Ein Entſchluſs, den meine Leſer, wie ich hoffe, nicht miſsbilligen werden. Hätt' ich jezt ſchon über dieſen erſten Band ein vollſtändiges Regiſter beygefügt; ſo würd' es zu ſtark geworden ſeyn, und den Band unverhältniſsmäſsig vergröſsert haben. Hätt' ich blos die Geſchlechter und Arten hingeſetzt; ſo war es kein Regiſter. Weit bequemer wird es ſeyn, in dem Hauptregiſter des ganzen Werks, als in jedem Regiſter einzelner Bände nachzuſchlagen.

Daſs das ganze Werk mit *lateiniſchen* Lettern gedruckt wird, geſchiehet um der *Einförmigkeit* willen, weil ich glaubte: es würde in meinem Vaterlande gemeinnütziger ſeyn, als wenn es ganz Lateiniſch geſchrieben wäre. Die deutſchen Namen hätt' ich denn doch müſſen mit lateiniſchen Lettern drucken laſſen.

Beym

Beym Schluſs iſt mir dies noch die angenehmſte Pflicht, einem *Martini* für ſeine gefällige Unterſtützung bey dieſer mühſamen Arbeit, öffentlich und freudig zu danken, und Ihm zur Ehre Gottes, zur Ehre der Natur, und zur Ehre der Freundſchaft, Leben und Geſundheit zu erbitten, in welchen gerechten Wunſch gewiſs tauſend Seufzer in Europa, und *andern Welttheilen* einſtimmen werden.

Vor der Oſtermeſſe
1777.

I. *Coleo-*

I. *Coleoptera.*

mit harten Flügeldecken.

Müllers Linn. Naturſyſt. 5. Th. 1. B. S. 45. mit *ganzen Deckſchilden*, oder *Flügeldecken.*

Sulzers abgekürzte Geſchichte der Inſ. S. 1. ff. *Flügeldecken.*

Schäffer von gehörnten Käfern 1758. S. 19.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 188.

Erxlebens Anfangsgr. der Naturgeſch. S. 254.

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhiſt. S. 89.

Eberhards Verſuch eines neuen Entw. der Thiergeſch. S. 192.

Wottoni libb. de different. animal. 1552. fol. 191 b. *Vaginipennia.*

Fabric. Syſt. Entomol. p. 1. *Eleuterata*, *Kiefermäuler.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 128.

Commentar. de rebus in Sc. natur. et Medic. geſtis Lipſ. Dec. I. P. V. p. 604. VIII. p. 688.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 48. *Inſectes à etuis. Coleoptéres.*

de *Geer* Inſect. Tom. IV. p. 1. Inſ. *à etuis écailleux.*

Mülleri (Otho Fridr.) Zool. Dan. Prodr. p. 52.

189. GESCHLECHT. *Scarabaeus.* Käfer.
griech. Cantharus, Byrrhus, Carabas.
engl. Chafre, Beetle.
französ. Escarbot, Scarabé.
span. Escarnaja.
ital. Scarafaggio, Scarafasso.
holl. Torren.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 1508. *Käfer.*

Börners Samml. aus der Naturgesch. 1. Th. S. 458. *Mistkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 195. *Maulwurfskäfer.*

Füesslins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 1. *Kolbenkäfer.*

Müllers Linn. Natursy. 5. Th. 1. B. S. 48. *Käfer.*

Bresl. Samml. 2. B. 1718. April. S. 965.

Schäffer von gehörnten Käfern 1758. S. 20. *Scherr-* oder *Scharrkäfer.*

Lessers Theologie der Ins. S. 70. 71.

Sulzers Kennz. S. 45. *Nashornkäfer; Maykäfer; Schröter; Goldkäfer; Iuniuskäfer; Mistkäfer.*

— — abgekürzte Gesch. der Ins. S. 14. *Erdkäfer.*

Swammerd. Bibel der Nat. S. 118. ff.

Catholicon E. p. 221. *Escarbot.*

Charlet. Onom. p. 45. the *Beetle or Bugg.*

Woyt. Gazoph. med. phys. p. 2024. *Scarabaeus.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 552. *Scarabaeus; Cantherius, Käfer, Keifer.*

Voet. Scar. p. 1. 2. 3. 35. *Scarab. Copris; Floricolae* s. Anthocanthari; *Arboricolae* s. Dendrocantharí; *Terricolae.*

Mus. Worm. p. 241. 242.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 901.

Listeri App. de Scarabaeis Britannicis. 4. Lond. 1710.

Jonston. hist. nat. de Inf. Franc. ad M. 1653. p. m. 90. sq.

Commentar. Lipf. Dec. I. P. IV. p. 218. V. 605.

Mouffet Theatr. Inf. p. 147. cap. 21. Graeci Καν-θαρον; Tyrrheni Βυρρον; Germani *Käfer;* Itali *Escarabago, Polotero;* Galli *Escarbot;* Poloni *Krowka;* Illyrici *Krabak; Angli Beetle* vel *Bugg;* Angli Boreales *Clock;* occidentales *Starkenbeken;* Arabes *Canafis* vel *Canafes* vocant.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 66-86. *Scarabaeus;* le *Scarabé;* p. 87-92. *Copris;* le *Bouſier.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. Mém. 6. p. 238-322. *Scarabés de terre:* des *arbres* (Hannetons); des *fleurs.* *)

I. *Thorace cornuto, mit gehörntem Bruſtſtück.*

1. Sc. *Hercules,* der *Herkuleskäfer.* **)

Müllers Linn. Naturſyſt. 5. Th. 1. B. S. 49. No. 1. t. 1. f. 1. das *groſse fliegende Einhorn.*

Fermins Beſchr. der Kolon. Surinam 2. Th. S. 285. die *groſse gehörnte Fliege.*

Röſels Inſectenbeluſt. 2. B. Vorb. S. 10. t. A. f. 1. der ſehr groſse indianiſche glänzende, ſchwarzbraune *Nashornkäfer, mit zweyen übereinander ſtehenden langen Hörnern.* ***)

*) Die *illuminirten* Exemplare von Käfern und andern Inſekten hat *Müller* hinten in ſeiner ausführlichen Erklärung des Linn. Naturſyſt. angeführt, wobey ich nur erinnere, daſs hier *Friſch* wohl hätte wegbleiben müſſen, weil meines Wiſſens von ihm keine illuminirte Figuren da ſind.

**) *Dieſer,* nebſt den folgenden *vier* Arten, hieſsen ſonſt überhaupt: *fliegende Stiere; fliegende Nashörner; fliegende Elephanten;* holländ. *Vliegend Eenhoorn.*

***) Der *Röſelſche* 4 B. t. 5. f. 3. iſt von dieſem unterſchieden, und eigentlich des *Marggravs* l. c. *Enena* ſ. *Taurus volans.* S. *Kleemans* Anm. in *Röſels* 2 B. Vorber. S. 18.

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 523. der *Einhornkäfer.*

Aubenton Miscell. t. 41. f. 2. *Rhinoceros* americanus cinereus.

Petiv. Gazophyl. t. 70. f. 1. *Rhinoceros* americanus cinereus, rostro nigro-nitente; The *Toddi-Fly*, die *Toddy-Fliege.*

Voet Scarab. ord. 1. gen. 1. *Terricolae* p. 23. No. 98. t. 12. f. 98. *Hercules; Haneton terrestre Hercule; Aardkever Hercules.*

Drury Ins. Tom. I. t. 30. f. 1. the *Beetle Hercules;* f. 2. *femina.*

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 304. No. 2. t. 18. f. 9. *Scarabé-Hercule.* *)

Sc. *scutellatus* niger, elytris griseis nigro-maculatis, thorace *incurvo cornu maximo*, subtus bidentato, capitis recurvato multidentato.

Marg. Bras. 247. f. 3. *Taurus volans* s. *Eruma.*

Fabric. Syst. Ent. p. 3. *Scar.* 1.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 919. das *grosse fliegende Einhorn.*

2. *Gideon*, der *Gideon.*

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 51. No. 2. t. 1. f. 2. das *kleine fliegende Einhorn.*

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 524. der *zweete Einhornkäfer.*

Röfels Insectenb. 2. B. Vorb. S. 19. t. A. f. 5. der etwas kleinere indianische *Nashornkäfer*, mit zween über einander stehenden gabelförmigen Hörnern. **)

Swam-

*) Der Herr von *Geer* hält den kastanienbraunen *Röfelschen* 2. B. Erdk. 1. Kl. t. A. für eine Varietär, und hat zu dem *Linneischen Röfels* 4. B. t. 5. f. 3 angeführt.

**) Herr *Kleemann* sagt daselbst in der Anm. es sey vielleicht Linnei *Simson* no. 4. allein in der 12ten Ausgabe hat der Ritter ausdrücklich den *Röfelschen* bey diesem seinem Gideon citirt.

Swammerd. B. der N. S. 143. t. 30. f. 2. die *erste Art ausländischer Nashornkäfer.*

Seligmanns ausl. Vög. Tom. 2. t. 79.

Fabric. Syst. entom. p. 4. *Scar.* 2.

Aubent. Miscell. t. 40. f. 3.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 917. das *kleine fliegende Einhorn.*

Drury Ins. I. p. 80. t. 36. f. 1.

Voet. Scar. ord. 1. gen. *Terric.* p. 24. No. 100. t. 12. f. 100. *Simson.* Thoracis et capitis cornu *bifido.*

3. *Actaeon, der fliegende Stier.*

Müller l. c. S. 51. No. 3. t. 1. f. 3.

Rösels 2. B. Vorb. S. 16. t. A. f. 2. der sehr grosse und mit drey Hörnern versehene *Nashornkäfer,* welcher sonst auch Taurus volans, oder der fliegende Stier genannt wird.

Swammerd. B. d. N. S. 143. t. 30. f. 4. die *dritte Art ausländischer Nashornkäfer.*

Neuer Schauplatz der Natur 1. B. S. 91. der *fliegende Stier,* Taurus volans; Scarabaeus Buceros, der *grosse Nashornkäfer mit drey Hörnern; der grosse Schröter.*

Neue berlin. Mannigf. 3. Iahrg. S. 345. der *fliegende Stier;* der *dreyhörnige Nashornkäfer.*

Aubent. Miscell. t. 15. fig. infer.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 78. No. 17.

Jonston hist. nat. Ins. p. m. 100. t. 16. f. 2. *Taurus volans Brasiliensis; Enena; Scarabaeus Platyceros.*

Charlet. Onom. The *Bull-Chafer,* der *Stierkäfer.*

Bomar. Dict. II. p. 469. XI. p. 186.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 902. der *grosse Nashornkäfer mit drey Hörnern.*

Catholic. E. p. 221. *L'éscarbot elephant.*
Fabric. S. E. p. 7. *Scar.* 14.
Seba Musſ. Tom. IV. t. 90. f. 3. 4. t. 91. f. 3.
Voet. Scarab. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 26. No. 111. t. 16. f. 111. Actaeon, *Mas.* f. 112. *Actaeona.* *)

4. *Simſon*, der *Simſonkäfer.*
Müller l. c. S. 52. No. 4.
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 941. der *kleine fliegende Stier.*
Sloan Iamaic. Tom. II. t. 237. f. 4. 5. Scar. *major niger tricornis.*
Brown Iam. p. 428. t. 43. f. 6. The *great brown Sawyer.*
Drury Inſ. I. t. 36. f. 3. 4.
Fabric. S. E. p. 7. *Scar.* 15.
Scutellatus, *thorace bicorni*, capitis cornu apice bifido, labio denticulato. **)

5. *Tityus*, der *kleine Herkules.*
Müller l. c. S. 53. No. 5. der *Einhornzwerg.*
Aubent. miſcell. I. t. 40. f. 2.
Onomat.

*) Obgleich Herr *Kleemann* in der Anm. in *Röſels* 2. B. Vorb. S. 16. ſagt: er habe noch zur Zeit im *Voetiſchen* Werk keine Abbildung von ihm geſehen; ſo kommt doch dieſer ſein Actaeon mit dem *Röſelſchen* Exemplar, die Farbe ausgenommen, ſehr genau überein.

**) Fabric. macht hierbey die gegründete Anmerkung: Synonyma a *Linnaeo* citata nullo modo huc pertinent, und obgleich *Drury* l. c. bey ſeinem Exemplare den *Sloan* und *Brown*, ſelbſt Linn. *Simſon* angeführet hat; ſo ſcheinen erſtere beyden Citata ebenfalls unrichtig zu ſeyn, und auf eine *gröſsere* Art von Käfer zu zielen, wie denn *Fabricius* aus dieſem *Druryſchen* p. 10. no. 27. eine *neue* Art gemacht hat, die er Sc. *Titanus* nennet. S. hinten unter den *neuen* Käfern *erſter* Klaſſe No. 28.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 945. der *Einhornzwerg.*

Fabric. S. E. p. 8. *Scar.* 18. *Scutellatus* glaucus, *thorace tricorni*, lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvo.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 24. No. 99. t. 12. f. 99. *Hercules minor;* le *petit Hercule; de kleine Hercules.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 306. No. 3. t. 18. f. 10. *Scarabé petit Hercule.* Scar. *scutellatus*, griseus, nigro-maculatus, capite vnicorni recurvato, *thorace tricorni* bicurvato.

6. *Atlas*, der *dreyhörnige Brustschildkäfer.*

Müller l. c. p. 53. No. 6. t. 1. f. 4. der *fliegende Elephant.*

Swammerd. B. d. N. S. 143. t. 30. f. 3. die *zwote Art ausländischer Nashornkäfer.*

Neuer Schauplatz der Natur 1. B. S. 427. *fliegender Elephant.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 906. der *fliegende Elephant.*

Catholicon A. p. 583. der *Käfer mit einem dreyhörnigen Bruststück.*

Fabric. S. E. p. 8. *Scar.* 20. *Scutellatus*, thorace *tricorni*, intermedio brevissimo, capitis cornu recurvo.

7. *Aloëus*, der *amerikanische Riese.*

Müller l. c. S. 54. No. 7. der *Riesenkäfer.*

Neuer Schaupl. der Nat. 1. B. S. 209. der *Aloëus.*

Rösels 2. B. Vorb. S. 20. t. A. f. 6. der *dreyfach gehörnte Käfer ohne Nashorn.*

Fabric. S. E. p. 9. *Scar.* 22.

Petiv. Gazoph. t. 24. f. 10. Nasicornis *Taurocerus* Marianus splendens castanei coloris.

Aubent. miſcell. t. 15. f. 1.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 904. der *groſse Käfer mit drey Hörnern auf der Bruſt ohne Nashorn.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 29. No. 122. t. 18. f. 122. *Aloë;* l'*Aloë;* de *Aloë.* *)

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 302. No. 1. *Scarabé Aloë.*

Scar. ſcutellatus niger, *thorace tricorni*, intermedio longiore recurvato.

8. *Moloſſus*, der *Dickkopf.*

Müller l. c. S. 54. No. 8. t. 2. f. 2. der *Doggenkäfer.*

Schröters Abhandl. über verſch. Gegenſt. der Naturgeſch. 1. Th. S. 356. t. 3. f. 3. *femina.* **)

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 931. der *Doggenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 24. *Scar.* 94.

Drury Inſ. I. t. 32. f. 2. *Mas.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 307. No. 4. t. 18. f. 11. *Scarabé Moloſſe.*

Scar. exſcutellatus, capitis clypeo lunato vnicorni, thorace retuſo *bidentato* vtrinque impreſſo, elytris laevibus.

9. *Typhoeus*, der *Dreyzack des Neptuns.* ***)

Müller l. c. S. 55. No. 9. t. 1. f. 5. der *kleine Stier.*

Friſch

*) Davon nach *Voets* Zeugniſs *viele Varietäten.*

**) Nach allen von dem Herrn Diak. *Schröter* angegebenen Merkmalen l. c. S. 358. hat das *Druryſche* Männchen keinen ſägeförmigen Kopf, und auf dem Kopfe ein Horn, folglich wäre ſein abgezeichneter Käfer mit ſägeförmigem Kopfe ohne Horn das *Weibchen* vom Linnäiſchen Scarabaeus Moloſſus.

***) Auch in der *Schweiz.* S. *Berneriſches Magazin* 1. Th. 1. St. S. 84.

Frisch Inſ. 4. Th. S. 16. t. 8. der *Miſtkäfer mit Schulterhörnern; Kothkäfer mit Schulterſpitzen.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 1. No. 1. der *Ochs.*

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 22. der *dreyzackige Buttelhornkäfer.*

Mouffet Theatr. Inſ. p. 152. f. 2. *Buceros; Tauroceros.*

Raj. Inſ. p. 103. *Scarabaeus ovinus* 2. *Willugby.*

Charlet. Onomaſt. p. 46. *Capricornus;* the *goad-Chafer.*

Schaeff. Icon. t. 26. f. 4.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 945. das *Stierlein.*

Fabric. S. E. p. 10. *Scar.* 26.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 29. No. 124. t. 19. f. 124. *Mas*, f. 125. *fem. Typhon.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 72. *Scar.* 4. t. 1. f. 3. Le *Phalangiſte.*

Niger, elytris ſtriatis, thorace antrorſum *tricorni.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 262. No. 6. t. 10. f. 5. *Scarabé Phalangiſte.*

Scar. ſcutellatus niger, elytris ſulcatis, thorace *cornubus tribus* incumbentibus.

10. *Lunaris*, der *Mondſchild;* holländ. *Kromme Hoorn Torr.*

Müller l. c. S. 56. No. 10. der *Zirkelkopf.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 1. No. 2. das *Einhorn.*

Frisch Inſ. 4. Th. S. 15. t. 7. der *Nashornkäfer der mittlern Art unter den ſchwarzen Miſtkäfern.*

Schaeffer von Zwief. und Käfern mit Hörnern 1758. S. 21. t. 3. f. 1. 2. 3. das *fliegende ſchwarze Nashorn.*

— Icon. t. 63. f. 2. 3.

Schaeffer Elem. t. 3. f. 2. t. 49. f. 3. t. 63. f. 2. 3. *Copris, Aftermaulwurfskäfer.*

Pontoppid. Naturgeſch. von Dännem. S. 197. No. 2.

Röſels 2. B. Vorb. S. 24. t. B. f. 2. der *kleine dunkelbraune Nashornkäfer mit zwo kleinen Schulterſpitzen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 480. *Copris.* Niger, thorace antice truncato, medio tuberculato, vtrinque *cornuto*, *cornu* acuto, vel *lunato*, elytris ſulcatis.

Pontopp. Atl. Dan. 1. 2.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 924. der *Käfer mit mondförmigem Kopfe.*

Petiv. Gazoph. Nat. et art. Decad. 1. t. 8. f. 4. *Rhinoceros* Luſitanus, niger ſplendens, vaginis ſtriatis.

Poda Muſ. graecenſ. p. 18. t. 1. f. 1. *Bifidus.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 39. No. 6. t. 23. f. 6. *Spinifer nigro colore; de zwarte Piekdrauger.*

Fabric. S. E. p. 22. *Scarab.* 86.

Raj. Inſ. p. 103. *Scarabaeus ovinus* 3. ſ. capite operculato *Willugby.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 88. *Copris* 1. Le *Bouſier capucin.*

Capitis clypeo *humulato*, margine elevato, corniculo denticulato.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 257. No. 2. *Scarabé lunaire.*

Exſcutellatus, fuſco-caſtaneus, thorace gibbo, elytris ſulcatis, capitis clypeo *lunato*, cornu erecto.

11. *Cylindricus*, der *Walzenkäfer.*

Müller l. c. S. 56. No. 11. der *Rundbauch.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. I. No. 3.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 912. der *cylindrische Käfer.*

Fabric. S. E. p. 12. *Scar.* 33.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 258. No. 3. t. 10. f. 2. *Scarabé cylindrique.*

Scutellatus cylindricus niger, capite *cornu* incurvato, *thorace* antice truncato *quinque dentato.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 448. *Scar. cylindricus.*

II. *Thorace inermi, capite cornuto.*

mit glattem oder unbewaffnetem Bruststück, aber gehörntem Kopfe.

12. *Bilobus*, der *getheilte Brustschild.* *)

Müller l. c. S. 56. No. 12. der *Lappenkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 908. der *gehörnte Käfer mit einer gedoppelten Hervorragung an der Brust.*

Aubent. Miscell. t. 15. f. 3.

Schaeff. Icon. t. 63. f. 2. 3.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 79. No. 18.

Thorax bifidus, aut *bicornis*, spatio inter cornua semicirculari.

Fabric. S. E. p. 6. *Scarab.* 9.

Scutellatus, thorace prominente *bilobo*, capitis *cornu simplici*, elytris sulcatis.

13. *Lancifer*, der *Pikenträger.*

Müller l. c. S. 57. No. 13. der *Spiessträger.*

Schrö-

*) *Linné* und *Scopoli* haben hierbey *Swammerd.* B. d. N. t. 30. f. 5. *vierte Sorte des Nasbornes* angeführet; *Fabricius* aber hat daraus p. 6. No. 10. eine eigene Art gemacht, die er *Jason* nennet. S. hinten unter den *neuen* Käfern der *ersten* Klasse N. 18.

Schröters Abhandl. 1. Th. S. 359. t. 3. f. 4. *)
Marggr. Brasil. p. 247. *Taurus.*
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 922. der *Spiessträger.*
Fabric. S. E. p. 24. *Scar.* 95.

Exscutellatus violaceus, *capite cornu angulato*, thorace dentato, elytris sulcatis.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 36. No. 1. t. 23. f. 1. **)

Lancifer violaceus; le *Bousier phalangiste violet; Violette Piekdraager.*

14. *Rhinoceros*, das *indianische Nashorn.*
Müller l. c. S. 57. No. 14. der *indianische Rhinoceroskäfer.*
Fermins Beschr. der Kol. Surin. 2. Th. S. 265. der *Nashornkäfer.*
Röfels 2. B. Vorb. S. 22. t. A. f. 7. Eine ausländische Art von *Nashornkäfern mit einem einzigen Horn.*
Bomar. Dict. des Anim. Tom. IV. p. 283. X. 34. 329. *Scarabé-Rhinoceros.*
Petiv. Gazoph. t. 44. f. 9. t. 100. f. 3. *Rhinoceros* Luconensis nigricans, capite vaginisque *punctulatis.*
Charlet. Onom. p. 46. The *Horn-nased Chafer.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 938. der *indianische Nashornkäfer.*
Barril. Icon. t. 163.
Fabric. S. E. p. 12. *Scar.* 34.

Voet.

*) Der vom *Schäffer* Elem. t. 49. wie Herr D. *Schröter* sagt, angeführte und *Copris* genannte *ähnliche* Käfer ist nicht dieser Lancifer; sondern f. 1. Linn. *Nuchicornis* No. 24. und f. 3. *Lunaris* No. 10.

**) Den Käfer t. 23. f. 2. nennet *Voet* Copris violaceus *major*, und hält ihn nicht mit dem ersten für einerley Art.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 28. No. 117. 118. t. 18. f. 117. 118.

Rhinoceros orientalis mas et femina; le *Rhinoceros mâle et femelle des Indes orientales;* de *oostindische Neushoorn.*

Catholicon E. p. 221. *Escarbot-mouche,* der *Fliegenkäfer.*

15. *Nasicornis*, das *europäische Nashorn.*

Müller l. c. S. 58. No. 15. der *europäische Nashornkäfer.*

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. I. No. 4. das *Nashorn.*

Rösels 2. B. S. 41. t. 6. 7. der *Nashornkäfer.*

Swammerd. B. der N. S. 26. t. 27. f. 1. 2. *Nashornkäfer.*

Pontoppid. N. G. v. D. S. 197. No. 1. das *Nasenhorn.* Dan. *Nasehornet.*

Frisch Ins. 3. Th. S. 6. t. 3. f. 1. *Nasenhornkäfer.*

Worm. Mus. p. 242. *Monoceros.*

Jonst. hist. nat. Ins. p. 93. 96. t. 15. f. 1. *Buceros.*

Imperat. hist. nat. p. m. 902. 924. 925. f. 1. 2. 3. Scar. *Rhinoceros.*

Poda Mus. graec. p. 17.

Onomatol. hist. nat. V. 6. p. 932. der *europäische Nashornkäfer.*

Drury Ins. Tom. I. t. 34. f. 7. 8.

Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 1. *Nasicornis.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 447. *Nasicornis;* Dan. *Naebe-Hornet.*

Fabric. S. E. p. 11. *Scar.* 29. Scutellatus, thorace prominentia *triplici*, capitis *cornu* recurvo, elytris *laevibus.*

Forster nov. sp. Ins. Cent. I. p. 1. No. 1. Scarab. *excavatus.* *)

Scutellatus, thorace inermi, retuso-excavato, capitis *cornu* incurvato compresso, elytris obsolete *punctato-striatis.*

Voet Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 28. 29. N. 120. 121. t. 18. f. 120. 121. *Rhinoceros vernaculus mas et femina;* le *Rhinoceros mâle et femelle* de *Hollande;* de *Neerlandsche Neushoorn.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 68. *Scar.* 1. Le *Moine.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 255. No. 1. *Scarabé-Nasicorne.*

Scutellatus, fusco-castaneus, elytris *laevibus*, thorace gibbo, capite *cornu* incurvato.

Catholicon E. p. 221. *Escarbot-licorne.*

16. *Carolinus*, das *Karolinische Nashorn.*

Müller l. c. S. 61. No. 16.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 911. der *Karolinische Nashornkäfer.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* t. 24. f. 14. **)

Fabric. S. E. p. 25. *Scar.* 97.

Exscutellatus, capitis *cornu* erecto *brevissimo*, clypeo integro, elytris sulcatis.

Drury Ins. Tom. I. t. 35. f. 2.

de

*) Ich zweifle aber, ob der *Forsterschc* excavatus eben dieser Nasicornis sey, da *Forster* ihn selbst davon unterscheidet: Magnitudo et statura fere ad *Nasicornem* accedit. Ferner sind die elytra nicht laevia, sondern punctato-striata; endlich habitat ad fretum Gaditanum. Indessen hat Fabric. den Forster hier bey Nasic. angeführt.

Auch in der *Schweiz.* S. *Bernerisches Magazin* 1. Th. 1. St. S. 82.

**) Dazu fehlt die Benennung und Beschreibung noch.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 309. No. 6. *Scarabé de la Caroline.* *)

Exſcutellatus niger, capite ovali *unituberculato*, thorace retuſo bituberculato vtrinque impreſſo, elytris ſulcatis.

17. *Mimas*, das *Kameel.*

Müller l. c. S. 62. No. 17. der *Buckelkäfer.*

Röſels 2. B. Erdk. 1. Kl. t. B. f. 1. der *grünglänzende höckrichte Käfer.*

Sulzers abgekürzte Geſch. der Inſ. S. 17. t. 1. f. 4. der *Buckelkäfer.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 930. der *Buckelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 25. *Scar.* 99.

Houltin hiſt. nat. *Bochel-Torr.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 38. No. 4. t. 23. f. 4. *Copris viridis ſplendens;* le *Bouſier verd luiſant; groenglanzige Meſtkever.*

18. *Sacer*, der *heilige Käfer.*

Müller l. c. S. 62. No. 18.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 249. der *ſogenannte heilige Käfer.*

Sulzers Geſch. der Inſ. S. 17. t. 1. f. 3. der *heilige Käfer.* **)

Loeſl.

*) Der Herr von *Geer* hat bey dieſem Carolin. des Drury t. 34. f. 1. 2. angeführt; allein dies iſt eine ganz andere Art, und ein wahrer Nashornkäfer mit langem Horn, woraus auch Fabric. p. 13. No. 37. eine eigene Art macht, und *Iamaicenſis* nennet. S. hinten die 2te Kl. *neuer* Käfer No. 11. Hingegen hat Drury bey t. 35. f. 2. ausdrücklich dieſen Linn. *Carolin.* angeführt, folglich iſt das *Geeriſche* Citatum unrichtig.

**) Daſelbſt ſtehet S. 17. bey dem *Männchen* t. 1. f. 2. und bey dem *Weibchen* f. 3. Ich finde aber nur von dem letzteren die Abbildung, weil f. 2. der Scar. *Goliathus* iſt.

Loefl. It. 20. Scarab. *pilularius* niger, clypeo antice *ſerrato* etc.

Osbeck It. 51. Scar. laevis, thorace inermi, capite ante *ſexdentato.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 939. der *heilige Käfer.*

Fabric. S. E. p. 28. *Scar.* 109.

19. *Didymus*, der *Zwilling.*

Müller l. c. S. 62. No. 19. der *Zwillingskäfer.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 913. der *Zwillingskäfer.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 80. No. 20.

Niger, elytris ſtriatis, caput parvum, *tribus corniculis.*

Drury Inſ. Tom. I. t. 32. f. 3.

Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 40.

20. *Valgus*, das *Sperrbein.*

Müller l. c. S. 63. No. 20. *Krummbein.*

Petiv. Gazoph. t. 27. f. 8. Scar. *Marianus.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 946. der *krummbeinige Käfer.*

Fabric. S. E. p. 24. No. 96. Scar. *Paniſcus.* Exſcutellatus, thorace retuſo elevato, *capitis cornu* recurvo, clypeo fiſſo.

21. *Hiſpanus*, der *ſchwarzglänzende ſpaniſche Nashornkäfer.* *)

Müller l. c. S. 63. No. 21.

Petiv. Gazoph. 13. t. 8. f. 4. *Rhinoceros* Luſitanicus niger ſplendens.

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 103.

22. *Car-*

*) Simillimus *Lunari*, ſagt *Linné*, ſed *maior*. Das iſt vermuthlich die Urſache, warum er bey *beyden Röſels* 2. B. Erdk. 1. Kl. t. B. f. 2. angeführet hat.

22. *Carnifex*, der *Scharfrichter.*

Müller l. c. S. 63. No. 21. t. 2. f. 1. der *Ballenwälzer.*

Rösels 2. B. Erdk. 1. Kl. t. B. f. 8. der *gold- und rothglänzende dreyfach gehörnte Käfer.* (Mas.)

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 910. der *amerikanische Ballenwälzer.*

Drury Ins. Tom. I. t. 35. f. 3. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 102.

Exscutellatus, thorace inermi angulato, *capiticornu* erecto, corpore aeneo.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 2. *Copris* p. 39. No. 5. 7. t. 23. f. 5. 7. *Refulgens Copris* (vulgo *verlakte*) *femina; Refulgens Copris Mas.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 315. No. 8. t. 18. f. 15. Scarabé *elegant.* (fem.) *)

23. *Granarius*, das *Weizenkorn.* **)

Müller l. c. S. 64. No. 23.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 918. das *Weizenkorn.*

Fabric. S. E. p. 16. *Scar.* 56.

24. *Nuchicornis*, das *kleine Nackenhorn.* ***) *Müll-*

*) Fabricius macht die Anmerkung: Synonyma pleraque a *Linnaeo* numerata, falsa. Der Herr von *Geer* l. c. beschreibt das *Weibchen*, wobey er Linn. Scar. *Festivus* No. 52. citirt. Mithin hat der Ritter aus beyden Geschlechtern *zwo Arten* gemacht. Carnifex ist das *Männchen* und Festivus das *Weibchen.*

**) Nirgends abgebildet.

***) *Linné* sagt von diesem Käfer: *Femina* tantum a tergo cornuta, *Mas* muticus; dieses haben *Müller* und *Fabricius* wiederholt; allein Herr *Kleemann* behauptet in seiner Anmerkung bey der *Rösel*schen Beschreibung dieses Käfers l. c. S. 17. 18. das Gegentheil;

Müller l. c. S. 65. No. 24. das *Nackenhorn.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 1. No. 5. das *Nackenhorn.*

Röſels 2. B. Vorb. S. 17. t. A. f. 4. der kleine okerbraune *Miſtkäfer* mit ſchwarz geſprengten Flügeln und kleinem *Kopfhorn.*

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 30. der *Hügelhornkäfer.*

Pontoppid. N. G. v. D. S. 197. No. 3. der *Frühjahrskäfer in Schweinsmiſt.*

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern 1758. t. 3. f. 9-14. das *fliegende Einhorn.*

— Elem. t. 49. f. 1. *Copris*, *Aftermaulwurfskäfer.*

— Icon. t. 73. f. 2-5. t. 96. f. 1.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 935. der *Käfer mit dem Horn im Nacken.*

Raj. Inſ. 103. No. 2. Scar. *ovinus* 3. capite operto.

Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 2.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 479. Niger, thorace rotundato, vtrinque *tuberculato*, elytris obſoleto fulvis, ſtriatis et maculatis.

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 104.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 89. *Copris* 3. (Mas.)

Le *petit bouſier noir cornu.*

Fuſco-niger, capite clypeato angulato, *pone cornuto*, elytris ferrugineo-nebuloſis, brevibus, ſtriatis.

No. 4. Le *petit Bouſier noir ſans cornes* (femina.)

Fuſco-

„Dieſer *gehörnte* kleine Käfer iſt männliches Geſchlechts; denn „das *Weibchen*, ſo dickbäuchig und von hellerer Farbe iſt, hat „kein Horn, ſondern nur zwey zugeſchärfte Erhebungen, die „queerüber um den Kopfſchild laufen.“

Eine Erfahrung, die der Herr D. *Schäffer* l. c. S. 35. auch beſtätiget hat.

Fusco-niger, capite clypeato angulato, *non cornuto*, elytris brevibus striatis.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 265. No. 9. *Scarabé à nuque épineuse.*

Exscutellatus ater, corpore ovato brevi, elytris griseis nigro-maculatis, *occipite maris spina armato.*

25. *Vacca*, das *Kühlein.*

Müller l. c. S. 65. No. 25.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 1. No. 6. *Kühlein.*

Schröters Abhandl. 1. Th. S. 362. t. 3. f. 5. *)

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 946. das *Kühlein.*

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 101.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 90. *Copris* 5. Le *Bousier à deux cornes.*

Obscure aeneus; capite pone *bicorni*, *thorace* antice prominente; *elytris* rufis nigro-maculatis.

26. *Taurus*, das *Oechslein.*

Müller l. c. S. 65. No. 26.

Füesslins Verz. S. 1. No. 7. das *Oechslein.*

Sulzers Gesch. S. 17. t. 1. f. 5. das *Oechslein.*

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern. 1758. S. 21. t. 3. f. 7. 8. der *fliegende Ochse.*

- - Icon. t. 63. f. 4.

Schreb. Ins. I. f. 6. 7. Scar. *Taurus.*

Raj. Ins. 103. Scar. *Ovinus* 3.

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 944. das *Oechslein.*

Scop. Entom. carn. No. 25. Scar. *Illyricus.*

Fabric. S. E. p. 26. *Scar.* 100.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 92. *Copris* 10. Le *Bousier à cornes retroussées.*

*) Dass der vom Herrn D. *Schröter* angeführte *Schäfferische* Käfer Elem. t. 49. f. 1. *Nuchicornis* L. sey, bezeuget de *Geer* Tom. 4. p. 265. No. 9. der Schröterische ist übrigens aus *Surinam.*

Niger, capite pone *bicorni*, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace vtrinque sinuato.

27. *Bison*, der *Bison.* *)

Müller l. c. S. 66. No. 27.

Neuer Schaupl. der N. 1. B. S. 1032. der *Büffelkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 908. der *Büffelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 23. *Scar.* 91.

28. *Subterraneus*, der *Minirer.*

Müller l. c. S. 66. No. 28. *Erdwühler.*

Füesslins Verz. S. 1. No. 8. der *Erdwühler.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Erdwühler.*

Fabric. S. E. p. 14. *Scar.* 46.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 267. No. 12. *Scarabé souterrain.*

Exscutellatus oblongus niger totus, capite *tuberculis tribus*, elytris profunde sulcatis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 54. *Copris.*

29. *Erraticus*, der *Schwärmer.*

Müller l. c. S. 66. No. 29. der *Streifer.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 914. der *herumziehende Käfer.*

Fabric. S. E. p. 16. *Scar.* 53.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 270. No. 15. *Scarabé errant.*

Scutellatus niger, elytris testaceis substriatis, *capite tuberculo vnico*, antennis nigris.

Schaeff. Icon. t. 26. f. 9.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 452.

30. *Man-*

*) Nirgends abgebildet.

30. *Maurus*, der *afrikanische länglichte Käfer mit drey Kopfspitzen.* *)

Müller l. c. S. 67. No. 30. der *Afrikaner.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 925. der *afrikanische Käfer.*

Fabric. S. E. p. 15. *Scar.* 49.

31. *Fossor*, der *Gräber.*

Müller l. c. S. 67. No. 31.

Füesslins Verz. S. 1. No. 9. der *Gräber.*

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 32.

Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 4. B. S. 266. No. 2.

Pontopp. N. G. von D. S. 198. No. 6.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 961. der *schwarze Dunggräber.* P. 6. p. 917.

Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 3.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 451. Niger, thorace convexo; capite *tuberculis tribus*; elytris striatis.

Fabric. S. E. p. 14. *Scar.* 47.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 82. *Scar.* 20. La *tête armée.*

Totus niger, *spinulis tribus* capitis transversim positis.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 264. No. 8. t. 10. f. 7. *Scarabé fossoyeur.*

Scutellatus oblongus ater, capite magno, *tuberculis tribus.*

32. *Fimetarius*, der *Mistkäfer.*

Müller l. c. S. 67. No. 32.

Füesslins Verz. S. 1. No. 10. *Mistkolbenkäfer.*

*) Nicht abgebildet.

Röſels 2. B. Vorb. S. 17. t. A. f. 3. der kleinere *Miſtkäfer* mit den rothen Flügeldecken und blauglänzendem Bruſtſtück.

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 33.

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern 1758. t. 3. f. 16-19. das *ſtumpfe Dreyhorn.*

— Icon. t. 26. f 9. t. 144. f. 6. 8.

Friſch Inſ. 4. Th. S. 35. t. 19. f. 3. 4. der *Miſtkäfer* der mittlern Gröſse mit rothen Flügeln und ſchwarzem Halsſchild.

Olaffs Reiſe durch Island 1. Th. S. 320.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 916. der kleine rothe *Miſtkäfer* mit ſchwarzem Kopfe und Bruſt.

Poda Muſ. graecenſ. p. 18.

Raj. Inſ. 106. No. 9. Scar. *pillularius* 9.

Fabric. S. E. p. 15. *Scar.* 51.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 87. *Scar.* 18. Le *Scarabé bedeau.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 266. No. 10. t. 10. f. 8. *Scarabé bedeau.*

Scar. *(pedellus)* ſcutellatus oblongus niger; *elytris* ſulcatis rubris; *thorace* antice maculis binis rufis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 454. Niger, *thorace* inermi; *capite tuberculo triplici*, antennis elytrisque rubris.

B. Scar. *fimetarius griſeus*, der *Eſel.*

Raj. Inſ. p. 106. Scar. *pillularis* 10.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 470. Scar. *teſſellatus* niger, elytris lividis ſtriatis *nigro-teſſulatis.*

Schaeff. Icon. t. 26. f. 8.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 82. *Scar.* 19. Le *Scarabé gris des bouzes.*

de

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 267. No. 11. t. 10. f. 10.
11. *Scarabé gris du fumier.*

Scutellatus oblongus niger; *pedibus* fuſcis, *capite* laevi; *elytris* griſeis, *maculis linearibus nigris.*

33. *Haemorrhoidalis*, der *Rothafter.**)
Müller l. c. S. 68. No. 33. der *Rotharſch.*
Füeſslins Verz. S. 2. No. 11. *Rotharſch.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 918. der *Rotharſch.*
Fabric. S. E. p. 16. Scar. *Granarius* B. 56.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 449.

Niger, thorace inermi, *capite tuberculo triplici*; elytris punctato-ſtriatis, poſtice pedibusque rufis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 271. No. 17. *Scarabé hemorrhoidal.*

Scutellatus niger, *elytris profunde ſulcatis*, apice rufis.

34. *Conſpurcatus*, der *Schmutzkäfer.*
Müller l. c. S. 68. No. 34. der *Dreckkäfer.*
Füeſslins Verz. S. 2. No. 12.
Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 9. t. 16. f. 1. 2.
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 912. der *beſpritzte Käfer.*
Schaeff. Icon. t. 26. f. 8. **)
Fabric. S. E. p. 16. *Scar.* 54.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 453.

Niger, capite *tuberculo triplici* obſoleto; *elytris* ſtriatis lividis macula diſci obſcura; marginibus thoracis pedibusque pallidis.

*) Nirgends abgebildet.

**) Das Schäfferſche Citatum, ſo *Füeſslin* und Prof. *Müller* zu dieſem Conſpurcatus geſetzet haben, hat der Herr Staatsrath *Müller*, vielleicht richtiger, bey Linn. *fimetar.* B, oder *teſſulatus* angeführet.

Pontopp. Atl. Dan. 1. t. 82.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 268. No. 13. *Scarabé barbouillé.*

Scutellatus *nigro-fuscus*, thoracis margine fulvo, elytris ſtriatis fulvis, maculis binis nigris, antennis rufis.

35. *Marianus*, der *maryländiſche Grünſchiller.* *)
Müller l. c. S. 68. No. 35. der *karoliniſche Käfer.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 925. der *maryländiſche Käfer.*
Fabric. S. E. p. 16. *Scar.* 57.

III. *Mutici capite, et thorace inermi.*

Ungehörnte Käfer.

36. *Gigas*, der *ägyptiſche Rieſe.* **)

Müller l. c, S. 69. No. 36. der *Goliath.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 918. der *Rieſenkäfer.*

37. *Scaber*, der *Hökerſchild.* ***)

Müller l. c. S. 69. No. 37. der *Rauchſchild.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 940. der *rauhe Käfer.*
Fabric. S. E. p. 17. *Scar.* 58. Scutellatus, *clypei centro prominulo*, elytris antice ſcabris.

38. *Laticollis*, der *Breithals.* †)

Müller

*) Nirgends abgebildet: es müſte denn das *Weibchen* des Hercules ſeyn.
**) Nicht abgebildet.
***) Nicht abgebildet.
†) Nicht abgebildet.

Müller l. c. S. 69. No. 38.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 922. der *breitschultrichte Käfer.*
Raj. Ins. 105. Scar. *pillularis* 4.
Fabric. S. E. p. 28. *Scar.* 110.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 89. *Copris* 2. Le *Hottentot.*
Niger, *capite clypeato*, margine serrato; *thorace* lato laevi, *elytris* striatis.

39. *Longimanus*, das *Langbein.*
Müller l. c. S. 70. No. 39. t. 2. f. 3. der *Langarm.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 923. der *langarmige Käfer.*
Aubent. Miscell. t. 41. f. 1.
Fabric. S. E. p. 17. *Scar.* 59.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. classi. 2. *Arboricolae: Dendrocanthari* p. 23. No. 97. t. 11. f. 97. *Longimanus*; le *longue-main*; de *Langhand.*

40. *Pilularius*, der *Pillenkäfer.**)
Müller l. c. S. 70. No. 40.
Fermins Beschr. der Kol. Sur. 2. Th. S. 267. der *Ross*-oder *Mistkäfer.*
Krünitz œkon. Encyklop. 1. Th. S. 645. *Rosskäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 936. der *Ballenwälzer.*
Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 118.
Plinii Hist. nat. Lib. XI. c. 34.
Drury Ins. Tom. I. t. 35. f. 7.

*) Dieser Käfer wird oft mit dem bekannten *Rosskäfer*, der auch Mistpillen macht, No. 42. verwechselt, ohnerachtet jener ein gut Theil kleiner, und bey uns nicht einheimisch ist.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 311. No. 7. t. 18. f. 14. *Scarabé pilulaire.*

Exſcutellatus niger glaber, capite magno depreſſo, thorace poſtice rotundato.

Forſteri Inſ. nov. ſp. Cent. I. p. 3. No. 3. *Hudſonias.*

Exſcutellatus muticus *ater*, thorace convexo lunato, clypeo rotundato, emarginato, elytris poſtice emarginatis, femoribus poſticis elongatis.

41. *Schaefferi*, der *Schäfferkäfer.*

Müller l. c. S. 71. No. 41.

Füeſslins Verz. S. 2. No. 13. *Schäffers Kolbenkäfer.*

Schäffers Zwief. und Käfer mit Hörnern 1758. S. 36. t. 3. f. 20. das *Langbein;* der *Stelzenkäfer.*

— Icon. t. 3. f. 8.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 262. f.) der *Schäfferiſche Käfer.*

Scop. Ent. carn. No. 24. *Longipes*, der *Langfuſs.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 940. der *Schäfferiſche Käfer.*

Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 117.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 92. *Copris* 9. Le *Bouſier araignée*, der *Spinnenförmige Miſtkäfer.*

Niger, *pedibus longis*, femorum poſteriori baſi denticulata, elytris poſtice gibbis.

42. *Stercorarius*, der *deutſche ſtahlblaue Roſs- oder Miſtkäfer.* *)

ſchwed.

*) Im *Linneiſchen* Citato: *Friſch* Inſ. 4. t. 13. f. 6. iſt eine Unrichtigkeit, und muſs heiſsen: *Friſch* Inſ. 4. p. 13. t. 6. f. 3.

Die *Larve* dieſes Käfers nennen die Norweger *Muldoxe*, oder *Erdochſe.*

Er

schwed. Torndyfwel; *holl.* Mest-Torr; *Smoland.* Torbagge; *Engl.* Dungbeetle; Scharnbugg. (*Provinz.* Pferdwurm.)

Müller l. c. S. 71. No. 42. der *Stinkkäfer.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 15. der *Dreckkolbenkäfer.*

Pontoppid. N. G. v. D. S. 198. No. 10. *Torbisk, Skarnbasse: Jütl. Scanböddel.*

— *Natürl. Hist. von Norw.* 2. Th. S. 78.

Frisch Ins. IV. Th. S. 13. t. 6. f. 3. der *grosse schwarze Mistkäfer, Rosskäfer.*

Bresl. Samml. 1718. Apr. Cl. 4. Art. 2. 1719. Novemb. Cl. 4. Art. 8. p. 591-593.

Taube N. G. von Zelle 2. Th. S. 262. der *schwarze Rosskäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 90. der *schwarze Mistkäfer.*

Raj. Ins. p. 74. No. 1. Scar. magnus niger *vulgatissimus.*

Lister Scar. angl. p. 380. No. 4. Scar. magnus, e purpura niger, tibiis omnium pedum *serratis (Sägefuss.)*

Poda Mus. graecens. p. 18.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 942. der *Dreckwälzer; Rosskäfer.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 553. Scar. *pilularius;* Κοπρεὼν; *Hippocr.* Καν θαρος; *Aldrov.* Scar. *stercorum;* Ηλιοκάνθαρος, Scar. *solaris (Sonnenkäfer, Pferdkäfer, Rosskäfer.)*

Schaeff. Icon. t. 23. (33.) f. 9.

Fabric. S. E. p. 17. *Scar.* 60.

Merret pin. p. 201. Scar. *fimanus.*

Mülleri

Er wird von vielen Schriftstellern Pilularius, der *Pillen*-der *gemeine Mistkäfer* genennet.

Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 5.

— Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 458. 'Ater, subtus *violaceus*, elytris sulcatis; capitis *clypeo duplicato*; vertice prominulo.

Dan. Torbist, Skarn-Basse; Skarn-Boddel. *Norv.* Tordival.

Catholicon E. p. 221. *Escarbot commun.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 31. No. 134. t. 20. f. 134. Scar. *fimosus costatus*; le *fouille-merde à stries*; de *geribde Drekkever.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 75. *Scar.* 9. Le *grand pillulaire.*

Charlet. Onomast. 46.

Drury Ins. Tom. I. pref. VIII. The common bleue *Dung-Beetle; Scarabé bleu commun.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 259. No. 4. t. 9. f. 10. 11. *Scarabé fouille-merde.*

Scutellatus supra niger, subtus violaceus, elytris sulcatis, antennis rufis, *capite tuberculato.*

43. *Vernalis*, der *kleine blauliche Frühlings-Mistkäfer.*

Müller l. c. S. 72. No. 43. der *Frühkäfer.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 16.

Sulzers Gesch. S. 17. t. 1. f. 6. der *Frühlingskäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 11. *Jütl. Skälbasse.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 947. der *Frühlingskäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 27. *Vernalis.*

Caput *pentagonum*, plica media longitudinali; elytra laevia. Supra virens, nitens, subtus violaceus, femoribus virescentibus.

Poda Mus. graecens. p. 19.

Fabric. S. E. p. 17. *Scar.* 61.

Mülleri

Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 6.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 459.

Violaceus; *elytris* laevissimis; *capitis* clypeo duplicato; *vertice* prominulo. Dan. *Skalle-Basse.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 31. No. 135. t. 20. f. 135. *Scarabaeus fimosus glaber; fouille-merde lisse*; de *gladde Drekkever.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 77. *Scar.* 10. Le *petit pillulaire.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 262. No. 5. t. 10. f. 4. *Scarabé printanier.*

Scutellatus violaceus totus; elytris glabris laevissimis; antennis nigris, capite *tuberculato.*

44. *Calcaratus*, der *ägyptische Spornträger.* *)

Müller l. c. S. 73. No. 44.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 909. der *Spornträger.*

45. *Schreberi*, *Schrebers Käfer.*

Müller l. c. S. 73. No. 45.

Füesslins Verz. S. 2. No. 17. *Schrebers Kolbenkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 940. der *Schreberische Käfer.*

Schaeff. Icon. t. 73. f. 6.

Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 120.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 91. *Copris* 7. Le *Bousier à points rouges. (der rothpunktirte Mistkäfer.)*

Niger, nitidus; *thorace* antice *gibbo* duplici; *elytro* singulo *macula duplici rubra.*

46. *Ovatus*, der *eyrunde Mistkäfer.* **)

Mül-

*) Nirgends abgebildet.

**) Nirgends abgebildet.

Müller l. c. S. 73. No. 46. der *Eyerkäfer.*
Fueſslins Verz. S. 2. No. 18.
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 935. der *eyförmige Käfer.*
Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 124.

47. *Amazonus*, der *Surinamiſche Miſtkäfer.*
Müller l. c. S. 74. No. 47. der *Amazon.*
Neuer Schauplatz der Nat. 1. B. S. 237. der *Amazonenkäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 905. der *Amazonenkäfer.*
Drury Inſ. Tom. I. t. 36. f. 6. *)

48. *Sabuloſus*, der *Sandgräber.*
Müller l. c. S. 74. No. 48. der *Sandkäfer.*
Fueſslins Verz. S. 2. No. 19. der *Sandwühler.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 939. der *Sandkäfer.*
Scop. Entom. carn. No. 23. Scar. *rugoſus*, der *Runzelkäfer.*
Caput *rugis duabus* transverſis; totus niger, ſubtus lucidior; *capite* antice rotundato; *thorace* laevi punctulato; *elytris* punctatis, ſtriisque 7 punctatis.
Poda Muſ. graecenſ. p. 20.
Müllleri Faun. Fridr. p. 1. No. 7.
— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 461.
Niger, thorace inaequali; *elytris rugoſis*, ſtriis quatuor elevatis.
Fabric. S. E. p. 31. *Trox* 1. Thorace, elytrisque *rugoſis*, thorace integerrimo.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 269. No. 14. t. 10. f. 12. Scarabaeus *femoratus (der Hüftenkäfer.)* Scarabé *à larges cuiſſes.*
Scutel-

*) Eine Varietät von dieſem.

Scutellatus niger, corpore ovato, elytris *rugosis* futuris quatuor, *femoribus* anticis maximis.

49. *Chrysis*, der *westindische Goldkäfer.*

Müller l. c. S. 74. No. 49.
Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 10. der *Chrysolith.*
Neue berlin. Mannigf. 3. Iahrg. S. 345. der *goldene Maykäfer.*
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 912. der *westindische Goldkäfer.*
Fabric. S. E. p. 44. *Cetonia* 8.
Scutello elytris dimidio breviore, *sterno* porrecto, corpore viridi.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Dendric.* p. 17. No. 63. t. 8. f. 63. *Murrinus viridis;* la *Porcellaine verde;* de *greene Porcellaine.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 319. No. 12. t. 19. f. 4. Scarabé *Chrysis.*
Scutello longissimo, *corpore* ovato convexo, supra viridi-nitente, infra viridi-aeneo, *pectore* porrecto.

50. *Surinamus*, die *Surinamische Gelblinie.* *)

Müller l. c. S. 75. No. 50. der *Surinamer.*
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 337.
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Surinamische Käfer.*

51. *Ni-*

*) Da Linné nicht gemeldet hat, ob es ein Mist- oder Baumkäfer sey, so vermuthe ich fast: es sey des *Voets* Scarabaeus *sinosus Surinamensis.*

Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 32. No. 140. t. 21. f. 140.
le *fouille-merde de Surinam;* de *Surinaamse Drekkever.*
Linné gedenkt zwar gelber Linien; aber *Voet* sagt: es gebe davon sehr viele Varietäten.

51. *Nitidus*, der *ausländische grüne Glanzkäfer.*
Müller l. c. S. 75. No. 51. der *grüne Käfer.*
Rösels 2. B. Vorb. S. 27. t. B. f. 4. der *schöne mattgrüne Käfer mit einer oraniengelben Einfassung.* *)
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 934. der *Sammetkäfer.*
Fabric. S. E. p. 44. *Cetonia* 7.
Thorace postice lobato, capite *spina* recumbente, sterno cornuto.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 8. No. 23. t. 3. f. 23. *Flagranticeps;* la *tête luisante;* de *Glanskop.* (Glanzkopf.)
Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 5. 6.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 322. No. 16. t. 19. f. 8. 9. Scarabé *luisant.*
Scutello minimo, viridis obscurus, thorace angulato elytrisque flavo-marginatis, capite *spina* recumbente.

52. *Festivus*, der *Staatskäfer.* **)
Müller l. c. S. 75. No. 52.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 915. der *zierliche Käfer.*
Fabric. S. E. p. 28. *Scar.* 111.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 315. No. 8. t. 18. f. 15. *Scarabé elegant.*
Exscutellatus, capite *lunato* nigro, thorace convexo *rubro*, maculis nigris, elytris *rubro aeneis* sulcatis.
Voet. Tab. 23. f. 5.

53. *Lineola*, der *lineirte Käfer.*

Müller

*) Der *Drurysche* f. 5. entspricht dem *Röselschen* vollkommen; bey dem *Voetschen* aber finde ich die gelbe Randlinie nicht, ob ihn gleich der Herr von *Geer* bey diesem Nitidus L. angeführet hat.

**) Das Weibchen zu Linn. *Carnifex* No. 22.

Müller l. c. S. 76. No. 53. der *Strichkäfer.*

Röſels 2. B. Vorb. S. 28. t. B. f. 7. der *kleine ſchwarz-glänzende glatte braune Käfer mit okerbraunen Auszierungen.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 923. der *ſchwarze Käfer mit gelben Rückenſtrich.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 76. No. 13. *Lucanus ſulcatus*, et p. 82. No. 24 Scarab. *lineola.*

Gronov. Gazoph. p. 145. No. 435.

Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 17.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 320. No. 13. t. 19. f. 5. *Scarabé à ligne jaune. (Gelblinie.)*

Scutellatus niger nitidus flavo-maculatus, capite thoraceque *linea flava*, thoracis margine *flavo.*

54. *Stictícus*, der *Punktkäfer.* *)

Müller l. c. S. 76. No. 54.

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 943. der *weiſsgeſprenkelte Käfer.*

Raj. Inſ. p. 104. No. 8.

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 37. Clypeo emarginato, *nigra albo-maculata*, abdomine ſubtus punctis quatuor albis.

55. *Sepicola*, der *indianiſche Zaunkäfer.* **)

Müller l. c. S. 77. No. 55. der *Zaunkäfer.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 941. der *Zaun-* oder *Heckenkäfer.*

56. *Sy-*

*) Eine Varietät von *Variabilis* No. 79. wobey die übrigen Citata des *Geoffr.* und de *Geer* anzutreffen ſind.

**) Nicht abgebildet.

56. *Syriacus*, der *Syrische Käfer mit grünlichem Haarkopf und Brustschild.*

Müller l. c. S. 77. No. 56. t. 2. f. 4.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 944. der *Syrische Käfer.*

57. *Fullo*, der *Walker; Müllerkäfer;* der *grosse Juliuskäfer;* der *marmorirte Maykäfer.* *)

Müller l. c. S. 77. No. 57. t. 2. f. 6. das *Männchen;* f. 7. das *Weibchen; Juliuskäfer.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 20. der *Tiger.*

Rösels 4. B. S. 203. t. 30. der *scheckichte grosse Juliuskäfer.*

Neue hamb. Magaz. 37. St. S. 41. der *Weinkäfer.*

Frisch Inf. XI. Th. S. 22. t. 1. f. 1. der *weisssprenglichte grosse Juliuskäfer.*

Bresl. Samml. 1718. April. Class. 4. Art. 2. §. 1. der *Tannen-* oder *Donnerkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 1. Vign. 1.

Pallas Reise durch Russl. I. 208. der *Dünenkäfer.*

Ephem. Nat. Curios. Dec. 1. Ann. 6. et 7. obs. 239. p. 348. Scar. *pictus*, der *gemählte Käfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 999. der *weisssprenglichte grosse Juliuskäfer.* P. 6. p. 917.

Schaeff. Icon. t. 23. f. 2.

Aubent. miscell. t. 16. f. med.

Jonst. hist. nat. Ins. t. 15. lin. 7.

Hoefn. Ins. 2. t. 7.

Bomar. Dict. IV. p. 535. *Foulon.*

Raj. Ins. p. 93. Scar. *Fullo Plinii.*

Plin.

*) Auch in der *Schweiz um Genf und Luggaris.* S. *Berner. Magaz.* 1. Th. 1. St. S. 84.

Plin. hist. nat. Lib. 30. cap. 11. *Fullo albis guttis.*
Fabric. S. E. p. 31. *Melolontha* 1.

Testacea, *albo-maculata*, scutello macula duplici alba, antennis heptaphyllis.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 14. No. 48. 49. t. 6. f. 48. 49. *Sabulosus niger mas*, *femina*; Le *Hanеton noir des Dunes*, *mâle*; *rouge des Dunes femelle*; de *zwarte Duinkever*, *Man*; de *roode*, *Wyf.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 69. *Scar.* 2. Le *foulon.*

Antennarum *lamellis maximis*, corpore nigro, squamis albis, *varie maculato.*

Charleton Onomast. 46. *Fullo.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 272. No. 19. *Scarabé Foulon.*

Scutellatus niger, s. rufus, *maculis sparsis albidis* squamosis, antennis *heptaphyllis.*

58. *Agricola*, der *Ackermann.*

Müller l. c. S. 79. No. 58. der *Feldkäfer.*
Füesslins Verz. S. 2. No. 21.
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 904. der *Feldkäfer.*
Poda Mus. graec. p. 21.
Scop. Entom. carn. No. 6. *Cyathiger.*

Elytra paulo saturatiora quam in *Solstitiali*, margine nigra, si vnita fuerint, maculam communem gerunt *cyatho* similem, atram.

Fabric. S. E. p. 37. *Melolontha* 29.

Capite, *thoraceque* coeruleo pilosis, *elytris* lividis, *clypeo* apice reflexo.

Schaeff. Icon. t. 63. f. 1.

59. *Horticola*, der *Gartenkäfer.*

Müller l. c. S. 80. No. 59. t. 2. f. 5. der *Johanniskäfer.*

Füeſslins Verz. S. 2. No. 22. der *Nager.*
Gleditſch. Einleit. in die Forſtwiſſ. 2. Th. S. 791. No. 23. der *Friſchiſche-Obſt-Apfelbaumkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 13. *Jütl. Gaaſeflüe, Gaaſebilde* (Gänſefliege.) *)
Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 921. der *Gartenkäfer, Johanniskäfer.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 1. No. 8.
— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 460.
Niger, *capite thoraceque violaceo*, piloſo, elytris *rufis.* Dan. *Gaas-Flue, Gaaſebilde.*
Schaeff. Icon. t. 23. f. 4.
Liſter Scar. angl. 380. No. 3. Scar. ex nigro virescens, pennarum thecis *rufis.*
Fabric. S. E. p. 37. *Melolontha* 28. **)
Capite, thoraceque coeruleo piloſis, *elytris* teſtaceis, pedibus nigris.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 75. *Scar.* 8. Le *petit hanneton à corcelet vert.*
Capite, thoraceque coeruleo piloſo, elytris *rufis.*
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 278. No. 24. t. 10. f. 18. *Scarabé à corcelet vert.*
Scar. *(viridicollis)* ſcutellatus, elytris obſcure flavis; *capite thoraceque* violaceis, ſ. viridibus nitidis, pedibus nigris.

60. *Me-*

*) Den *Gänſen* tödtlich, wenn ſie dieſen Käfer verſchlucken.

**) *Linné* hat zwar bey dieſem Horticola *Friſch* IV. Th. S. 29. t. 14. der *Weinblatt-* oder *Juliuskäfer*, angeführet; allein *Fabric.* hat dieſen mit Recht von dem Horticola unterſchieden, und daraus eine eigene Art: Melolontha *Friſchii* p. 37. No. 25. gemacht, die hinten in der *dritten* Klaſſe der *neuen* Käfer No. 171. vorkommen wird. Dieſer *Friſchkäfer* iſt auch wohl *zweymal* ſo groſs, als der Horticola.

60. *Melolontha*, der *gemeine Maykäfer.* *)
Müller l. c. S. 80. No. 60. der *Maykäfer.*
Altes hamb. Magaz. 4. B. S. 231.
Engl. The brown tree-beetle; the blind-beetle; the Chafer; the Cock-chafer; the Jack-horner; the Jeffry-Cock; the May-bug; the Dor; Hedge-chafer.

Bey den *Holl. Baumkäfer; Raubkäfer; Kornwürmer; Heckenkäfer.*
Seel. Molenaers (Müller) *Mehl-Senfmüller.*
Französ. Hanetons.
Lat. Scarab. *stridulus.*
Füeßlins Verz. S. 2. No. 24. *Maykolbenkäfer, Laubkäfer.*
Fermins Beschr. der Kol. Surin. 2. Th. S. 268.
Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 14. *Oldenborer.*
Kleemanns Preisschr. in den Bemerkungen der Kuhrpfälz. physikal. ökon. Gesellsch. Mannh. 1771. 8. S. 299. m. K.
Bonnets und anderer &c. Abhandl. aus der Insektol. S. 536.
Gleditsch. Einl. in die Forstwiss. 1. Th. S. 601. No. 5.
Röfels 2. B. S. 1. t. 1. der *allenthalben bekannte Mayenkäfer.*
Eberhards Thiergesch. S. 202. der *Sägenblattkäfer.*
Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 91. der *Maykäfer.*
Wittenb. Wochenbl. 70. St. S. 385.
Oekonom. Encykl. 1. Th. S. 324. *Ackerkrabbe.*

*) Linné hat bey diesem sowohl, als bey dem vorigen Horticola den *Frisch* 4. Th. t. 14. citirt. Dies ist aber eine ganz besondere Art, wie vorher angemerkt ist, indem *Frisch* den eigentlichen Maykäfer gar nicht hat.

Berlin. Samml. 4. B. S. 488.
Müllеri Faun. Fr. p. 2. No. 9.
— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 464.
Abdominis incisuris lateralibus *albis*; cauda inflexa, acuta.
Dan. *Oldenborre, Oldentorne.*
Poda Mus. graec. p. 19.
List. Goed. p. 265. f. 111. *Molenaer.*
Schaeff. Elem. t. 8. f. 3. t. 109. f. 4. *Maulwurfskäfer.*
— Icon. t. 93. f. 1. 2. t. 102. f. 3. 4.
Leuwenhoek Arcan. Nat. det. 1722. p. 17. f. 3. *Molenaar, Molitor.*
Mouffet Theatr. p. 160. f. 2. Scar. *arboreus vulgaris.*
List. loqu. p. 379. No. 1. Scar. maximus *rufus*, urhopygio deorsum inflexo.
Raj. Ins. p. 104. No. 1. Scar. *arboreus vulgaris major.*
Jonst. hist. nat. Ins. t. 15. Scar. *arboreus.*
Charlet. Onomast. p. 46. Scar. *arboreus.*
Ephemer. Nat. Curios. decur. 2. anni. 1. p. 148. Scar. *majalis foliaceus.*
Bonar. Dict. T. 5. p. 333. *Hanneton.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 926. der *Mayenkäfer.*
Schwenkf. Ther. Silef. p. 554. Scar. *rutilus major*; Scar. *saligneus, rubeus, praegrandis, stridulus*; der *Mayenkäfer; Weidenkäfer; Kreuzkäfer.* *)
Fabric. S. E. p. 32. *Melolonth.* 2. *vulgaris.* Testaceus, thorace villoso, *cauda* inflexa, incisuris abdominis *albis.*

Petiv.

*) *Schwenkfeld* hat schon bemerkt, dass einige einen *schwarzen*, andere einen *rothen* Halskragen haben: capite alias *nigro*, alias *rubro*: die erstern aus *gutem fetten*, die letztern aus *steinigtem* Lande.

Petiv. Gazoph. p. 29. t. 19. f. 2.
Spectacle de la Nat. Tom. I. p. 8. f. 2. 8. 11.
Scop. Entom. carn. No. 16. Carn. *Kever.* *)
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 13. No. 45. 46. t. 6. f. 45. 46. *Vernalis mas et femina;* le *Hanneton de May, mâle, femelle; Meikever.*
Geoffr. mat. med. Tom. 6. p. 529-549.
— Inf. Tom. I. p. 70. *Scar.* 3. le *Hanneton.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 273. No. 20. t. 10. f. 14. *Scarabé Hanneton.*

Scutellatus rufo-fuscus, thorace villoso, abdominis lateribus *albo* maculatis, cauda acuta inflexa.

61. *Solstitialis*, der *kleine Laub- oder Maykäfer.* **)
Müller l. c. S. 83. No. 61. der *Juniuskäfer.*
Füesslins Verz. S. 2. No. 25. der *kleine Laubkäfer.*
Frisch Inf. IX. S. 30. t. 15. der *Braach*- oder *Juniuskäfer.*

*) *Scopoli* hat *drey* artige Anmerkungen gemacht:
1. Dass die *Fledermäuse* diesen Käfern gewaltig nachstellen;
2. Dass die häufigere Anzahl derselben im Frühjahre *Herbstkrankheiten* vorher verkündigten.
3. In Oel eingemacht sollen sie die *Wanzen* vertreiben.

Bey den Alten hiess die *Larve* Spondylis, σπονδύλη, Verticilla. S. *Schwenkf.* l. c. p. 557. *Jonst.* l. c. p. 135. de Spondyle. *Bresl. Samml.* 1719. Nov. Cl. 4. Art. 8. p. 592. 593. 1721. Cl. 4. Art. 5. Bey den *Holländern* Koren-worm; Robworm. In *Deutschland* an einigen Orten *Enderlein, Engerlein, Engerling, Wirtelmade, weisse Erdglimen. Bresl. Samml.* 1718. April Cl. 4. Art. 4. p. 968. Im *Naumburgischen* und *Mecklenburgischen Ackerkrabben.*

**) Dieser Käfer soll das *Mutterkorn* verursachen, indem er sich an das Korn hängt, wenn es in der Milch stehet, und die Aehren aussauget. S. *Lentins* Beob. einiger Krankheiten. Gött. 8. 1774. S. 2. 3.

Gleditsch. Forstwiss. 2. Th. S. 790. No. 22. der *andere grosse Frühlingskäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 15. *Brandenborre;* St. *Hans Oldenborre* (Johanniskäfer.)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 393. *Suec.* Allenborre. *Scan.* Pingborre.

Schwenkf. Theriotr. Silef. p. 555. Scarabaeus *rutilus minor; Braachkäfer.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 15. No. 51. 52. t. 6. f. 51. 52. *Junius; Germano-Junius;* le *Hanneton de Juin; — d'Allemagne;* de *Junykever; de Duitsche Junykever.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 942. der *Juniuskäfer.*

Petiv. Gazoph. p. 36. t. 22. f. 9. Scar. pectinatus minor villosus.

Poda Mus. graec. p. 21.

Schaeff. Icon. t. 93. f. 3.

Müller Faun. Fridr. p. 2. No. 10.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 465.

Testaceus, *thorace villoso*, abdominis incisuris albis, cauda obtusa.

Fabric. S. E. p. 33. *Melol.* 5. Testacea, thorace *villoso*, elytris luteo-pallidis, *lineis* tribus pallidioribus.

Mouff. Theatr. Inf. p. 160. f. 3. Scar. *lanuginosus arboreus.*

List. Scar. angl. p. 301. No. 2. Scar. alter ex *flavo subcinereus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 74. *Scar.* 7. Le *petit Hanneton d'Automne.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 276. No. 21. t. 10. f. 15. *Scarabé solstitiel.*

Scutellatus, *villosus*, griseo-testaceus, capite nigro, pedibus fulvis, abdominis lateribus albo-maculatis.

62. *Occidentalis*, der *westindische Laubkäfer.*

Müller

Müller l. c. S. 83. No. 62. der *westindische Juniusköfer.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 935. der *westindische Käfer.*

Fabric. S. E. p. 32. *Melolontha* 3.

Testacea, *thorace pubescente*, elytris *lineis* quatuor niveis.

Drury Ins. Tom. II. t. 32. f. 2.

63. *Hemipterus*, der *Käfer mit halben Flügeldecken.* *)

Müller l. c. S. 83. No. 63. der *Halbdecker.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 26. der *Stachelkolbenkäfer.*

Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 36.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 918. der *Käfer mit sehr kurzen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 41. *Trichius* 4.

Thorace tomentoso, *rugis* duabus longitudinalibus marginato, *elytris* abbreviatis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 78. *Scar.* 12. Le *Scarabé à tarrière. (Bohrkäfer.)*

Ater, depressus et squamosus, *maculis* albis variegatus, elytris abdomine *brevioribus*, *femina aculeo ani.*

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 472.

Scar. *squamulatus.*

Niger, thorace inaequali; *lineola* duplici abrupta, *elytris* abdomine *brevioribus.*

64. *Farinosus*, der *Staubkäfer.*

Müller l. c. S. 84. No. 64.

*) Viel ähnliches mit *Scop* Scar. *variegato.* Ent. carn. No. 28. aber nicht derselbe.

Nirgends abgebildet.

Füesslins Verz. S. 3. No. 27. der *Puderkolbenkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 914. der *staubichte Käfer.*

Scop. Entom. carn. No. 9. Scar. *argenteus.*
Poda Mus. graec. p. 20. Scar. *argenteus.*
Drury Ins. Tom. II. t. 32. f. 4. Scar. *coeruleus.*
Fabric. S. E. p. 38. *Melolontha* 31. *)
Supra coeruleo, subtus argenteo-nitens, clypeo integro.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 79. *Scar.* 13. *L'écailleux violet.*
Violaceus et *squamosus*, squamis subtus argenteis.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 302. No. 30. t. 10. f. 23. Scarabé *à écailles vertes* (Grünschuppe.)
Scutellatus niger, *squamulis griseo viridibus*, corpore depresso.

65. *Aulicus*, der *afrikanische Hofjunker.* **)
Müller l. c. S. 84. No. 65. der *Hofjunker.*
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 337.
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 906. der *Hofjunker.*

66. *Longipes*, der *kapensische Stelzenkäfer.* ***)
Müller l. c. S. 84. No. 66. der *Langfuss.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 924. der *langfüssige Käfer.*

67. *Lanigerus*, der *Wollträger.*

Müller

*) Diesen hält *Fabric.* mit *Scop. argenteo* nicht für einerley, weil dessen Flügel weder schwarz, noch mit grünlichem Staube besprengt sind. Er hat daraus eine eigene Art gemacht S. E. p. 38. Melol. 32. *argentea.* S. hinten in der dritten Klasse der neuen No. 172.

**) Nirgends abgebildet.

***) Nirgends abgebildet.

Müller l. c. S. 85. No. 67.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 922. der *Wollenträger.*
Fabric. S. E. p. 33. *Melol.* 7.
Subtus *lanata*, capite thoraceque aureis, *elytris* luteis.
Drury Ins. Tom. I. t. 34. f. 6.

68. *Squalidus*, der *Schmutzkäfer.**)
Müller l. c. S. 85. No. 68.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 942. der *schmutzige Käfer.*
Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 36. *hirta* B.

69. *Hirtellus*, das *Rauchkäferchen.*
Müller l. c. S. 85. No. 69.
Füesslins Verz. S. 3. No. 29. das *Bärlein.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 920. der *haarige Käfer.*
Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 36. *hirta.* Nigricans, *elytris* pallido maculatis, *thorace* carinato.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 10. No. 34. t. 4. f. 34. *Hirtidorsum;* le *Dos velu;* de *Ruirug. (Rauhrücken.)*

70. *Fasciatus*, die *Bandstreife.*
Müller l. c. S. 86. No. 70. t. 2. f. 8. der *bandirte Blumenkäfer.*
Füesslins Verz. S. 3. No. 30. der *Libereyträger.*
Neues hamb. Magaz. 37. St. S. 37.
Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 276. t. 16. f. 2.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 914. der *Käfer mit den Queerbändern auf den Flügeldecken.*

*) Nirgends abgebildet.

Poda Mus. graec. p. 20.
Bomar. Dict. P. 6. p. 541.
Schaeff. Icon. t. 1. f. 4.
Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 2.
Fabric. S. E. p. 40. *Trichius* 1.

Niger, tomentoso-flavus, elytris *fasciis tribus* nigris abbreviatis.

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 466. Niger, tomentoso-flavus, elytris *fasciatis.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floricol.* p. 12. No. 43. t. 5. f. 43. *Rosaceus;* le *Scarabé des Roses;* de *Roozenkever.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 80. *Scar.* 16. La *livrée d'ancre.*

Niger, hirsutie flavus, elytris luteis, *fasciis tribus* nigris interruptis.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 299. No. 27. t. 10. f. 19. *Scarabé à bandes.*

Scutellatus niger, tomentoso-flavus, elytris *fasciis duabus* transversis luteis coadunatis.

71. *Indus*, der *indianische bleyfarbige braunpunktirte Käfer.* *)

Müller l. c. S. 86. No. 71. der *Indianer.*
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 921. der *indianische Käfer.*
Fabric. S. E. p. 40. *Trichius* 2.

72. *Brunneus*, der *punktirte Brustschild.*

Müller l. c. S. 86. No. 72. der *Europäer.*
Schriften der Drouth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 267.

*) Nirgends abgebildet.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 909. der *braune Käfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 81. No. 22. *Brunnus.* Major *stercorario*, totus rufo-testaceus; elytra obsolete admodum striata, crura compressa, postica maxima.

Gronov. Gazoph. p. 147. No. 442.

Fabric. S. E. p. 36. *Melol.* 20. Glabra, testacea, elytris striatis, thorace vtrinque *puncto* notato.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 473.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 15. No. 53. 54. t. 7. f. 53. 54. *Tenuicrusta rubeus;* mas et femina; le *Haneton rouge à etuis minces;* de *roode Dunschaal.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 83. *Scar.* 22. Le *Scarabé fauve aux yeux noirs. Fulvus*, oculis nigris, *thorace* glabro.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 277. No. 23. t. 10. f. 17. *Scarabé fauve.*

Scar. *(fulvus)* scutellatus flavo-rufus, oculis nigris, thorace *punctis binis* nigris, pedibus longissimis.

73. *Capensis*, der *rothbraune weisspunktirte Kapkäfer.*

Müller l. c. S. 87. No. 73. der *Afrikaner.*

Rösels 2. B. Vorb. S. 28. t. B. f. 6. der rothbraune mit *weisslichen Punkten* besprengte und rothgelben Haaren bewachsene Käfer.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 909. der *Käfer von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 4. No. 11. t. 2. f. 11. *Capensis; l'escarbot du Cap;* de *Kapenaar.*

Drury Inf. Tom. I. t. 33. f. 3.

Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 14. Hirta rufa, *albopunctata.*

74. *Eremita*, der *Einsiedler.*

Müller l. c. p. 87. No. 74. der *Eremit.*

Füesslins Verz. S. 3. No. 31. *Eremit.*
Börners Samml. 1. Th. S. 462. der *faule Holzerdenkäfer.*
Röfels 2. B. Erdk. 1. Kl. t. 3. f. 6. der *Schusterkäfer; Juchtenkäfer;* der *grosse schwarzbraune Käfer.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 913. der *Einsiedler.*
Schaeff. Icon. t. 26. f. 1.
Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 12. Aeneo-atra, *thorace inaequali*, scutello sulco longitudinali.
Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 457. Fusco-ater, thorace scutelloque fusco longitudinali, elytris complanatis, rugoso punctatis.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 300. No. 28. t. 10. f. 22. *Scarabé de cuir noir.* *)
Scar. *(coriarius)* scutellatus aeneo-niger nitidus, corpore planiusculo glabro, thorace futuris binis totidemque tuberculis.

75. *Fascicularis*, der *Bündelkäfer.*
Müller l. c. S. 87. No. 75.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 915. der *Büschelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 13.
Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 2.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 7. No. 17. t. 3. f. 17. *Setaceus viridis*, seu *Setiger viridis;* le *Brossard vert;* de *groene Borsteldrager.*

76. *Punctatus*, der *gestippelte Käfer.*
Müller l. c. S. 87. No. 76. der *Punktkäfer.*

Onomat.

*) *Geer* sagt: es habe *Linné* seiner gar nicht gedacht: gleichwohl hat er eben das *Röfelsche* Ciratum, das *Linné* bey diesem *Eremita* hat, angeführet, mithin hat solches der grosse Mann in der 12ten Ausgabe des L. bey *Eremita* übersehen.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 937. der *punktirte Käfer.*
Fabric. S. E. p. 33. *Melol.* 8.
Drury Inf. Tom. I. t. 34. f. 5.
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 17. No. 65. t. 8. f. 65. *Nov-eboraceus luteus;* le *Haneton jaune de la nouvelle York;* de *geele Nieuwjorker.*

77. *Lanius*, der *Blutkäfer.*
Müller l. c. S. 88. No. 77. der *Amerikaner.*
Röfels 2. B. Vorb. S. 26. t. B. f. 3. der *dunkelrothe ſchwarzgefleckte und punktirte Käfer.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 922. der *Blutkäfer.*
Fabric. S. E. p. 44. *Cetonia* 9. Exſcutellata lucida *nigro-maculata*, ſterno antice *cornuto.*
Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 7. No. 16. t. 2. f. 16. *Lanius*; le *Boucher*; de *Vleeshouwer.*
Drury Inf. Tom. I. t. 33. f. 8. *)

78. *Auratus*, der *Goldkäfer.*
Müller l. c. S. 88. No. 78.
Füeſslins Verz. S. 3. No. 32. der *Gold-Kolbenkäfer.*
Gleditſch. Forſtwiſſ. 2. Th. S. 979. No. 27. der *Goldkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 198. No. 16.
Friſch Inſ. XII. Th. S. 25. No. 19. 3. Platte. t. 1. f. 2. der *grüne Baum*- oder *ſogenannte Goldkäfer.*
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 14.
Beckmanns Anfangsgr. S. 91. No. C. der *Goldkäfer.*
Röſels

*) Das *Druryſche* Exemplar iſt fahlbraun, das *Röſelſche* aber dunkelroth. Vielleicht eine Varietät des Geſchlechts. Der *Voetſche Pullus maculoſus* t. 5. f. 44. kommt mit dem *Druryſchen* faſt gänzlich überein, wie er denn auch *Jamaika* zum Vaterlande hat. S. hinten in der *dritten* Klaſſe der neuen Käfer No. 65.

Rösels 2. B. Erdk. 1. Kl. S. 9. t. 2. f. 6. 7. der *bekannte grüne Goldkäfer.*

Schriften der Dronth. u. Norw. Ges. 4. B. S. 265.

Physikal. Belust. 3. B. S. 1082. der *Braachwurm;* Scar. *chlorochryseus.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 906. der *Goldkäfer.*

Mouffet Theatr. Ins. p. 158. *Smaragdus, viridulus.*

Graeci Comicique μελολόνθην;

Altici μελόνθην; χρυσαέλλιδα;

Rustici Lombardi Gallerucam;

Itali Mariola;

Poloni Zielonakroroka;

Angli Greene-Chafer.

Schwenkfeld Ther. Silef. p. 555. Melolontha Arist. Quib. χρυσίτιδα, Dialect. *Chrysocantharus; Galeruca;* Scar. *viridis* Vl. Aldrov. Ein *Krötenkäfer; Goldgrünkäfer.*

Bomar. Dict. P. IV. p. 234. *Emeraudine.*

Strömer Act. Ac. Suec. Vol. 2. p. 47.

Poda Mus. graecens. p. 19.

Wormii Mus. p. 342. Scar. *chlorochrysos.*

Merr. Pin. 201. *Viridulus; Smaragdulus.*

Schaeff. Icon. t. 26. f. 2. 3. 7. t. 50. f. 8. 9.

Müller i Faun. Fridr. p. 2. No. 12.

— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 462.

Supra viridis, subtus aeneus, thorace postice vtrinque *appendiculato.* *Dan.* Spansk-Flue. *Norv.* Guld-Basse.

Fabric. S. E. p. 43. *Cetonia* 4. Aurata, segmento ab dominis primo lateribus vnidentatis, elytris *albo-maculatis.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 4. No. 2. t. 1. f. 2. *Viridis germanus; Verd allemand; de greene Duitscher.*

Drury

Drury Inf. Tom. I. t. 33. f. 1. *)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 73. *Scar.* 5. L' *Emeraudine.* Viridi-aeneus, thoracis parte prona antice prominente.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 279. No. 25. t. 11. f. 1. Scarabé *emeraudine.* (*Suec.* Guldfchmed; *Holl.* Goude-torre.)

Scar. *(Smaragdus)* fcutellatus viridi-aureus, elytris glabris, lineis transverfis albidis, pectore porrecto, lateribus vnidentato.

79. *Variabilis*, der *Unbeftand.*

Müller l. c. S. 89. No. 79.

Füeflins Verz. S. 3. No. 33.

Gleditfch. Forftwiff. 1. Th. S. 657. der dunkle *glatte, punktirte Käfer.*

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 219. k.

Onomat. hift. nat. P. 6. p. 946. der *veränderliche Käfer.*

Röfels 2. B. Erdk. 1. Kl. t. 2. f. 8. *Mas.* f. 9. *fem.*

Scop. Entom. carn. No. 7. *funeftus.* An *variabilis* L.?

Poda Muf. graecenf. p. 20.

Schaeff. Icon. t. 198. f. 8.

Geoffr.

*) Der *Druryfche* fcheint eine Varietät zu feyn, indem er den Goldglanz des *Röfelfchen* nicht hat.

Die drey *Voetfchen* Käfer t. 1. f. 1. 2. 3. *Viridi-corufcus; Viridis germanus; Metallicus* f. aeneus, möchten wohl eben keine drey verfchiedene Arten feyn.

Linné hat blos *Röfels* t. 2. f. 9. 8. angeführt; es mufs aber heifsen f. 1-7.

Ift nicht das Infekt, welches die *Hottentotten* verehren, S. Catholicon p. 174.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 79. *Scar.* 14. *) Le *drap mortuaire.*

Nigro-coeruleſcens, *maculis albis* ſparſis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 301. No. 29. t. 10. f. 22. *Scarabé à points blancs.*

Scar. *(albo-punctatus)* ſcutellatus niger, corpore depreſſo.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 471. Ater, elytris *albo-punctatis.*

80. *Aeruginoſus*, der *Kupferſchmidt.*

Müller l. c. S. 90. No. 80.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 904. der *ſpangrüne Käfer.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 83. No. 26. *Aeruginoſus*; maior *ſtercorario*, ſupra viridis; abdominis mucro longus inter crura media.

Drury Inſ. Tom. I. t. 33. f. 4.

81. *Nobilis*, der *edle Goldkäfer.*

Müller l. c. S. 90. No. 81. der *Edelmann.*

Füeſslins Verz. S. 3. No. 34. der *Edelkolbenkäfer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 2. Th. S. 979. der *glatte grünliche Goldkäfer mit rauhen Flügeldecken, und tief geſtreiftem Bruſtſtück.*

Röſels 2. B. Erdk. 1. Kl. S. 19. t. 3. f. 1-5. die *zweyte Art der Goldkäfer.*

Onomat.

*) *Fabricius* hat dieſen Variabilis gar nicht, dagegen das Geoffr. Citatum bey Stictícus, No. 54. der Herr von *Geer* aber bey Variabilis angeführet, woraus ich ſchlieſse, daſs des Linn. *Stictícus* und *Variabilis* einerley Art ſey. *Röſels* t. 2. f. 8. iſt das *Männchen*, wovon *Linné* ſagt: *Quintuplo minor* femina, variat colore aureo et rubro.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 934. der *Edelkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 66. f. 5.
Scopol. Ann. 5. hist. nat. p. 85. No. 28. *)
Fabric. S. E. p. 43. *Cetonia* 5. Aurata, abdomine postice *albo-punctato*, elytris rugosis.
Müllеri Faun. Fridr. p. 2. No. 13.
— Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 463. Viridi-aeneus, elytris anoque *albo-punctatis.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 73. *Scar.* 6. le *Verdet. Viridis nitens*, thorace infra aequali, non prominente.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 297. No. 26. *Scarabé verdet.*
Scar. *(viridulus)* scutellatus aureo-viridis nitidus, elytris rugosis, abdomine postice albedine maculato, pectore mutico.

82. *Aeneus*, der *blaulichte Goldkäfer.* **)
Müller l. c. S. 90. No. 82. der *Fremdling.*
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 903. der *kupferartige Käfer.*

83. *Quisquilius*, der *Kehrichkäfer.* ***)
Müller l. c. S. 90. No. 83.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 938. der *kleinste Käfer.*
Scop. Entom. carn. No. 29. Scar. *minimus.*
Müllеri Faun. Fridr. p. 2. No. 11.
Fabric. S. E. p. 20. *Scar.* 74.
Scutellatus muticus ater, elytris lividis.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 271. No. 18. *Scarabé des immondices.*

*) *Scopoli* berichtet, dass man diese schöne Käfer in den *Ameisenhaufen* gefunden habe, wo sie von den Ameisen begraben, und gleichsam eingewickelt gewesen wären.
) Nirgends abgebildet. *) Nirgends abgebildet.

Exscutellatus niger nitidus, elytris striatis livido-testaceis.

84. *Quadrimaculatus*, der *Vierfleck.**)
Müller l. c. S. 91. No. 84.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 937. der *Käfer mit vier rothen Flecken auf den Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 70.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 474.

85. *Plagiatus*, der *Purpurfleck.***)
Müller l. c. S. 91. No. 85.
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 936. der *Käfer mit einem Purpurfleck auf dem Rücken.*
Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 71.

86. *Rufipes*, der *Rothfuss.*
Müller l. c. S. 91. No. 86.
Füesslins Verz. S. 3. No. 36. der *Rothfuss.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 938. der *Rothfuss.*
Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 68. Scutellatus muticus ater, *thorace glabro* nitido, elytris *striatis.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 83. *Scar.* 21. le *Scarabé jayet.*
Totus niger, capite inermi.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 263. No. 7. t. 10. f. 6. *Scarabé à tête large.*
Scar. *(capitatus)* scutellatus nigro-fuscus, corpore oblongo, elytris striatis capite magno laevi.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 476. Scar. *gagates* niger, elytris striatis punctatisque.***)

87. *Ce-*

*) Nirgends abgebildet. **) Nirgends abgebildet.
***) Diesen hat der Herr Staatsrath für einen *neuen* ausgegeben; von *Geer* hat aber bey dem *Linnéischen Rufipes* eben das Citatum des *Geoffr.* Scar. *gagates* angeführet, das ich hier finde.

87. *Ceratoniae*, der *ägyptische Johannisbrodkäfer.* *)

Müller l. c. S. 91. No. 87.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 911. der *Johannisbrodkäfer.*

Folgende Linnéische Käfer sind meines Wissens noch nicht abgebildet.

II. *Klasse.*

1. No. 23. *Granarius.*
2. No. 27. *Bison.*
3. No. 30. *Maurus.*
4. No. 33. *Haemorrhoidalis.*
5. No. 35. *Marianus.*

III. *Klasse.*

1. No. 36. *Gigas.*
2. No. 37. *Scaber.*
3. No. 38. *Laticollis.*
4. No. 44. *Calcaratus.*
5. No. 46. *Ovatus.*
6. No. 55. *Sepicola.*
7. No. 65. *Aulicus.*
8. No. 66. *Longipes.*
9. No. 68. *Squalidus.*
10. No. 71. *Indus.*
11. No. 82. *Aeneus.*
12. No. 83. *Quisquilius.*
13. No. 84. *Quadrimaculatus.*
14. No. 85. *Plagiatus.*
15. No. 87. *Ceratonius.*

*) Nicht abgebildet.

I. *Neue Käferarten mit gehörntem Bruſtſtück.*

1. *Dichotomus*, der *braunrothe indianiſche Käfer mit geſpaltenen Hörnern.* *)

Linn. Mantiſſ. p. 529. Thorace *cornu bidentato*, capite *cornu dichotomo.*

Aubent. Miſcell. t. 40. f. 5.

Fabric. S. E. p. 5. *Scar.* 6.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 26. No. 107. t. 14. f. 107. *Cervus volans*; le Cerf-volant; het *vliegend Hart.*

Müllers Supplementsband S. 213. das *Doppelhorn.*

Sulzers Geſch. S. 16. t. 1. f. 1. der *Zergliederer.*

2. *Claviger*, der *indianiſche Keulenträger.*

Linn. Mantiſſ. p. 529. Thorace *cornu clavato*, capite *cornu ſubulato.*

Aubent. Miſcell. 1. t. 40. f. 1.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 26. No. 108. t. 14. f. 108. *Subgrundator*; le *Porte-Auvent*; de *Luifeldrager.*

Müllers Suppl. B. S. 214. der *Schlüſſelträger.*

3. *Nimrod*, der *purpurſchwärzliche Nimrod.*

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Terric.* p. 24. No. 101. t. 13. f. 101. *Nimrod.*

Thorace admodum prominente *cornuto bifido*, capitis cornu ex dimidia parte *dentato*, et *bifido.*

4. *Furciger*, der *Gabelträger.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 24. No. 102. t. 13. f. 102. *Furciger*; le *Porte-fourche*; de *Vorkendrager.*

Spadicei

*) Vielleicht eine bloſse Spielart von Scar. *Gideon* L. No. 2.

Spadicei coloris; thoracis capitisque cornu *furcato.*

5. *Elephas*, der *Guineiſche fliegende Elephant.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 25. No. 103. t. 13. f. 103. *Mas.* f. 104 *femina*; le *Trompette*; de *Trompetter.*

Olear. Muſ. t. 16. f. 2.

Fabric. S. E. p. 7. *Scar.* 16. Scutellatus, villoſus, thorace *gibbo bicorni*, capitis cornu *vunidentato*, apiceque *biſido.*

6. *Vectiarius*, die *Surinamiſche Wagenwinde.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 25. No. 105. t. 14. f. 105. le *Cric*; de *Dommekracht.*

Thorace multum extante, *duabus Epiphyſibus* craſſioribus; capitis *cornu* denſo incurvo retuſo; tibiis *ſetoſis.*

7. *Javanus*, der *Javaniſche Hornkäfer.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 25. No. 106. t. 14. f. 106. Thorace duabus *latis* obtuſis Epiphyſibus, ſuper caput prominentibus; capite ingenti *cornu* acuto et valde adunco.

8. *Taurus volans*, der *oſtindianiſche fliegende Stier.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 26. No. 109. t. 15. f. 109.

Inſignis magnitudinis, totus niger, nitidus; capitis ingens *cornu* aduncum; thoracis *duo cornua* taurinis haud abſimilia.

9. *Taurus volans coruſcans*, der *kupferfarbige oſtindianiſche fliegende Stier.*

Voet. l. c. t. 15. f. 110. le *Taureau volant et luiſant*; de *blinkende vliegende Stier.*

Priori simillimus; adeo refulgens, vt colorem referat *aeris rutilantis.*

10. *Repandirostrum*, der *ostindianische Krummschnabel.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 27. No. 113. t. 17. f. 113. Le *Bec crochu;* de *Kromneus.*

Thorace duobus, vtrinque brevibus, et in medio vno longiori *cornu* obtuso, *capitis rostro* admodum repando; *antennis insolitis*, Cervorum volantium (Schröter) simillimis.

11. *Goliath*, der *amerikanische gelbe Bär.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 27. No. 114. t. 17. f. 114.

Totus *hirsutus;* thorace duabus *cuspidibus acutis;* capitis rostro *bidente.*

12. *Trifurca*, die *ostindianische Dreygabel.* *)

Voet. Scar. *Terric.* p. 27. No. 115. t. 18. f. 115. Le *Trident;* de *Driegaffel.*

Thorace *trifurcato*, capite *non cornuto*, tenuissimo.

13. *Tridens hispidus*, die *gelbhaarichte ostindianische Dreygabel.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 28. No. 116. t. 18. f. 116. Le *Trident velu;* de *Ruige Driegaffel.*

Totus spadiceus, subtus *hispidus. Thorace* pone caput *cornu incurvo*, vtrinque duobus densioribus et obtusioribus; *capite* plano et non cornuto.

14. *Oromedon*, der *Oromedon.*

Fabric.

*) V. No. 25.

Fabric. S. E. p. 4. *Scar.* 3. Scutellatus, *thoracis cornu* brevi emarginato, *capitis* recurvo bifido.
Aubent. miscell. I. t. 40. f. 4.
Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 5.

15. *Aegaeon*, das *rothe indianische Kurzhorn.*

Fabric. S. E. p. 4. *Scar.* 4. Scutellatus rufus; *thoracis cornu brevi* incurvo; subtus barbato, *capitis* recurvo *subulato.*
Drury Ins. Tom. II. t. 30. f. 5.

16. *Chorinaeus*, das *Brasilianische Langhorn.*

Fabric. S. E. p. 5. *Scar.* 5. Scutellatus, *thoracis cornu* incurvo, basi crassissima, apice bifido, capitis *longiori* recurvo bifido.

17. *Pan*, der *indianische Pan.* *)

Fabric. S. E. p. 5. *Scar.* 8. Scutellatus, *thoracis cornu* incurvo, basi crassissima, apice bifido, *capitis* recurvo vnidentato.

18. *Jason*, der *chinesische Jason.* **)

Swammerd. B. der N. t. 30. f. 5. *vierte Sorte des Nashorns.*

Fabric. S. E. p. 6. *Scar.* 10. Scutellatus, *thoracis cornu* crassissimo, apice emarginato, *capitis* vnidentato bifido.

19. *Validus*, der *Brasilianische Held.*

*) Dem vorigen sehr ähnlich, und vielleicht nur eine Varietät desselben.

**) Dem *Bilobo* L. No. 12. sehr ähnlich, nur ist bey diesem das Kopfhorn nicht gespalten.

Fabric. S. E. p. 6. *Scar.* 11. Scutellatus, *thorace* antice retuso, *cornu* conico breviſſimo, *capite* bituberculato.

20. *Truncatus*, der *neuſeeländiſche Stumpfkopf.*

Fabric. S. E. p. 6. *Scar.* 12. Scutellatus, *thorace* retuſo, *cornu* brevi *truncato*, capite mutico.
Muſ. Dom. *Banks.*

21. *Eurytus*, das *amerikaniſche Flachhorn.*

Fabric. S. E. p. 7. *Scar.* 13. Scutellatus, thorace antice retuſo, *cornu brevi incumbente* emarginato, capite mutico.

22. *Boas*, die *afrikaniſche Punktlinie.*

Fabric. S. E. p. 8. *Scar.* 17. Scutellatus, *thorace* retuſo excavato bidentato, capitis *cornu* recurvo ſimplici. *Elytra picea linea punctata* vnica ad ſuturam.

23. *Centaurus*, der *oſtindianiſche Zentaur.*

Fabric. S. E. p. 8. *Scar.* 19. Scutellatus niger, thorace *tricorni* lateralibus breviſſimis ſubulatis, capitis recurvo vnidentato.

24. *Geryon*, der *indianiſche Hohlſchild.*

Fabric. S. E. p. 9. *Scar.* 21. Scutellatus, thorace *excavato tricorni*, lateralibus compreſſis vnidentatis, *capitis* recurvo ſimplici.
Drury Inſ. Tom. II. t. 30. f. 6.

25. *Antaeus*, die *amerikaniſche Dreygabel.* *)

Fabric.

*) Viel ähnliches mit Voets *Trifurca*, No. 12.

Fabric. S. E. p. 9. *Scar.* 23. Scutellatus, *thorace tricorni*, intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laevissimis.

Drury Ins. Tom. I. t. 34. f. 3. 4.

26. *Syphax*, der *amerikanische Punktflügel.*

Fabric. S. E. p. 9. *Scar.* 24. Scutellatus, *thorace tricorni*, intermedio longiori simplici, capite mutico, *elytris punctatis.*

Mus. Dom. *Banks.*

27. *Maimon*, das *amerikanische Gleichhorn.*

Fabric. S. E. p. 10. Scar. 25. Scutellatus, *thorace tricorni*, cornubus *aequalibus* brevissimis, elytris laevibus.

Mus. Dom. *Banks.*

28. *Titanus*, der *Drurysche Simson.* *)

Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 3. 4. Scar. *Simson.*
Sloan. Iam. II. p. 205. t. 237. f. 4. 5. Scar. major niger *tricornis.*

Fabric. S. E. p. 10. *Scar.* 27. Scutellatus, thorace *tricorni*, intermedio longiori, apice *bifido*, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico.

29. *Aenobarbus*, der *amerikanische Rothbart.*

Fabric. S. E. p. 10. *Scar.* 28. Scutellatus, thorace *tricorni*, medio longiori emarginato, lateralibus obtusis, capite *bituberculato.*

30. *Sylvanus*, der *brasilianische Silvan.*

Fabric.

*) S. No. 4. *Simson* L.

Fabric. S. E. p. 11. *Scar.* 30. Scutellatus, thorace retuso, prominentia *triplici*, intermedia obsoleta, capitis *cornu* recurvo.

Mus. Dom. *Banks.*

31. *Lazarus*, der *neuyorkische Lazarus.*

Fabric. S. E. p. 11. *Scar.* 31. Scutellatus, thorace *trituberculato*, capitis *cornu* brevi emarginato.

32. *Mobilicornis*, das *englische Wackelhorn.*

Fabric. S. E. p. 11. *Scar.* 32. Scutellatus, thorace *quadridentato*, capitis cornu recurvo *mobili.*

33. *Jacchus*, die *kapensische Randlinie.*

Fabric. S. E. p. 20. *Scar.* 79. Exscutellatus, thorace prominente *bilobo*, capitis *cornu* recurvo simplici. *Lineolae duae* elevatae vtrinque ad marginem.

Femina capitis cornu breviſſimo truncato, thoracisque tuberculo antico transverso elevato.

34. *Oedipus*, das *kapensische Flachhorn.*

Fabric. S. E. p. 21. *Scar.* 80. Exscutellatus, thorace cornu *plano*, subtus dentato, capitis truncato *bidentato.*

35. *Pithecius*, die *indianische Schusteraale.*

Fabric. S. E. p. 21. *Scar.* 81. Exscutellatus, thorace *bicorni*, cornubus breviſſimis, capitis cornu erecto subulato.

36. *Rosalius*, das *amerikanische Sägehorn.*

Fabric. S. E. p. 21. *Scar.* 82. Exscutellatus, thorace antice *bicorni*, postice elevato, *tricorni*, capitis cornu compresso *serrato.*

37. *Si-*

37. *Silenus*, der *amerikanische Silen.*

Fabric. S. E. p. 21. *Scar.* 83. Exscutellatus, thorace *tridendato*, capitis *cornu* recurvo, elytris striatis.
Mus. Dom. *Banks.*

38. *Midas*, der *amerikanische Grubenschild.*

Fabric. S. E. p. 21. *Scar.* 84. Exscutellatus, thorace *tricorni*, clypeo sinuato *bicorni.*
Mus. Dom. *Banks.*

39. *Hamadryas*, der *kapensische Grubenschild.*

Fabric. S. E. p. 22. *Scar.* 85. Exscutellatus, thorace *tricorni*, intermedio plano, acuto bidentato, clypeo reflexo *bicorni.*
Mus. Dom. *Banks.*

40. *Rhadamistus*, der *kleine Tranquebarische breitgrubichte Hornkäfer.*

Fabric. S. E. p. 22. *Scar.* 87. Exscutellatus, thorace *late foveolato*, antice cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis, sutura punctisque duobus nigris.

41. *Belzebul*, der *amerikanische Belzebul.*

Fabric. S. E. p. 23. *Scar.* 88. Exscutellatus, thorace prominentia *triplici*, capite *tricorni* intermedio majori.

42. *Faunus*, der *Kayennische Faun.*

Fabric. S. E. p. 23. *Scar.* 89. Exscutellatus, thorace *quadricorni*, intermediis brevissimis, capitis *cornu* recurvo.

43. *Coryphaeus*, der *kapensische General.*

Fabric.

Fabric. S. E. App. p. 817. Scutellatus, thorace *bicorni*, corpore ferrugineo.

44. *Copris niger maximus*, der *gröſte ſchwarze Miſtkäfer.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 38. No. 3. t. 23. f. 3.
Thorace *bicorni*, capitis *cornu* in altum ſublato.

45. *Cylindrus*, der *oſtindianiſche Walzenkäfer.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 31. No. 131. t. 20. f. 131. le *Cylindre;* de *Cylinder.*

In Thorace vtrinque *duae acutae* Apophyſes; capitis *cornu* minutulum.

46. *Tuberoſum*, der *Buckelkäfer.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 31. No. 132. t. 20. f. 132. le *Boſſu;* de *Knobbelrug.*

Thoracis ingens craſſumque *tuber*, capitis *cornu* minutulo.

47. *Algerinus*, der *Algierer.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 31. No. 133. t. 20. f. 133. *l'Algerien;* de *Algeryn.*

In Thorace millia occurrunt minutulae *claviculae.*

48. *Strigocephalus*, der *Eulenkopf.*

Drury Inſ. Tom. I. t. 35. f. 1. Totus griſeo-niger; profunde ſulcatus, ſubtus albo-lanuginoſus; thorace antice *tritubercülato*, capite *cornutulo brevi* recurvo, verſus dorſum reclinato, vt faciem *Strigis* referat.

Die

Die folgenden haben alle etwas besonderes an dem *Brustschilde und Kopfe zugleich*, und könnten *Thorace et capite tuberculato, spinoso, cornuto*, heissen.

49. *Fissidorsum*, der *indianische Rückenspalt.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 30. No. 126. t. 19. f. 126. le *Dos fendu;* de *Spleetrug.*

Thorace admodum sublimi, concavitatem in medio, piri instar, formante, cujus cuspis retro inclinatur; *capite* in rostrum acuminatum desinente.

50. *Erectidorsum*, der *ostindianische Hochrücken.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 30. No. 127. t. 19. f. 127. le *Dos roide;* de *Stylrug.*

Dorso pone caput recte in altum extenso, in cujus margine quatuor prostant minutissimi *aculei.*

51. *Aloëus*, der *Voetische Surinamische Aloëus.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 30. No. 128. t. 19. f. 128. In anteriore thoracis parte *obtusa spina;* in capitis parte postica *duo parva tubercula.*

52. *Muhamedanus*, der *Muhamedaner.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 30. No. 129. t. 19. f. 129. *Thorace* depresso, in acutum et sublimem marginem exeunte.

53. *Scrobifer*, der *westindische Grubenträger.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 30. No. 130. t. 19. f. 130. Le *Porte-fossette;* de *Dukdrager.*

Pone caput *thoraci* inserta est minuta et acuta *Apophysis.*

54. *Gib-*

54. *Gibbosus*, der *Pensylvanische Buckelkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 322. No. 15. t. 19. f. 7. *Scarabé bossu.*

Scutellatus fusco-castaneus, corpore oblongo, subtus villoso rufo, *thorace tuberculato*, elytris striato punctatis.

55. *Armiger*, der *Krainsche Waffenträger.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 78. No. 16.

Thorax *spinas* quatuor, caput e medio *spinam* se longiorem educit.

56. *Violaceus*, der *Russische violette Käfer.*

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 208.

Scar. parvus, totus *violaceus*, maxillis prominentibus, fronte declivi, *thorace 6. spinoso.*

57. *Dubius*, *Scopolis Kolbenkäfer.*

Scop. Entomol. carn. No. 4. Thorax cum elytris striatis glabris punctatus. Corpus subtus saltem atrocoeruleum.

Scar. *bilobo* similis, sed duplo minor. Thorax *tuberculis duobus* approximatis; *cornu* capitis indivisum.

Füesslins Verz. S. 2. No. 23.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 11. *)

II. *Neue Käferarten mit ungehörntem Bruststück und gehörntem Kopf.*

1. *Goliathus*, der *indianische Prinz.*

Müller's

*) *Sulzer* rechnet zwar diesen Käfer unter die Muticos; nach der Beschreibung aber hat er sowohl am Brustschilde als am Kopfe Höcker und ein Horn.

Müllers Supplem. B. S. 216. No. 89. der *Goliathskäfer.*

Sulzers Gesch. S. 16. t. 1. f. 2. *Goliath.*

Linn. Mantiss. p. 530. Scutellatus, thorace inermi, *capite rostro bifurco.*

Drury Ins. Tom. I. t. 31.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. p. 34. No. 151. t. 22. f. 151. *Caicus ingens;* le *grand Cacique;* de *groode Cacike.* *)

Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 41. Scutellatus, thorace inermi, clypeo *bifurco.*

2. *Rhinoceros minor*, das *kleine indianische Nashorn.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 28. No. 119. t. 18. f. 119. Le *petit Rhinoceros;* de *kleine Nashoorn.*

Violaceo - ruber, margine thoracis elytrorumque nigro, capitis *cornu* peracuto.

3. *Rhinoceros occidentalis*, das *schwarze westindische Nashorn.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 29. No. 123. t. 19. f. 123. Le *Rhinoceros noir; de Renoster.*

Thorace

*) *Voet* hat ihn in der Ordnung der *Erdkäfer* folgen lassen, erinnert aber selbst, dass er unter die *Blumenkäfer* gehöre; doch konnte er ihm, da diese schon abgestochen waren, keinen andern Platz geben. Er nennet ihn den grosen *Kaziker*, wei die Indianer ihre Prinzen so zu nennen pflegen. Bey seinem etwas kleineren Exemplar sind die Flügeldecken *perlmutterfarbig*; bey dem gröfsern *Druryschen* aber, davon das *Sulzersche* eine Kopie ist, dunkel rothbraun, aus dem mitternächtlichem Afrika, das *Voetsche* aus Amerika.

Thorace eleganter variegato; capitis *cornu* breviusculum, paullulum resupinatum in tergum.

4. *Spinifer hispidus minor*, der *ostindianische kleine Dornträger.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 32. No. 138. t. 20. f. 138. Le *petit porte-épine velu*; de *ruige kleine Doorndrager.*

In capite *spinula minuta.* Totus livido-niger; elytra leviter costata.

5. *Spinipes Noveboracensis*, der *Neuyorkische Dornträger.*

Drury Ins. Tom. I. t. 35. f. 6. Totus niger, *thorace* marginato elevato, tuberoso, *capite* lato obtuso, *cornutulo* recurvo; cruribus admodum spinosis.

6. *Pensylvanicus*, der *Geerische Pensylvanier.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 308. No. 5. t. 18. f. 12. *Scarabé de Pensylvanie.*

Scutellatus, capite nigro *tuberculo* vnico, thorace elytrisque laevibus olivaceis, maculis punctisque nigris.

7. *Ebenus*, der *surinamische Ebenholzfarbige Käfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 317. No. 9. t. 19. f. 1. *Scarabé d'ebene.*

Scutellatus, ater, oblongus, convexus, laevis, thorace antice cavitate impresso, *capite bituberculato.*

8. *Oculatus*, *Skopolis Rothauge.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 81. No. 21.

Niger; *caput* antice bidentatum, *tuberculo* medio parvo. Oculi *rufi.*

Gronov.

Gronov. Gazoph. p. 143. No. 422. t. 15. f. 9. 10. Ater, opacus, thorace mutico, elytris rugosis, *capite* clypeato, emarginato, *cornu minimo.*

9. *Barbarossa*, der *neuholländische Rothbart.*

Fabric. S. E. p. 12. *Scar.* 35. Scutellatus thorace inermi, antice scabro, *capitis cornu* recurvo brevi.
Mus. Dom. *Banks.*

10. *Satyrus*, der *nordlich amerikanische Satyr.*

Fabric. S. E. p. 12. *Scar.* 36. Scutellatus, thorace inermi, antice truncato, *capitis cornu* recurvo.
Major *Nasicorni.*
Mus. Dom. *Banks.*

11. *Jamaicensis*, das *Jamaische Nashorn.*

Drury Ins. Tom. I. t. 34. f. 1. 2. *)
Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 37. Scutellatus, thorace inermi, antice retuso, *capitis cornu* recurvo, elytris substriatis.

12. *Silenus*, der *pechschwarze Silen.*

Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 38.
Scutellatus, thorace inermi, antice excavato, capitis *cornu* recurvo, elytris laevissimis.

13. *Syrichtus*, der *amerikanische Rundschild.*

Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 39. Scutellatus, thorace inermi *rotundato*, *capitis cornu* recurvo.

14. *Hircus*, der *Tranquebarische Bock.*

*) S. meine Anmerk. bey *Carolinus* Linn. No. 16.

Fabric. S. E. p. 13. *Scar.* 42. Scutellatus, *thorace* inermi scabro, *capite* linea transversa carinata, clypeo bidentato.

15. *Farctus*, der *Pensylvanische Wurstkäfer.*

Fabric. S. E. p. 14. *Scar.* 43. Scutellatus brunneus, *capite subbicorni*, elytris punctato-striatis, apice nigris.

Capitis clypeus ferrugineus quasi e *squamis tribus imbricatis* compositus.

16. *Piceus*, der *indianische Pechkäfer.*

Fabric. S. E. p. 14. *Scar.* 44. Scutellatus, *piceus*, thoraci inermi glabro, *capite subbicorni*, elytris striatis.

17. *Sphinx*, der *afrikanische Sphinx.*

Fabric. S. E. p. 14. *Scar.* 45. Scutellatus, thorace inermi quadripunctato, *capite tuberculato*, tarsis anticis nullis.

18. *Terrestris*, der *englische kleine Erdwühler.*

Fabric. S. E. p. 15. *Scar.* 48. Scutellatus, thorace inermi, *capite tuberculis tribus* aequalibus, elytris substriatis.

19. *Testaceus*, der *muschelbraune englische Käfer.*

Fabric. S. E. p. 15. *Scar.* 50. Scutellatus, testaceus, *capite bituberculato*, elytris punctato-striatis.

20. *Bicolor*, der *deutsche Rothafter.*

Fabric. S. E. p. 15. *Scar.* 51. Scutellatus, thorace subinermi, *capite tuberculo* vnico, elytris nigris, *abdomine rufo.*

21. *Sor-*

21. *Sordidus*, der *englische graue Schmutzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 16. *Scar.* 55. Scutellatus, *capite tuberculato*, thorace nigro, margine pallido, puncto nigro, elytris griseis.

22. *Bonasus*, der *Tranquebarische dreygehörnte Kopf.*

Fabric. S. E. p. 23. *Scar.* 90. Exscutellatus, thorace prominentia duplici, *capite tricorni*, lateralibus majoribus arcuatis.

23. *Sagittarius*, der *kapensische Pfeilträger.*

Fabric. S. E. p. 24. *Scar.* 92. Exscutellatus, thorace antice mucronato, *capitis cornu solitario* erecto.

24. *Bucephalus*, der *indianische Ochsenkopf.*

Fabric. S. E. p. 24. *Scar.* 93. Exscutellatus, thorace retuso, quadridentato, capitis clypeo angulato *unicorni.*

25. *Sphinx*, der *amerikanische Dornfuss.*

Drury Ins. Tom. I. t. 35. f. 8. Scar. *spinipes.*

Fabric. S. E. p. 25. *Scar.* 98. Exscutellatus, thorace inermi, punctis quatuor impressis, *capitis cornu* recurvo bidentato.

26. *Sulcator*, der *Kayennische Höckerkopf.*

Fabric. S. E. p. 27. *Scar.* 106. Exscutellatus, ater, *capitis tuberculo unico*, elytris striatis.

27. *4-pustulatus*, die *neuholländische Vierblatter.*

Fabric. S. E. p. 27. *Scar.* 107. Exscutellatus, ater, thorace inermi, *capite bituberculato*, elytris maculis duabus *rubris.*

28. *Verticicornis*, das *englische Scheitelhorn.*

Fabric. S. E. p. 27. *Scar.* 105. Exscutellatus, thorace inermi griseo nigro-punctato, *capitis cornu* erecto brevissimo.

29. *Cristatus*, der *ägyptische Buschschild.*

Fabric. S. E. p. 27. *Scar.* 108. Exscutellatus, niger, thorace inermi *crenato*, clypeo tuberculato quadridentato.

30. *Hylax*, der *afrikanische Hylax.*

Fabric. S. E. App. p. 817. Scutellatus, thorace inermi, *capitis cornu* emarginato, tibiis posticis brevissimis, apice spinosis.

31. *Bidens*, der *asiatische Zweyzack.*

Pallas Reis. durch Russl. 1. Th. Anh. No. 24. *Ausz.* 1. Th. Anh. S. 9.

Magnitudo *stercorarii.* Thorax inermis punctulatus; *mas* galea antice bidentata, verticis centro gemino *subcornuto.*

32. *Humerosus*, der *asiatische Schulterkäfer.*

Pallas Reisen 1. Th. Anh. No. 25. *Ausz.* Anh. S. 10.

Magnitudo *Lunaris*, coprideus, Thorax inermis. Galea lineis eminentibus, in qua centrum *cornutum.*

Müllers Supplem. B. S. 215. der *Schulterkäfer.*

33. *Ater*, der *Geerische schwarze Käfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 270. No. 16.

Scutellatus niger totus, corpore abbreviato, *capite tuberculis tribus*, elytris laeviter striatis.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 450. Niger, nitidus, *capite tuberculo triplici*, elytris striato-punctatis, pedibusque piceis.

34. *Subarator*, der *Pflüger*.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 455. Niger, thorace subconvexo, *capite tuberculis tribus*, elytris striatis punctatisque.

35. *Distinctus*, der *schwarze Punktfleck*.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 53. No. 456. Niger, *capite tuberculo triplici*, elytris striatis lividis, nigro-maculatis.

III. *Ungehörnte Käfer.*

1. *Tetradactylus*, der *Jamaische Vierfinger*.

Linn. Mantiss. p. 530. Scutellatus niger, muticus, *pedibus triunguiculatis*, pollice fixo.

Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 7.

Sloane Jam. Tom. II. t. 237. f. 2. Scar. *major niger*.

Fabric. S. E. p. 49. *Cetonia* 29.

Atra, scutello elytris dimidio breviore, pedibus *triunguiculatis*.

Müllers Supplem. B. S. 216. der *vierfingrige Käfer*.

2. *Scorticorium*, der *Chagrinrücken*.

Voet. Scar. *Terric.* p. 32. No. 136. t. 20. f. 136. Le *Dos chagriné*; de *Segrynrug*.

Totus obscure spadiceus, fulgore quodam livido. Sculteilum dorsuale instar *corii crudi* sive *scorti*.

3. *Digitalia*, der *westindische Fingerhuth.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 32. No. 137. t. 20. f. 137. Le *Dé à coudre;* de *Vingerhoed.*

Copris obscure spadiceus. Scutellum dorsuale multis *Scrobulis*, in formam *Digitalium* interstinctum.

4. *Chamaeleon*, der *westindische Chamäleon.*

Voet. Scar. Terric. p. 32. No. 139. t. 21. f. 139. Le *Chamaeleon.*

Tantopere inter se differunt colore, vt alii vulgarem *viridem*; alii, vti noster, *igneum fulgorem* referant; *antennis* et *cruribus* splendore viridi-nigro.

5. *Vagabundus ruber*, der *holländische rothe Husar.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 32. No. 141. t. 21. f. 141. Le *Vagabond rouge;* de *roode Dwaaler.*

Elytra badio colore et tenuiter costata, cetera nigra; in obsoleta vel recenti *fimo* bovino aut equino.

6. *Errabundus niger*, der *holländische schwarze Husar.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 142. t. 21. f. 142. Le *vagabond noir;* de *zwarte Dwaaler.*

Totus nigro-splendens; *dorso* laevigato, *elytris* tenuiter costatis.

7. *Errabundus lividus*, der *gelbe Husar.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 143. t. 21. f. 143. Le *Vagabond pourpré;* de *Paarsche Dwaaler.*

Elytra sordide livida; ceterum ex nigro splendens.

8. *Errabundus interpunctatus*, der *holländische punktirte Husar.*

Voet.

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 144. t. 21. f. 144. Le *Vagebond pointillé;* de *gespikkelde Dwaaler.*

Elytra cinerea tenuiter costata, *punctis nigris* interstincta.

9. *Errabundus canus*, der *graue Husar.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 145. t. 21. f. 145. Le *Vagabond gris;* de *gryze Dwaaler.*

Capite et *dorsi scutello* nigro-coruscans; *elytris cruribusque* sordide luteus.

10. *Errabundus maculosus*, der *bunte Husar.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 146. t. 21. f. 146. Le *Vagabond tacheté;* de *gevlakte Dwaaler.*

Capite dorsoque nigro-coruscis, *elytris* non adeo sordide-luteis; postica elytrorum parte fusci coloris.

11. *Nasospurcus*, die *Drecknase.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 147. t. 21. f. 147. Le *Museau sale;* de *Vuilneus.*

*Capite, dorso, elytris*que durissimis, prioribus nigro-coruscis, posterioribus fulvis; in fimo equino.

12. *Nanus*, der *Zwerg.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 33. No. 148. t. 21. f. 148. Le *Nain;* het *Dwergje.*

Totus niger; Scarabaeorum *minutissimus.*

13. *Vaginosus*, die *Spitzscheide.*

Voet. Scar. *Terric.* p. 23. No. 149. t. 21. f. 149. L'*etui pointu;* de *Spitskoker.*

Capite tergoque ex nigro splendente; *crura* obscure - cinerea; *elytra* in fine insigniter *acuminata*, in vtroque bina puncta.

14. *Fulvus*, der *braunrothe Mistkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 90. *Copris* 6. Le *Bousier fauve.*

Fulvus, capite aeneo, thoracis vtrinque cavitate laterali fusca.

15. *Geoffroae*, *Geoffrois-Kolbenkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 91. *Copris* 8. Le *Bousier à couture.*

Niger, capite clypeato, *elytris* margine exteriore *sinuatis.*

Füesslins Verz. S. 2. No. 14.

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 7. *Geoffrois Käfer.*

16. *Perlatus*, der *geperlte Käfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 78. *Scar.* 11. le *Scarabé perlé.*

Ater, *punctis elevatis*, per strias digestis.

17. *Ruricola*, der *Feldkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 80. *Scar.* 15. Le *Scarabé à bordure.*

Niger, elytris croceis *margine nigro.*

Fabric. S. E. p. 38. *Melolontha* 30.

Atra sericea, elytris rufis, *margine* nigro.

Füesslins Verz. S. 3. No. 37. der *Schwarzrand.*

18. *Villosus*, der *gescheckte rauche Harlekin.*

Geoffr.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 81. *Scar.* 17. *L' Arlequin velu.*

Villoſus, albo, nigro flavoque irregulariter *variegatus.*

19. *Niger hirſutus*, das *ſchwarze Rauchkäferchen.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 84. *Scar.* 23. Le *Velours noir.*

20. *Ferruginoſus*, der *Ruſsfarbige Käfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 84. *Scar.* 24. Le *Scarabé couleur de Suie.*

Ater, thorace ſubvilloſo, *elytris* fuſcis ſtriatis.

21. *Cineraſcens*, der *braune Chagrinkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 84. *Scar.* 25. Le *Scarabé brun chagriné.*

Atro-fuſcus, ſupra veluti cineraſcens, antennis pedibusque fuſcis *lamellis antennarum longis*, elytris ſtriatis.

22. *Sulcatus*, der *gefurchte Käfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 86. *Scar.* 29. Le *petit Scarabé noir ſtrié.*

Niger, pedibus rufis, *elytris profunde ſtriatis.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 467. *Sulcatus*, ſubater, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.

23. *Philanthus*, der *Blumenfreund.*

Füeſslins Verz. S. 3. No. 28.

Sulzers Geſch. S. 18. t. 1. f. 8.

Cervino-fuſcus, argenteo-pulverulentus; pedibus poſticis longiſſimis *vniunguiculatis.*

24. *Pel-*

24. *Pellucidulus*, der *graubündtische Durchsichtige.*

Sulzers Gesch. S. 18. t. 1. f. 9.

Füesslins Verz. S. 3. No. 35. *Sulzers Kolbenkäfer.*

Rubescens; sericeus; tenuiter scutellatus; *elytris* striatis; *corpore* ovato, pedibusque filiformibus.

25. *Cordiger*, der *Herzträger.*

Füesslins Verz. S. 3. No. 38.

Niger; *elytris* fulvis, in medio macula nigra *cordiformi.*

26. *Aeneus*, der *holländische grüne Heukäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 277. No. 22. t. 10. f. 16. *Scarabé cuivreux.*

Scutellatus viridis nitidus, *elytris* sulcatis.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Arboric.* p. 16. No. 58. t. 7. f. 58. *Fenisex viridis vernacula;* le *Haneton vert du Foin Hollandois;* de *groene inlandsche Hooikever.*

27. *Tuberculatus*, der *Pensylvanische Höckerflügel.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 317. No. 10. *Scarabé à tubercules.*

Scutellatus oblongus griseo-cinereus, *elytris tuberculis pilosis*, femoribus anticis maximis, capite recondito.

28. *Nanus*, der *Surinamische Zwerg.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 318. No. 11. t. 19. f. 3. *Scarabé Nain.*

Scutellatus oblongus nigro-fuscus *capite* lato, *elytris* striatis, *antennis rufis.*

29. *Ni-*

29. *Nigrocephalus*, der *Surinamische Schwarzkopf.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 321. No. 14. t. 19. f. 6. *Scarabé à tête noire.*

Scutellatus rufo-lividus, *capite* rufo, poſtice nigro, *corpore* oblongo, ſubtus fuſco.

30. *Marginatus*, der *oſtindianiſche bordirte Käfer.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 324. No. 17. t. 19. f. 10. *Scarabé à bordure.*

Scutellatus niger, *thorace elytrisque faſcia* marginali flavo-fulva.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 5. No. 4. t. 1. f. 4. *Orphanus; l'Orphelin;* de *Weesjonge.*

31. *Carbonarius*, der *Köhler.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 324. No. 24. *Scarabé charbonné.*

Scutellatus totus niger nitidus, *corpore* depreſſo, *elytris* glaberrimis, areis excavatis.

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 7. No. 20. t. 3. f. 20. *Coracinus hirtipes;* le *Noir-luiſant à pattes velues;* de *zwart blinkende Ruigpoot.*

32. *Orphanulus*, das *oſtindianiſche Wayſenkindlein.* *)

Voet. Scar. ord. 1. gen. 1. *Floric.* p. 5. No. 5. t. 1. f. 5. Le *petit orphelin;* het *Weeskind.*

Similis *marginato* No. 31. ſed minor, magisque glaber. *Elytris* dimidia parte *nigris*, dimidia *alteris.*

33. *Au-*

*) v. No. 111.

33. *Auratus*, der *ostindianische Goldkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 5. No. 6. t. 1. f. 6. *l' Orangé;* de *Oranje.*

*Tergo, elytris*que solide auriacis, non tamen fulgentibus; *capite, cruribus* et *abdomine* nigris ac fulgentibus.

34. *Rubra Tigris*, der *ostindische rothe Tiger.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 5. No. 7. t. 1. f. 7. Te *Tigre rouge;* de *roode Tyger.*

Totus *auriacus*, nigro-maculatus.

35. *Antheus*, der *ostindische schwarz und weiss geblümte Blumenkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 5. No. 8. t. 1. f. 8. Le *Fleuronne;* de *Gebloemte.*

Rarus *Floricola*, eximie coruscans, nigro-albus. Maculae albae instar *Marcasitae.*

36. *Cinctatus*, der *ostindische Gürtelkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 5. No. 9. t. 2. f. 9. le *Bandé;* de *gebande.*

Rarus, aeneus seu metallicus, oblique per elytra *cingulo* quodam amplo, splendide aureo.

37. *Holosericus*, der *ostindianische Sammetkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 6. No. 10. t. 2. f. 10. le *Velouté;* de *Fluwele.*

Inter *pulcherrimos* referendus, niger et luteus, refert holosericum nigrum, et flavens sericum densius bombycinum.

38. *Fusco-ruber*, der *braunrothe Blumenkäfer.*

Voet.

Voet. Scar. *Floric.* p. 6. No. 12. t. 2. f. 12. Le *Rouge-brun;* de *Bruinroode.*

Totus coloris obtuse et obscure *fusco-rubei.*

39. *Folium mortuum*, der *fahlbraune Blumenkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 6. No. 13. t. 2. f. 13. la *Feuille morte;* de *Feuljemorte.*

*Antennis capite*que nigro; *oculis* nitide fuscis; *dorso* integro fulgente; *disco* spadiceo, vtrinque nigro.

Rarissimus.

40. *Lugubris*, der *deutsche Trauerkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 6. No. 14. t. 2. f. 14. Le *Lugubre;* de *Rowdrager.*

Totus niger, et sine splendore.

41. *Refulgens lugubris*, der *Schwarzglanz.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 7. No. 15. t. 2. f. 15. Le *Lugubre luisant;* de *blinkende Rouwdrager.*

Supra et infra nitide ater, *refulgens.*

42. *Setiger viridis*, der *surinamische grüne Borstenträger.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 7. No. 17. t. 3. f. 17. Le *Brossard vert;* de *groene Borsteldrager.*

Elytris nitide-virentibus, ad latera pilis luteis *setaceis*, per fasces dispositis.

43. *Histrio fulvus*, der *amerikanische gelbe Harlekin.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 7. No. 18. t. 3. f. 18. *L' Arlequin jaune;* de *geele Harlequyn.*

Totus

Totus luteo-ater, discolor, exceptis *antennis*, *cruribus*que nigris.

44. *Histrio ruber*, der *rothe Harlekin.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 7. No. 19. t. 3. f. 19. *L'Arlequin rouge;* de *roode Harlequyn.*

Antennis, *cruribus*, et toto subtus *corpore* fulgido-atro. Superius totus *aureo-ruber*, subtiliter nigro-marmoratus.

45. *Lugubris crassus*, der *deutsche dicke Trauerkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 8. No. 21. t. 3. f. 21. Le *gros lugubre;* de dikke *Rouwdrager.*

Totus niger, in dorso striatus, pro magnitudine longe *crassior.*

46. *Maculosus Isiquebensis*, der *Issequebische Buntfleck.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 8. No. 22. t. 3. f. 22. Le *marqueté d'Issequebo;* de *gespikkelde Isiqueebse.*

Colore flavo, *maculis* adspersis nigris.

47. *Turchesinus*, der *Türkiskäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 8. No. 24. t. 3. f. 24. La *Turquoise;* de *Turkooische.*

Egregii hujus Scarabaei *color* vix describendo est, aut depingendo.

48. *Smaragdinus minor*, der *kleinere Smaragdkäfer.* *)

Voet.

*) v. No. 62.

Voet. Scarab. *Floric.* p. 9. No. 25. t. 4. f. 25. La *petite Emeraudine;* de *kleine Smaragdyner.*

49. *Aerugineus*, der *Jamaiſche Kupferkönig.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 9. No. 26. t. 4. f. 26. La *Fleur de cuivre;* de *Koperbloem.*

Refert colorem *florum aeris*, ſeu viridis montani.

50. *Pyropus*, der *Jamaiſche Feuerkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 9. No. 27. t. 4. f. 27. Le *Scarabé ardent;* de *Gloejende.*

Fruſtra laborares in depingendo igneo, flammasque imitante *rubore*; *ſcintillat* etiam.

51. *Igneus*, die *glüende Kohle.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 9. No. 28. t. 4. f. 28. Le *Braſier;* de *Vuurige.*

Depaſcit *Roſas*, et adeo coruſcat, vt radiis ſolis expoſitus ruborem *candentium carbonum* referat.

52. *Tonkaeus*, der *Tonkakäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 9. No. 29. t. 4. f. 29. Le *Tonka.*

Totus *fuſcus*, adſperſis *nigris maculis*; *elytris* ad imum ex nigro marginatis.

53. *Tonkaeus maculoſus*, der *gefleckte Tonkakäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 9. No. 30. t. 4. f. 30. Le *Tonka tacheté;* de *gevlakte Tonka.*

Priori convenit, exceptis duabus praeacutis *cuſpidibus* ſeu ſpinis ad ima elytra. Forſan prioris *femina.*

54. *Lanugithorax*, die *deutsche Wollbrust.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 31. t. 4. f. 31. Le *Poitrine du Duvet;* de *Donsborst.*

Totus niger; pectore et lateribus ventris densis *pilis* albis, *lanuginem* referentibus.

55. *Maculosus germanicus*, der *deutsche Fleckkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 32. t. 4. f. 32. Le *Madré d'Allemagne;* de *Duitsche gespikkelde.*

Perobscure *viridis; tergo* et *elytris* adspersis multis *maculis;* supra et infra *albo-pilosus.*

56. *Hispidosus*, der *deutsche Fuchs.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 33. t. 4. f. 33. La *Robbe velue;* de *Ruigrock.*

Totus *fusco-niger*, vbique fere tam dense *pilis rufis* stipatus, vt *rufus* appareat.

57. *Talpa*, der *kapensische Maulwurf.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 35. t. 5. f. 35. La *Taupe;* de *Mol.*

Totus *hispidus*, rarissimus; adeoque *pilis* lividis obsitus, vt caput a dorso vix discernas.

58. *Barbatulus*, der *ostindische Flachsbart.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 36. t. 5. f. 36. La *Barbe de Lin;* de *Vlasbaard.*

Lino subtilissimo vestitus.

59. *Pennicrusta*, die *Flügelzange.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 10. No. 37. t. 5. f. 37. *L'Etuis piquant;* de *Pensschaal.*

Elytris

Elytris *tuberculatis*; colore laevigati *Sinci*, vel pyritae politi.

60. *Hispido - lugubris*, der *schwarze Chagrinkäfer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 11. No. 38. t. 5. f. 38. *Le deuil fourré*; de *ruige Rouwdrager*.

Elytra *quadrata*; Totus superne coloris anthracii, et tanquam *corii crudi* ruditatem imitatur.

Rarissimus.

61. *Dorso-discolor*, der *ostindische Buntrücken.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 11. No. 39. t. 5. f. 39. Le *dos bigarré*; de *Bontrug*.

Capite et *dorso* spadiceo et subflavo colore. Thoracis et abdominis infra *annuli* discolores.

62. *Smaragdinus major*, der *grosse indianische Smaragdkäfer.* *)

Voet. Scar. *Floric.* p. 11. No. 40. t. 5. f. 40. La *grande Emeraudine*; de *groote Smaragdyner*.

Floricolarum *maximus*; splendor et pulchritudo depingi non potest.

63. *Cursor niger*, der *deutsche schwarze Läufer.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 11. No. 41. t. 5. f. 41. Le *Coureur noir*; de *zwarte Looper*.

Totus ex atro fulget, *elytris* subtiliter crenulatis.

64. *Cursor maculatus*, der *deutsche gefleckte Läufer.*

*) v. No. 48.

Voet. Scar. *Floric.* p. 11. No. 42. t. 5. f. 42. Le *Coureur à poiuts blancs;* de *gespikkelte Looper.*
Elytris albo-maculatis; fortasse *Mas* prioris.

65. *Pullus maculosus*, der *Jamaische schwarzgefleckte braune Blumenkäfer.* *)

Voet. Scar. *Floric.* p. 12. No. 44. t. 5. f. 44. Le *Grison à points noirs;* de *gespikkelde Grauwe.*
Elytra cana passim et dense punctata.

66. *Vernalis americanus*, der *amerikanische grünliche Laubkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 14. No. 47. t. 6. f. 47. Le *Haneton de Indes Occidentales;* de *westindische Meikever.*
Capite, dorso et toto infra corpore *viridi-splendente;* magnitudine et forma nostrae Melolonthae.
Foemina.

67. *Hispido-vernalis*, der *Franckfurthische rauche Maykäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 14. No. 50. t. 6. f. 50. Le *Haneton velu;* de *ruige Meikever.*
Spissior longiorque nostrate, *colore obscure-fulvo;* scutello lumbari magis *hirsuto*, pilisque seu setis albis vestito; *antennae trinis* tantum foliatis articulis.

68. *Tenuicrusta lividus*, der *holländische violette dünnschaalichte Maykäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 15. No. 54. b. t. 7. f. 54. b. Le *Haneton pourpre à etuis minces;* de *Paarsche Dunschaal.*

Rarus,

*) v. No. 77. *Lanius Linn.*

Rarus, colore furvo-ianthino, *elytris* tenuibus rubeo-lividis.

69. *Fenisex fuscus*, der *holländische braune Heukäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 15. No. 55. t. 7. f. 55. Le *Haneton brun du Foin;* de *bruine Hooikever.*

In *Fenisecio*, ardente sole, in *Belgio* frequens, tarde volans, et venatui facilis, capite dorsoque *obscure-viridis*, *elytris* eleganter fuscis.

70. *Fenisex americanus*, der *Surinamische Heukäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 56. t. 7. f. 56. Le *Haneton du foin americain;* de *westindische Hooikever.*

Viridi-splendens; *elytris* subtiliter crenulatis.

71. *Fenisex americanus coeruleus*, der *westindische blaue Heukäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 57. t. 7. f. 57. Le *Haneton bleu du Foin americain;* de *blaauwe westindische Hooikever.*

Rarus; elytris obscure-*coeruleis.*

72. *Fenisex viridis vernacula*, der *grüne holländische Heukäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 58. t. 7. f. 58. Le *Haneton vert du Foin hollandois;* de *groene inlandische Hooikever.*

Totus viridis; *cruribus antennisque* instar cupri infuscati.

73. *Auricolor*, der *neuyorkische Goldkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 59. t. 7. f. 59. Le *Haneton doré;* de *Gulde Kever.*

Adverso sole *aureum* refert colorem cum fulgore ex viridi.

74. *Junius americanus*, der *amerikanische Juniuskäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 60. t. 7. f. 60. Le *Haneton de Juin americain;* de *westindische Junykever.*

Capite dorsoque obscure-viridi-fulgentibus; *elytris* eleganter subfuscis, binis lineolis nigricantibus. Totus *canis pilis* hispidus.

75. *Gracilipes*, der *neuyorkische Dünnfuss.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 61. t. 7. f. 61. Le *Haneton à pattes grêles;* de *Dunpoot.*

Capite dorsoque fulgido-atris; *elytris* fulgido-spadiceis; *cruribus* pro corpore mirabiliter *exilibus.*

76. *Murrinus discolor*, der *westindische buntscheckige Porzellankäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 16. No. 62. t. 8. f. 62. La *Porcellaine bigarrée;* de *bonte Porceleine.*

Elegantissimus, *capite* fulgido-viridi; *antennis* fuscis; *elytris* leviter fuscis ex viridi micantibus.

77. *Pannipes*, der *Surinamische Lappenfuss.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 17. No. 64. t. 8. f. 64. Le *Patte-Lame;* de *Lappoot.*

Totus *fulgido-viridis; pannis* ad vngues pedum sex singulorum, quos *maribus*, femellas, instar vasorum murrinorum glabras, conscendentibus, vt horum ope-

ra

ra iis firmius adhaerescant, prodesse verosimillimum.

78. *Nov-eboracus viridis*, der *prächtig grüne neuyorkische Laubkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 17. No. 66. t. 8. f. 66. Le *Haneton vert de la nouvelle York;* de *groene Nieuwjorker.*

Superne hilare *viridis; antennis oculisque* spadiceis; *abdomine cruribusque* tanquam ex fulgido *chalcorubris.*

79. *Betulicola germanicus*, der *deutsche Birkenkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 17. No. 67. t. 8. f. 67. Le *Haneton allemand du Bouleau;* de *Duitsche Berkenkever.*

Capite dorsoque obscure-viridi nigricantibus; *elytris* superne luteis, marginibus maculisque nigris, *cruribus* obscure-viridibus.

80. *Quercicola germanicus*, der *deutsche Eichenkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 68. t. 8. f. 68. Le *Haneton allemand du Chêne;* de *Duitsche Eikenkever.*

Superius colore subfusco, *inferius* ex pilis cinereo.

81. *Betulicola hispidus*, der *holländische rauche Birkenkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 69. t. 8. f. 69. Le *Haneton velu du Bouleau;* de *ruige Berkenkever.*

Colore *subfusco* elegantiore priore, *capite dorsoque* et toto infra corpore *pilis cinereis* hirsutus.

82. *Betulicola gallicus*, der *französische Birkenkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 70. t. 9. f. 70. Le *Haneton françois du Bouleau;* de *franſche Berkenekever.*

Nostrati *Junio* persimilis, *corpore* tenuior ac glabrior.

83. *Venator*, der *deutsche Jäger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 71. t. 9. f. 71. Le *Chasseur;* de *Jager.*

Crura oblonga ac procera, in cursitando velox, *antennis* cruribusque subfusci coloris, ceterum *viridis.*

84. *Venator discolor*, der *deutsche buntscheckige Jäger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 72. t. 9. f. 72. Le *Chasseur bigarré;* de *bonte Jager.*

Fortasse antecedentis *femella;* colore magis *prasino*, elegantissime variegatus spadiceis maculis; infra tenuissimis *pilis* obsitus.

85. *Venator coeruleus*, der *französische blaue Jäger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 73. t. 9. f. 73. Le *Chasseur bleu;* de *Blauwe Jäger.*

Totus *coeruleus*, ceteroquin priori similis.

86. *Mus niger*, die *schwarze Maus.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 74. t. 9. f. 74. La *Souris noire;* de *zwarte Muis.*

Rariss-

Rarissimus; supra et infra hispidus, vt *murem* conspicere videaris.

87. *Mus cinereus*, die *aschfahle Maus.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 75. t. 9. f. 75. La *Souris grise;* de *grauwe Muis.*

88. *Mus fuscus*, die *braune Maus.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 18. No. 76. t. 9. f. 76. La *Souris brune;* de *Bruine Muis.*

89. *Omber discolor*, der *Isequebische bunte Omberkäfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 19. No. 77. t. 9. f. 77. Le *Scarabé de couleur d'ombre, bigarre;* de *bonte Omberkever.*

Totus laevis, non-splendens; pedes anteriores crassis robustisque *vngulis* instructi.

90. *Baccicolor*, der *westindische Beergelbe Käfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 19. No. 78. t. 9. f. 78. Le *Hanetон des Bayes;* de *Bessenkever.*

Totus colore ravido, haud absimilis aquatico, qui exprimitur e germanicis *baccis luteis.*

91. *Tetricus*, der *Braunschatten.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 19. No. 79. t. 9. f. 79. Le *Sombre.*

Capite subfusco, scutello dorsuali furvo; *elytris* analogice discoloribus; *glaber* et aliquantulum refulgens.

92. *Tuberoculus*, das *Isequebische Hökerauge.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 19. No. 80. t. 9. f. 80. *L'oeil saillant;* de *Puiloog.*

Lutei oculi vehementer extuberantes; *capite* atro; *dorso* fulgente, tanquam ex rubro aere; *elytris* luteis.

93. *Aurilinea*, die *Surinamische Goldlinie.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 20. No. 81. t. 9. f. 81. *Le Rayé; het Streepje.*

Refulgens ex fulvo maculis subluteo rubris; *lineola aurea* supra *cranium* et *dorsum* insignitus.

94. *Albiventer*, der *deutsche Weissbauch.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 20. No. 82. t. 9. f. 82. *Le Ventre blanc;* de *Witbuik.*

Forma quadrata; totus niger; *thorace* et *ventre* lana alba, seu molliculis pilis obsitus.

95. *Insignifer*, der *französische Livreträger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 20. No. 83. t. 10. f. 83. *Le Haneton en Livrée;* de *Livereidraager.*

Capite et *scutello* dorsuali nigris, *elytris* fuscis, ad eorumque latera *taeniola* subviridis, ex pilis luteis exilibus, docente microscopio, composita.

96. *Trigonus*, der *Isequebische Triangel.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 20. No. 84. t. 10. f. 84. *Le Triangle;* de *Driehoek.*

Totus *obscure-viridis;* in margine triangularis parvi scutelli dorsualis *trigonum* habet coloris auriaci.

97. *Niger unungulus ex India occidentali*, die *schwarze ostindische Einklaue.*

Voet.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 20. No. 85. t. 10. f. 85. Le *Haneton noir americain à un onglet;* de *westindische zwarte Eennagel.*

Totus supra colore *coracino;* singula crura *una* duntaxat *vngula.*

98. *Vnungulus*, die *holländische Einklaue.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 21. No. 86. t. 10. f. 86. Le *Haneton à un onglet;* de *Eennagel.*

Capite et dorsuali scutello obscuriſſime viridibus glabrisque; *elytris* crenulatis et eleganter fuscis.

99. *Vnungulus longipes*, der *holländische einklauige Langfuss.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 21. No. 87. t. 10. f. 87. Le *longue Patte à un onglet;* de *Langpootte Eennagel.*

Capite ac *scultello dorsuali* obscure viridibus; *elytris* magis subviridibus; *cruribus* fuscis. Figura crurum posticorum nova et rara, insigniter *longa.*

100. *Semicrusta*, die *holländische Halbschaale.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 21. No. 88. t. 10. f. 88. Le *Demi-etui;* de *Halfschaal.*

Totus e nigro alboque discolor; *elytris* tres modo quartas partes corporis tegentibus.

101. *Caudiger major*, der *grosse Schwanzträger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 21. No. 89. t. 10. f. 89. Le *grand Haneton à queue;* de *grootte Staartkever.*

Abdomine *spiculo* corneo acuto.

102. *Caudiger minor*, der *kleine Schwanzträger.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 21. No. 90. t. 10. f. 90. Le *petit Haneton à queue;* de *kleene Staartkever.*

Eadem

Eadem cum priore forma, modo tenuior et minus *discolor*.

103. *Spilophthalmus*, das *Buntauge*.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 22. No. 91. t. 10. f. 91. *L'oeil bigarré;* de *Bontoog*.

Totus colore perluteo, maculis *fusco-nigris*. *Oculi* sphaeroidei discolores. *Rarissimus*.

104. *Antennodensus*, das *Issequebische dicke Fühlhorn*.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 22. No. 92. t. 10. f. 92. Le *Haneton à grosses antennes;* de *Diksprietkever*.

Totus egregie *aureus*, maculis nigris consperſus. Antennarum *clavis* crassioribus rotundis.

Rarissimus.

105. *Monachus cinereus*, der *ostindianische graue Mönch*.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 22. No. 93. t. 10. f. 93. Le *Moine gris;* de *grauwe Monnik*.

Totus *cinereus*, infra fuscus; *capite*, *dorso*, *elytrisque* tuberculorum plenis; *antennae* insolitae figurae; prope caput antrorsum *crista* ex longis pilis constans.

Rarissimus.

106. *Maurus*, der *Mohr*.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 22. No. 94. t. 11. f. 94. Le *More;* de *Moor*.

Elytris tam arcte connexis, vt duobus praeditum esse vix affirmares.

107. *Scarabaeoides crispans*, der *gestreifte Buprestesartige Baumkäfer*.

Voet.

Voet. Scar. *Arboric.* p. 23. No. 95. t. 11. f. 95. Le *Haneton-Bupreſte ſtrié;* de *geſtreepte Schaarbyter Kever.*

Totus niger, antennis foliatis, ceterum *Bupreſti* ſimillimus.

108. *Scarabaeoides*, der *Dermeſtesartige Käfer.*

Voet. Scar. *Arboric.* p. 23. No. 96. t. 11. f, 96. Le *Haneton Dermeſte;* de *Schaarbyter Kever.*

Totus glaber et fulgens; non diſſimilis *Coleoptero aquatico.*

109. *Berolinenſis*, der *Berliner.**)

Voet. Scar. *Arboric.* p. 33. No. 150. t. 21. f. 150. Le *Berlinois;* de *Berlyner.*

Totus *ſpadiceo* colore; *elytris* ſubtiliter coſtatis.

110. *Flos Chalci ſtriatus*, die *geſtreifte Kupferblume.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 34. No. 152. t. 22. f. 152. Le *Fleur de Cuivre rayée;* de *geſtreepte Koperbloem.*

Pulcherrimus; lineae albae cum interpunctionibus inter colorem viride ſplendentem.

111. *Orphanus maculoſus*, das *gefleckte Wayſenkind.*

Voet. Scar. *Floric.* p. 34. No. 153. t. 22. f. 153. *L'orphelin tacheté;* het *geplekte Weeskind.***)

Fortaſſe

*) Er ſtehet zwar unter den *Terricolis*, *Voet* hat aber ſelbſt erinnert, daſs er unter die *Arboricolas* gehöre.

**) Mit dieſen beyden Käfern No. 110. 111. verhält ſichs eben ſo, wie mit No. 109. Sie gehören unter die *Blumenkäfer*; *Voet* hat ſie aber zu ſpät erhalten, und alſo nicht unter die erſten ſetzen können.

Fortasse *mas* vel *femella* No. 33. *Orphanulus.*

112. *Adiaphorus*, das *Krainsche Faulthier.*

Scop. Entom. carn. No. 10. *Tardus* valde; totus *pilosus;* caput thoraxque coeruleo-viridis. *Elytra* diaphana saturatius colorata ac in *Melolontha.*

Poda Mus. graecens. p. 20.

113. *Sylvestris*, *Skopolis Waldkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 11.

Elytrum striis elevatis 10, areis interiectis, transversim rugosis, octava tuberculis binis; *caput* leniter emarginatum; *thorax* punctatus.

114. *Oblongus*, der *Menschenfreund.*

Scop. Entom. carn. No. 19.

Facies *Tenebrionis molitoris;* caput antice rotundatum; *elytrum* striis 9. Circa oppida et pagos.

115. *Alpinus*, der *Alpenkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 21.

Capitulum antenn. bipartitum; *statura* Cocoinellae 10-punctatae; *Thorax* punctatus. In *Alpibus Vochinensibus.*

116. *Variegatus*, der *buntscheckige Käfer.* *)

Scop. Entom. carn. No. 28.

Albo-nigroque varius. *Ani* regio cinerea punctis binis atris. *Caput* nigrum; *antennae* nigrae; *thorax* albidus villosulus.

117. *Canicularis*, der *ungarische Hundstagskäfer.*
Scop.

*) Viel ähnliches mit Scar. *Hemiptero* L. No 63. aber nicht derselbe.

Scop. annus 5. hist. nat. p. 77. No. 14.

Similimus *Solstitiali*, sed duplo minor; *tibiae* antice tridentatae, *elytra* non plicata.

Vesperi et interdiu volat.

118. *Holosericus*, der *Krainische Sammetkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 77. No. 15. Minor Scar. *Vacca* L. No. 25; major *fimetario* No. 32. *Elytra* fusco-rubra, striata, albo tenui villo pubescentia.

119. *Gronovii*, der *Gronovskäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 82. No. 23.

Statura *Melolonthae* No. 60. *Color* obscure testaceus; *thorax* in medio sulco dimidiato; *elytra* non striata. Totus glaber.

Gronov. Gazoph. p. 145. No. 429. Scar. *muticus*, obscure testaceus, capite antice emarginato; *thorace* sulco longitudinali.

120. *Maculatus*, der *Gelbfleck.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 83. No. 25.

Vix major *Lunari* No. 10. fuliginoso-niger; *thorax* punctis duobus flavis; *elytra* apice flava; et ad marginem flavo-maculata.

Gronov. Gazophyl. p. 150. No. 456. Scar. *muticus*, ater, opacus, flavo-maculatus, scutello nullo, segmento abdominis primo vtrinque vnidentato.

121. *Buprestoides*, *Skopolis Buprestenkäfer.*

Scop. Ann. 2. hist. nat. p. 8.

Corpus ovatum, fuscum; *thorax* in medio macula parva nigra; *elytra* striata, *alae* tenues.

122. *Cru-*

122. *Crucifer*, der *Kreuzträger*. *)

Lepechins Tageb. 1. Th. p. 240. t. 16. f. 14.

Muticus, thorace subvilloso virideſcente, *elytris* luteis corpore brevioribus, *cruce nigra*, trabe duplici.

123. *Cyaneus*, der *blaue Steppenkäfer*.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 313. t. 19. f. 10.

Muticus oblongus, totus *cyaneus*.

124. *Nigricans*, der *Schwärzling*.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 313. t. 19. f. 7.

Muticus ſupra nigricans, infra lanugine alba obſitus; *elytris* corpore brevioribus, ſcutello *triangulari* villoſo albo.

125. *Acuminatus*, der *Spitzflügel*.

Lepechins Tageb. 1. Th. p. 313.

Muticus, corpore viridi, *elytris* flavis corpore brevioribus, apice *acuminatis*.

126. *Bipunctatus*, der *Zweypunkt*.

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 201. t. 10. f. 7.

Muticus, *thorace* nigro rubro-marginato; *elytris* rubris, punctulis duobus nigris magnis.

127. *Mucronatus*, das *zweyzackichte Käferchen*.

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 202. t. 11. f. 22.

Mutico thorace, *elytris* apice excavatis, *mucronibus* 4.

128. *Hiſpi-*

*) Dieſe Käfer hatten einen ganzen Eichenwald kahl gefreſſen, und blos das Mark aus den Blättern genagt, daſs die übrigen Geäder der Blätter vollkommene Skelette vorſtellten.

128. *Hispidus*, der *dänische kleine Bär.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 19. t. 16.

Magnitudine *fimetarii;* hactenus ignotus; descriptus vero in Prodr. Insectol. *Siael.* p. 26. No. 1.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 477. *Tomentosus* piceus opacus, capite thoraceque nigro; *elytris* striatis pubescentibus. An *hispidus?* Pontopp. Atl. Dan.

129. *Flexilis*, der *spanische Käfer mit beweglichen Flügeldecken.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 4. No. 4.

Scutellatus *muticus*, apterus, capite thorace elytrisque fusco-lividis, laevissimis; *elytris flexibilibus* coriaceis obtusis ciliatis.

130. *Piceus*, der *amerikanische Pechkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 5. No. 5.

Scutellatus *muticus*, totus *piceus*, pectore piloso; *elytris* striatis punctis impressis. *Corpus* magnitudine inferius *Stercorario.*

131. *Juvencus*, der *amerikanische junge Stier.*

Fabric. S. E. p. 18. *Scar.* 62. Scutellatus *muticus*, thorace impresso antice *mucronato.*

Mus. Dom. *Banks.*

132. *Splendidus*, der *amerikanische Grünling.*

Fabric. S. E. p. 18. *Scar.* 63.

Scutellatus *muticus* viridi-nitens; elytris striatis.

Mus. Dom. *Drury.*

133. *Cephus*, der *schwarzrändige Fuchs.*

Bayerische Staatsbibliothek München

Fabric. S. E. p. 18. *Scar.* 64.
Scutellatus *rufus*, elytrorum ſutura, apicibusque nigris.
Muſ. Dom. *Banks.*

134. *Laborator*, der *braſilianiſche ſchwarzpunktirte Miſtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 18. *Scar.* 65.
Scutellatus *muticus* ater, *thorace* punctato, *elytris* ſtriatis, *clypeo* emarginato.
Muſ. Dom. *Banks.*

135. *Arator*, der *kapenſiſche Pflüger.*

Fabric. S. E. p. 18. *Scar.* 66.
Scutellatus *muticus* niger; *thorace* laevi; *elytris* punctato-ſtriatis.

136. *Barbatus*, der *indianiſche Bartafter.*

Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 67.
Scutellatus *muticus* laevis niger, *ano barbato.*

137. *Luridus*, der *engliſche Zebra.*

Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 69.
Scutellatus *muticus* ater, elytris griſeis nigro-ſtriatis.
Muſ. Dom. *Banks.*

138. *Teſtudinarius*, der *engliſche Schildkrötenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 72.
Scutellatus *muticus* niger, *elytris* ſulcatis piceis, ferrugineo-punctatis.
Muſ. D. *Solander.*

139. *Mer-*

139. *Merdarius*, der *europäische schwarznäthige Miſtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 19. *Scar.* 73.

Scutellatus *muticus* ater, elytris teſtaceis, ſutura nigra.

140. *Porcatus*, der *Leipziger tief gefurchte Miſtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 20. *Scar.* 75.

Scutellatus *muticus* fuſcus, *elytris porcatis*, ſeu profunde ſulcatis.

141. *Stercorator*, der *Braſilianiſche Miſtfink.*

Fabric. S. E. p. 20. *Scar.* 76.

Scutellatus *muticus* ater laevis, *elytris* ſtriato-crenatis, *clypeo* emarginato.

142. *Aſper*, der *europäiſche gefurchte Pflanzenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 20. *Scar.* 77.

Scutellatus *muticus* capite thoraceque transverſim ſulcatis, *elytris* ſtriatis.

143. *Gibboſus*, der *amerikaniſche Hökerflügel.*

Fabric. S. E. p. 28. *Scar.* 112.

Exſcutellatus muticus; clypeo quadridentato, elytris baſi gibbere notatis.

144. *Novae Hollandiae*, der *neuholländiſche Käfer mit vier gezähneltem Schilde.*

Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 113.

Exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, *elytris* sulcatis.

Mus. Dom. *Banks.*

145. *Koenigii*, der *Tranquebarische Königskäfer.*

Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 114.

Exscutellatus *muticus*, clypeo bidentato, thorace scabro, *elytris* variolosis.

146. *Cupreus*, der *afrikanische Kupferkäfer.*

Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 115.

Exscutellatus *muticus* nigro-cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo.

147. *Flagellatus*, der *kapensische Striemenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 29. *Scar.* 116.

Exscutellatus *muticus* niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris.

148. *Squalidus*, der *schwarze Brasilianische Mistkäfer.*

Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 119.

Exscutellatus *muticus* ater, clypeo emarginato, *elytris* striatis.

Mus. Dom. *Banks.*

149. *2-pustulatus*, die *neuholländische Zweyblatter.*

Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 121.

Exscutellatus *muticus* ater, elytrorum basi macula rufa.

150. *Triangularis*, der *Surinamische Triangel.*

Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 7.

Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 122.

Exscu-

Exscutellatus *muticus* niger, *thorace* margine femoribusque pallidis, *clypeo* emarginato.

151. *Cinctus*, der *chinesische Gürtelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 30. *Scar.* 123.

Exscutellatus *muticus* niger, *elytrorum* margine pallido, *clypeo* emarginato.

152. *Suberosus*, der *Brasilianische Zahnschild.*

Fabric. S. E. p. 31. *Trox* 2.

Griseus, *thorace* marginato, margine postice *dentato*, *elytris* striatis.

Mus. Dom. *Banks.*

153. *Spinicornis*, der *Dornfühler.*

Fabric. S. E. p. 31. *Trox* 3.

Nigricans, thorace postice vtrinque emarginato, *antennis spinosis.*

154. *Fervidus*, der *glatte amerikanische Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 32. *Melolontha* 4.

Glabra testacea, clypeo emarginato.

155. *Glabratus*, der *indianische Porzellankäfer.*

Fabric. S. E. p. 34. *Melolontha* 9.

Testacea nitida, *sterno* antice porrecto obtuso.

156. *Viridis*, der *kapensische goldgrüne Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 34. *Melol.* 10.

Glabra, supra viridis, subtus *aurea.*

Mus. Dom. *Banks.*

157. *Aeneus*, der *neuholländische Kupferkäfer.*

Fabric. S. E. p. 34. *Melolontha* 11.
Glabra aenea, *abdominis* lateribus albis, *elytris* acuminatis.
Muſ. Dom. *Banks.*

158. *Suturalis*, der *grüne neuſeeländiſche Laubkäfer mit der gelblichen Nath.*

Fabric. S. E. p. 34. *Melolontha* 12.
Viridis, *elytrorum* ſutura flaveſcente.
Muſ. Dom. *Banks.*

159. *Bicolor*, der *kapenſiſche zweyfarbige Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 34. *Melolontha* 13.
Glabra, ſupra viridis, ſubtus teſtacea, pedibus apice *aureis.*

160. *Dorſalis*, die *Tranquebariſche ſchwarze Rückenlinie.*

Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 14.
Glabra teſtacea, *capite, thoracis elytrorumque dorſo* nigris.

161. *Glacialis*, der *Feuerländiſche glatte Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 15.
Glabra picea, *antennis pedibusque* teſtaceis.
Muſ. Dom. *Banks.*

162. *Luridus*, der *vielfarbige Laubkäfer.*
Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 16.
Thorace nigro, *margine* pallido, *elytris* griſeis nigro-punctatis.

163. *Stria-*

163. *Striatus*, der *Feuerländische gestreifte Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 17.
Glabra aenea; *elytris* striatis, *sutura lineisque* quatuor cupreis.
Mus. Dom. *Banks.*

164. *Testaceus*, der *Feuerländische muschelbraune Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 18.
Glabra testacea, capite obscuriore; *elytris* striatis.
Mus. Dom. *Banks.*

165. *Pallidus*, der *kapensische blassgelbe Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 35. *Melolontha* 19.
Glabra, testacea, *capite elytrorumque* sutura nigris.
Mus. Dom. *Banks.*

166. *Melanocephalus*, der *Brasilianische Schwarzkopf.*

Fabric. S. E. p. 36. *Melolontha* 24.
Glabra, rufescens, *capite* nigro; *elytris* pallidis.
Mus. Dom. *Banks.*

167. *Rufus*, der *kapensische Fuchs.*

Fabric. S. E. p. 36. *Melolontha* 22.
Glabra rufescens, *elytris* testaceis, *clypeo* quinque dentato.
Mus. Dom. *Banks.*

168. *Festivus*, der *Neuseeländische Staatskäfer.*

Fabric. S. E. p. 36. *Melolontha* 23.

Supra glabra viridis, thorace *linea* dorsali, *elytris* futura nigris.

Mus. Dom. *Banks.*

169. *Laetus*, der *Neuseeländische Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 36. *Melolontha* 24.

Supra glabra *aurea*, thoracis linea dorsali, scutelloque *sanguineis.*

Mus. Dom. *Banks.*

170. *Vitis*, der *grüne Weinkäfer.*

Fabric. S. E. p. 37. *Melol.* 26.

Viridis, *thoracis* lateribus flavis.

171. *Frischii*, *Frischens Weinblatt- oder Juliuskäfer.*

Frisch Ins. 4. Th. S. 29. t. 14.

Fabric. S. E. p. 37. *Melolontha* 25.

Nigro-aenea, *elytris* testaceis.

Simillima *horticolae* Linn. No. 59. at *duplo major.*

172. *Argenteus*, der *Silberkäfer.* *)

Scop. Entom. carn. No. 9.

Poda Ins. p. 20.

Fabric. S. E. p. 38. *Melolontha* 32.

Clypeo marginato niger subtus *argenteo-nitens*, elytris testaceis.

173. *Errans*, der *irrende Ritter.*

Fabric. S. E. p. 37. *Melol.* 27.

Testacea, *thorace maculis* duabus nigris, *pedibus* rufis.

174. *Pul-*

*) S. No. 64. Linn. Scar. *farinosus.*

174. *Pulverulentus*, der *Straſsburgiſche Staubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 33.
Corpore *polline* virescenti-argenteo; *elytris* pedibusque testaceis.

175. *Sylvicola*, der *neuholländiſche Waldmann.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 34.
Clypeo reflexo integro; *corpore* nigro glabro.
Muſ. Dom. *Banks.*

176. *Subſpinoſus*, der *Jamaiſche Stachelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 35.
Flavescens; pedibus rufis, *thorace* subſpinoſo.

177. *Mutabilis*, der *Tranquebariſche Changeantkäfer.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 36.
Atra *tomento cinereo* villoſa, quo certo ſitu reſplendet.

178. *Verſicolor*, der *afrikaniſche buntſcheckige Laubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 37.
Obſcure-aenea, *elytris* tomento cinereo nitidulis.
Muſ. Dom. *Banks.*

179. *Monticola*, der *neuholländiſche Bergkäfer.*

Fabric. S. E. p. 39. *Melol.* 38.
Clypeo integro reflexo, testacea glabra, *capite* nigro.
Muſ. Dom. *Banks.*

180. *Humuralis*, der *europäiſche Erdwandkäfer.*

Fabric. S. E. p. 40. *Melol.* 39.
Atra, *elytris* basi punctoque medio pallidis.

181. *Vittatus*, der *indianische bandirte Laubkäfer*

Fabric. S. E. p. 40. *Melol.* 40.
Cyanea pilosa, *elytris* testaceis, *lineis tribus* albicantibus.
Petiv. Gazophyl. t. 11. f. 12.

182. *Ceratoniae*, der *Hasselquistische Ceratonienkäfer.*

Hasselqu. It. Palaest. p. 448.
Magnitudo *Coccinellae* minimae; capite antennis pedibusque ferrugineis, *elytris* glabris, apice deflexis.

183. *Bibens*, der *amerikanische Säufer.*

Fabric. S. E. p. 40. *Trichius* 3.
Capite thoraceque viridi-aeneis pilosis; *elytris* testaceis viridi-nitentibus.

184. *Lunulatus*, der *karolinische Weissmond.*

Fabric. S. E. p. 41. *Trichius* 5.
Glaber cyaneus; elytris *lunulis duabus albis.*

185. *Piger*, der *maryländische Faullenzer.*

Fabric. S. E. p. 41. *Trichius* 6.
Capite thoraceque aeneis villosis, *elytris* testaceis albo-maculatis.

186. *Delta*, das *amerikanische Delta.*

Drury Ins. Tom. II. t. 30. f. 1. 2.
Forsteri nov. spec. Ins. Cent. I. p. 7. No. 7.

Scutella-

Scutellatus *muticus* flavus; *thorace* atro; *triangulo* flavo; *elytris* testaceo-flavis nigro-trimaculatis.

Fabric. S. E. p. 41. *Trichius* 7.

Thorace nigro *triangulo* albo; *elytris* testaceis albo-maculatis.

187. *Micans*, der *afrikanische grüne Glanzkäfer.*

Drury Inf. Tom. II. t. 32. f. 3.

Fabric. S. E. p. 42. *Cetonia* 1.

Viridis nitens; *clypeo* porrecto recurvo *bifido*; tibiis anticis *serratis*.

188. *Chinensis*, der *chinesische Spitzflügel.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 2. No. 2.

Scutellatus *muticus*, viridi-sericeus, glaber, subtus viridi-inauratus; *elytris* obtusis, submucronatis.

Fabric. S. E. p. 42. *Cetonia* 2.

Aenea, *clypeo* emarginato subspinoso; thorace postice *lobato*; *elytris acuminatis*.

189. *Nigrita*, der *Ceylonische Mohr.*

Fabric. S. E. p. 43. *Cetonia* 3.

Glabra, atra, *clypeo* emarginato subspinoso, *thorace* postice lobato.

Hermann Mus. p. 17. No. 257.

Petiv. Gazoph. t. 28. f. 3.

190. *8-punctatus*, der *deutsche Achtpunkt.*

Fabric. S. E. p. 44. *Cetonia* 6.

Nigra, *thorace* vtrinque puncto baseos; *elytrisque* duobus flavis.

Statura Scar. *Nobilis* Linn. No. 81.

191. *Tristis*, der *amerikanische Trauerkäfer.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 10.
Picea, *abdominis* segmentis margine albis; *clypeo* emarginato, *sterno cornuto.*

192. *Smaragdula*, der *amerikanische Smaragdkäfer.*
Fabric. S. E. p. 45. *Cetonia* 11.
Ferrugineo-flavescens; *elytris* virescentibus; *sterno cornuto.*

193. *Marginatus*, der *indianische Rothrand.*
Drury Ins. Tom. II. t. 32. f. 1.
Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 15.
Glabra atra; thoracis elytrorumque *marginibus rufis.*

194. *Marginella*, das *afrikanische Rosträndchen.*
Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 16.
Viridis, thoracis elytrorumque *margine ferrugineo.*

195. *Fasciatus*, der *alexandrinische Bandkäfer.*
Fabric. S. E. p. 46. *Cetonia* 18.
Nigra, *thoracis* margine *elytrisque* testaceis; elytris furura *fasciaque* dentata nigris.

196. *Thoracicus*, der *alexandrinische Purpurflügel.*
Fabric. S. E. p. 47. *Cetonia* 19.
Nigra, *thorace* ferrugineo; *elytris* nigris *subpurpurascentibus.*

197. *Olivaceus*, der *afrikanische Olivenkäfer.*
Fabric. S. E. p. 47. *Cetonia* 20.

Testa-

Testacea; *thorace* lineis punctisque duobus; *elytris* maculis transversis quatuor nigris; subtus *olivacea.*

198. *Pictus*, der *ostindische Buntflügel.*
Fabric. S. E. p. 47. *Cetonia* 21.
Nigra; *thorace* quinquelineato; *elytris* albo-maculatis acuminatis.

199. *Limbatus*, der *ägyptische Rostrand.*
Fabric. S. E. p. 47. *Cetonia* 22.
Nigra, thoracis margine *ferrugineo.*

200. *Splendidus*, der *indianische Putzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 47. *Cetonia* 23.
Cyanea; thoracis margine, elytrisque testaceis.

201. *Cupreus*, der *glänzende Kupferkäfer.*
Fabric. S. E. p. 48. *Cetonia* 24.
Cuprea nitida; thorace scutello elytrisque *viridibus.*

202. *Africanus*, der *afrikanische Erzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 48. *Cetonia* 25.
Aenea nitens; *capitis spina* incumbente, sterno porrecto.
Drury Inf. Tom. II. t. 30. f. 4.

203. *Suturalis*, die *afrikanische Schwarznath.*
Fabric. S. E. p. 48. *Cetonia* 26.
Thorace nigro; margine rufo; *elytris* aeneo-nitidis; *sutura nigra.*

204. *Fulgidus*, der *vierpunktirte After.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 48. *Cetonia* 27.

Aenea nitidissima; *abdominis* vltimo segmento prominente *quadripunctato.*

205. *Gagates*, der *afrikanische Achatkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. *Centur.* I. p. 6. No. 6.

Scutellatus *muticus*, totus ater, glaber, nitens, *alis fuscis.*

Fabric. S. E. p. 29. Cetonia 28.

Atra, nitida, *clypeo* truncato, reflexo, *sterno* obtuso.

Mus. Dom. *Banks.*

206. *Luridus*, der *Brasilianische Scheckflügel.*

Fabric. S. E. p. 49. *Cetonia* 30.

Nigro-aenea; elytris *lineis* duabus elevatis, albo-que maculatis.

Mus. Dom. *Banks.*

207. *Aurichalceus*, der *indianische Messingglanz.*

Fabric. S. E. p. 49. *Cetonia* 31.

Aenea, opaca; *elytris* acuminatis albo-maculatis.

208. *Philippensis*, die *Philippinische Schecke.*

Fabric. S. E. p. 49. *Cetonia* 32.

Aenea, nitida; *thorace* margine punctisque duobus albis; *elytris* maculatis, acuminatis.

Petiv. Gazoph. t. 26. f. 7.

209. *Fasciatus*, der *neuholländische bandirte Weissfleck.*

Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 33.

Viridi-

Viridi-fusca, obscura, *thorace* margine punctisque; *elytris* fascia media, maculisque niveis, postice acuminatis.

Mus. Dom. *Banks.*

210. *Acuminatus*, der *kapensische Spitzflügel.*

Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 34.

Obscure-aenea, pallido-maculata, *elytris* acuminatis.

Mus. Dom. *Banks.*

211. *Areatus*, der *virginische Rothringel.*

Fabric. S. E. p. 50. *Cetonia* 35.

Nigra pubescens, *elytris* disco rufo.

212. *Versicolor*, der *ägyptische Rothrücken.*

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 38.

Nigra, *thorace* rufo nigro maculato, *elytris* nigris albo-punctatis, *dorso* rufo.

213. *Histrio*, der *ägyptische Harlekin.*

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 39.

Testacea capite, *thoracis* lineis duabus; *elytris* sutura maculisque tribus nigris.

214. *Variegatus*, die *Tranquebarische Schecke.*

Fabric. S. E. p. 51. *Cetonia* 40.

Atra, *thorace* margine *elytrisque* maculis sparsis albis.

215. *Hottentotta*, der *kapensische Hottentottenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 52. *Cetonia* 41.

Atra

Atra glabra; *elytris* postice punctis duobus albis.

216. *Miliaris*, der *indianische sechsgezähnte Kopfschild.*

Fabric. S. E. App. p. 818. *Melolontha*, clypeo porrecto, subreflexo, nigra, hirta; *elytris* testaceis, margine nigro.

217. *Crassipes*, der *kapensische Dickfuss.*

Fabric. S. E. App. p. 818. *Melolontha*, atra, albomaculata, pedibus posticis elongatis, *crassissimis.*

218. *Rupicola*, der *kapensische Klippenkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 818. *Melolontha*, villosa, virescens, capite nigro.

219. *Ursus*, der *kapensische schwarze Bär.*

Fabric. S. E. App. p. 818. *Melolontha*, atra, hirsutissima, *pedibus* quatuor anticis testaceis.

220. *Signatus*, der *kapensische Zeichenkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 818. *Cetonia*, *thorace* nigro; margine albo; *elytris* testaceis, sutura margineque nigris.

221. *Sinuatus*, der *kapensische Winkelflügel.*

Fabric. S. E. App. p. 819. *Cetonia*, fusco-viridis; thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis; *elytra* obscure viridia, margine sinuato.

222. *Vittatus*, der *kapensische Bindenkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 819. *Cetonia*, viridi-aenea, hirta, *elytris* testaceis; *vitta* media nigra, suturaque aenea.

223. *Hae-*

223. *Haemorrhoidalis*, der *kapensische Rothafter.*

Fabric. S. E. App. p. 819. *Cetonia*, nigra; *elytris* viridibus, nitidis, *thoracis* margine, *anoque* rufis.

224. *Lugubris*, der *kapensische Trauerkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 819. *Cetonia*, glabra, atra; *elytris* macula laterali *anoque* albis.

225. *Viridulus*, das *indianische grüne Rauchkäferchen.*

Fabric. S. E. App. p. 820. *Trichius.*
Viridis, pubescens, *ano* albo bimaculato.

226. *Lineatus*, die *kapensische Schwarzlinie.*

Fabric. S. E. App. p. 820. *Trichius.*
Pubescens, thorace fulvo, nigro lineato; *elytris* testaceis, sutura fulva.

227. *Triangulatus*, der *chinesische Triangelfuss.*

Drury Ins. Tom. I. t. 36. f. 8. 9.
Totus niger; *capite* lato; *elytris* sulcatis thorace longioribus; crurum *articulis* ex meris *Triangulis* compositis.

228. *Virens*, der *chinesische Grünling.*

Drury Ins. Tom. II. t. 30. f. 3.
Scutellatus *muticus; capite, thoraceque* luteo nigro-striato; *elytris* viridibus, lineis longitudinalibus nigro-punctatis.

229. *Cordatus*, der *afrikanische Herzkäfer.*
Drury Ins. Tom. II. t. 32. f. 5.

Fuſco - teſtaceus; *thorace* duabus longitudinalibus maculis nigris; *elytris* pluribus maculis atris *cordiformibus.*

230. *Oxypterus*, der *Schnellflügel.*

Pallas Reiſen 1. Th. Anh. No. 26. Ausz. Anh. S. 10. No. 26.

Major Scar. *hortulano; abdomine* violaceo viridique; *elytra* griſea, abdomine anguſtiora, apice *acuminata; tibiis* profunde pectinatis.

Müllers Supplem. B. S. 217. No. 91. der *Kurzfuſs.*

231. *Albellus*, der *Weifsling.*

Pallas Reiſen 1. Th. Anh. No. 27. Ausz. S. 10. No. 27.

Corpus atrum; *clypei* latera longitudinaliter *late alba;* elytra maculis ſparſis transverſis *albis.*

Müllers Supplem. B. S. 217. No. 92. der *Weifslingkäfer.*

232. *Vertumnus*, der *Samariſche gelbbraune Frühlingskäfer.*

Pallas Reiſen 1. Th. S. 177. Anh. No. 28. Ausz. Anh. S. 10. No. 28.

Magnitudo et facies *Solſtitialis; corpus* fulvo-teſtaceum; *thorax* lana fulva.

B. *Varietas.* Simillimus, ſed ſubtus totus et artus *pallidi* coloris.

Müllers Suppl. B. S. 217. No. 93. der *Frühlingskäfer.*

233. *Albus*, der *weiſse Nachtſchwärmer.*

Pallas Reiſen 2. Th. Anh. No. 41.

Magnitu-

Magnitudo media inter *Fullonem* et *Melolonthan*; corpus totum *squamulis* minimis albis farinosum atque candidum.

Noctivagus, post medium *Junii* apparet.

Müllers Supplem. B. S. 218. No. 94. der *weisse Käfer.*

234. *Spireae*, der *Sibirische Spierstaudenkäfer.*

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 42.

Inter arboreos *minimus; corpore et thorace* nigro cano-pubescente; *elytris* griseis pedibusque piceis.

Müllers Suppl. B. S. 219. No. 95. der *Spierlingskäfer.*

235. *Orichalcus*, der *ostindianische Kupferkäfer.* *)

Müllers Supplem. B. S. 216. No. 88.

Totus glaber supra *cupro-aeneus*, infra *ferrugineo-fuscus.*

236. *Atro-rubens*, der *Schwarzröthling.*

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 54. No. 468.

Rufo-piceus, nitidus, *elytris* striatis; *tibiis* anticis basin versus denticulatis.

Act. Nidr. IV. p. 2.

237. *Bipunctatus*, der *Zweypunkt.*

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 475.

Niger *muticus*, thoracis angulo antico rubro; *elytris* striatis flavis.

238. *Lineatus*, der *Linienkäfer.*

*) *Linné*, sagt Herr *Müller*; ich kann aber nicht sagen: wo im Linné.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 55. No. 478.

Niger, *muticus*, elytris striatis punctatisque; *lineolis lividis.*

Schröters FRACHTKÄFER: S. dessen Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte 1. Th. S. 335. t. 2. f. 3. ist kein *Scarabaeus;* sondern offenbar, nach seiner ganzen Stellung und übrigen Merkmalen ein *Bupreſtis.*

Eine *Mittelklasse* zwischen den *Scarabaeis* und *Lucanis.*

1. *Polyceros*, das *Vielhorn.*

Pallas Reisen 1. Th. Anh. No. 22. Ausz. 1. Th. Anh. S. 9. No. 22.

Magnitudo et facies *Stercorarii;* piceus; *elytris* subſtriatis; *forcipes* lati, tricuspidati, exserti vt in *Lucanis;* galea tridentata; *thorax* retusus, convexus, ad nucham cornuto-bidentatus. Lectus in *lacu salso Inderiensi.*

Müllers Suppl. B. S. 214. das *Vielhorn.*

2. *Cephalotes*, der *Ohrenkäfer.*

Pallas Reisen 1. Th. Anh. No. 23. Ausz. 1. Th. Anh. S. 9. No. 23.

Magnitudo paulo supra *Chrysomelas* maximas, totus ater, glaberrimus, abdomen breviſſimum, vt in Scar. *coprideis;* elytra vt abdomen breviſſima; *thorax* convexus, antice excisus; *caput* maximum; *forcipes* exserti maximi, triquetri, supra hiulci, obtusiſſimi; *pedes* magni priores maxime dentati.

Cum

Cum praecedente LVCANOS SCARABAEIS *adnectit.*

Müllers Suppl. B. S. 214. der *Ohrenkäfer.*

190. GESCHLECHT. Lucanus.

Feuerkäfer; Feuerschröter; Feuerwürmer; Baumschröter; Kneipwürmer; Kneipschröter; Kammkäfer; Waldkäfer.

Börners Samml. 1. Th. S. 458. 462. *Holzschröter; Feuerschröter.*

Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. S. 91. *Feuerschröter; Feuerkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 196. *Kammkäfer.* (Platycerus.)

Füesslins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 3. *Kammkäfer.*

Sulzers abgekürzte Gesch. der Ins. S. 18. *Kammkäfer.*

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 93. *Feuerschröter.*

Lessers Theol. der Ins. S. 70. l.) 178. *Kneipwürmer; Baumschröter; Kneipschröter.*

Swammerdamms Bibel der Nat. S. 119. *Fliegende Hirsch* oder *Stier; Feuerwurm; Schröder.*

Lyonet sur Lesser Tom. 1. p. 285. les *Cerf-volans;* les *Vers serrans.*

Wotton de differ. animal. fol. 192. *Lucanus.*

Jonston hist. nat. Ins. p. 94. c. 3. t. 14. Scarabaeus *cornutus; Lucanus; Taurus.*

Mouffet Theatr. Ins. p. 148.

Platycerus; Lucanus; Taurus; Cervus volans; Ἀκανθος; Ἱπποκανθαρος; Σκαραβέλαφος; Κάραβος.

Italis Cereti, vulgo Potapeſo;
Gall. Cerf-volant.
Angl. Stag-flie.
Belg. Vlieghende Hert.
Illyr. Gelin.
Polon. et Slavon. Krowka; Wielka.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 59. *Platycerus;* le *Cerf-volant.*
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 326. *Cerf-volant.*
Schwenkfeld Theriotr. Sileſ. p. 552. Κάραβος; *Scarabaeus bicornis; Scarabaeus Lucanus; Scarabaeus cervus; Scarabelaphus; Taurus Fullo; Cervus volans;* ein *gehörnter Käfer; vulgo Schröter.*

1. *Cervus*, der *Hirſchſchröter.*
Müllers Linn. Naturſ. 5. Th. 1. B. S. 94. No. 1.
Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 3. No. 39. der *Hirſch; Schröter; Schrötel; Holzſchröter.*
Fermins Beſchr. der Kolon. Surinam 2. Th. S. 266. der *Hirſchkäfer.*
Röſels 2. B. S. 25. t. 4. 5. der *Hirſchkäfer* oder *Schröter.*
Pontoppid. Naturg. v. D. S. 199. No. 2. Scarab. *Cervus; Seel.* Eegehiort; *Süderjütl.* Flyvehiort; *Norderjütl.* Bibelhiort; *Fühn.* Träehiort; Träeſkrubbe.
Catholicon C. p. 174. *Cerf-volant;* der *Hirſchkäfer; Feuerkäfer; Schröter; Hornſchröter; Baumſchröter; Feuerwurm; Kneipwurm; fliegende Hirſch; gehörnte Käfer; gehörnte Roſskäfer; Taurus volans.**)

Onomatol.

*) Nach dem Catholicon iſt das Inſekt, welches die *Hottentotten* verehren, und denen Perſonen und Bäumen, auf welche es ſich niederläſt, eine beſondere Ehrfurcht bezeigen, der *Cerf-volant du Cap*, oder der *Hirſchkäfer des Vorgebirgs*, deſſen *Kopf* und *Flügel* goldfarbig, die *Beine* grau, *Bauch* und *Rücken* aber grün,

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 797.

Cervus volans platyceros; Taurus volans; Lucanus; Scarabaeus cervinus; Scarabaeus cornutus; Scarabaeus bicornis; Cantharis cornutus; Scarabelaphus.

Ein *Schröter; Baumschröter; Hornschröter; Kneipwurm; fliegender Hirsch; Hirschkäfer; gehörnter Käfer; gehörnter Rosskäfer; Feuerwurm.*

Plinii hist. nat. Lib. 2. c. 28.

Jonston hist. nat. Ins. t. 14. f. 1. 2.

Imperat. hist. nat. p. 924. f. 3. *Cervus volans.*

Wagn. helvet. p. 236. *Scarabelaphus.*

Charlet. Onomast. p. 46. *Cervus volans Platyceros.*

Dal. Pharmacop. p. 398. Scarabaeus *cornutus.*

Merret. Pin. p. 201. *Cervus volans.*

Olear. Mus. p. 27. t. 16. f. 5. *Taurus volans.*

Raj. Ins. p. 74. No. 2. Scarabaeus maximus *platyceros; Taurus* nonnullis; aliis *Cervus volans.*

Poda Mus. graecens. p. 31.

Scop. Entom. carn. No. 1. Lucanus *cervus. Carniol.* Rogatsch.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 405. Scar. *Cervus. Suec.* Ekoxe; Hornoxe; *Blecking.* Horntroll.

Worm. Mus. p. 242. Scarabaeus *cornutus.*

Schaeff. Icon. t. 133. f. 1.

Albrecht Act. Acad. Curios. Vol. 6. obs. 120. p. 404. t. 5. f. 2. 3.

Brückmanni epist. itin. 78. de *Cervo volante*, ejusque hibernaculo.

Schluga prim. lin. cognit. Insect. t. 1. f. 1.

Bomar. Dict. P. II. p. 468.

grün, mit Roth und Weiss gefleckt sind. Ein mehreres davon bey *Mantis* Linn. *precaria* No. 8.

S. hinten unter den neuen Schrötern No. 9.

Müllerі Faun. Fridr. p. 2. No. 14. Scarabaeus *Cervus.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 443. Niger, *thorace* depresso, *maxillis* exsertis longis, apice bifurcis, *latere* dentatis.

Fabric. S. E. p. 1. Lucanus 2.

Maxillis exsertis vnidentatis, apice bifurcatis, *labio* deflexo, ruga transversali elevata.

Geoffr. mat. med. P. 6. p. 521-529.

— Ins. Tom. I. p. 61. *Platycerus* 1. *Le grand Cerf-volant.* t. 1. f. 1.

Fuscus, *cornubus* duobus mobilibus, apice bifurcis, intus ramo denticulisque instructus.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 327. No. 1. t. 12. f. 1. *Grand Cerf-volant.*

Fusco-castaneus, *maxillis* maximis corniformibus rumosis, apice bifurcatis, latere vnidentatis.

B. *Femina.* *)

Raj. Ins. p. 75. No. 3. Platyceros totus niger, *cornubus brevibus*, vnicum tantum ramum emittentibus, corpore oblongo, et velut parallelogrammo.

Schaeff. Icon. t. 133. f. 2.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 62. *Platyc.* 2. La *grande biche.*

Fuscus, *elytris* laevibus, *capite* laevi.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 331. t. 12. f. 7.

Fabric. S. E. p. 2. B.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 444. *Dorcas.*

Niger,

*) *Röſel* hält dieſen für das *Weibchen* des Cervus; *Geoffroi* aber für eine beſondere Art, welches der Staatsrath *Müller* durch die Erfahrung beſtätiget.

Copula Dorcadum, differensque a L. *Cervo* structura *veram speciem* demonstrat.

Niger, *thorace* convexo; *maxillis* exsertis brevibus, apice simplici, latere bidentatis.

2. *Capreolus*, der *Rehschröter.*

Müller l. c. S. 96. No. 2. *)
Füesslins Verz. S. 3. No. 40. das *Rehböcklein.*
Sulzers Gesch. S. 19. t. 2. f. 1. das *Rehböcklein.* **)
Jonston hist. nat. Ins. t. 14. t. 2. 2.
Fabric. S. E. p. 2. *Lucanus* 4.

Maxillis exsertis, apice tantum bifurcatis, *labio* ruga transversa elevata interrupto.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 336. No. 1. t. 19. f. 11. 12. le *Chevreuil brun.*

Fusco-castaneus, femoribus flavis, *maxillis* maximis corniformibus, apice simplicibus, latere vnidentatis.

3. *Tridentatus*, der *Dreyzack.* ***)

Müller l. c. S. 97. No. 3.
It. Oeland. p. 152. Scarabaeus maxillis *lunulatis* prominentibus dentatis, *thorace* vtrinque *tridentato.*

4. *Interruptus*, der *Doppelschild.*

Müller l. c. S. 97. No. 4. †)

 Sulzers

*) *Müller* sagt: in Frankreich nenne man diesen la *Chevrette brune; Geoffroi* gedenkt auch Tom. I. p. 64. *Platyc.* 5. einer *Chevrette brune*, die aber nur viertehalb Linie lang ist, und hinten unter den *neuen* vorkommen wird: No. 8.

**) Der *Sulzersche* ist wohl eher seiner Gestalt nach eine Abweichung, als Luc. *Capreolus* L. selbst.

***) Nirgends abgebildet.

†) Unmöglich kann die Angabe des Herrn Prof. *Müllers* von der Länge eines *Achtelzolls* richtig seyn, und eben so wenig glaube ich,

Sulzers Gesch. S. 20. t. 2. f. 2. der *Zertrennte.*
Fabric. S. E. p. 3. *Lucanus* 7.
Brown Iamaic. p. 429. t. 44. f. 7. *Dermestes.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 338. No. 2. t. 19. f. 13.
Cerf-volant interrompu.

Oblongus niger depressus, *antennis* arcuatis, *capite* tridentato, *elytris* sulcatis, *thorace abdomineque remotis.*

5. *Carinatus*, der *Kielträger.* *)
Müller l. c. S. 97. No. 5.

6. *Parallelopipedus*, der *Balkenschröter.*
Müller l. c. S. 98. No. 6.
Füesslins Verz. S. 4. No. 41. der *Schwarze.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 21. t. 16. **)
Lepechins Tageb. 1. Th. S. 219. der *parallelepipedalische Käfer in den hohlen Bäumen.*
Schaeff. Icon. t. 63. f. 7.
— Elem. t. 101. f. 1. *Platycerus, Kammkäfer.*
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 76. No. 12. Totus niger, vnciali longitudine. *Tibiae* anticae toto latere externo-dentatae.
Pontopp. Atlas Dan. I. p. 666. t. 29. f. 1.
Fabric. S. E. p. 2. *Lucanus* 6.

Geoffr.

ich, dass der *Brownsche* Dermestes der gegenwärtige Interruptus sey, da der Herr von *Geer* einige von *ein-* und *dreyviertel-*, andere von *ein-* und ein *Viertelzoll* lang gehabt hat, welche letztere er für die *Männchen* hält. Eben dieser Zweifel ist auch *Sulzern* aufgestossen, dessen Exemplar *zween Pariser Zoll* lang ist.

*) Nirgends abgebildet.

**) Des *Pontoppidans Punctatus* No. 22. t. 16. ist das *Weibchen* des vorigen nach *Fabricii* Beschreibung: Alter sexus *maxillis minoribus* punctoque duplici capitis prominente.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 62. *Platyc.* 3. La *petite biche.*

Niger; *elytris* laevibus, capitis *puncto duplici* prominente.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 334. No. 2. t. 12. f. 9. *Cerf-volant parallelipede.*

Niger, corpore depreſſo, *capite tuberculis* duobus laevibus.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 52. No. 446. *Dama.*

Ater, *thorace* depreſſo; maxillis exſertis brevibus, apice bifurcis.

7. *Caraboides*, der *Laufkäferartige Schröter.*
Müller l. c. S. 98. No. 7. der *Käferſchröter.*
Füeſslins Verz. S. 4. No. 42. der *Blaue.*
Vadmann. Diſſ. 40. *Carabus coeruleſcens.*
Schaeff. Icon. t. 6. f. 8. t. 75. f. 7.
Fabric. S. E. p. 3. *Lucanus* 8.
Scop. Entom. carn. No. 2. Totus punctatus, *Carabiformis;* maxillae porrectae, *lunatae;* apice truncato, 5-dentato, vt in *Formicis* plerisque.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 63. *Platyc.* 4. la *Chevrette bleue.* *)

Violaceo-coeruleus, *elytris* laevibus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 334. No. 3. t. 12. f. 11. *Chevrette bleue.*

Lucanus *(Caprea)* viridi-coeruleus nitidus depreſſus, *maxillis* magnis exſertis.

Unabgebildete.

1. No. 3. *Tridentatus.*
2. No. 5. *Carinatus.*

Neue

*) Hiervon hat *Geoffroi* eine *Varietät*, die er la *Chevrette verte* nennet.

Neue Schröterarten.

1. *Lucanus fuscus maximus*, der *gröste braune Jamaische Schröter.* *)

Drury Inf. Tom. I. t. 38. f. 1.

2. *Tenebrioides*, der *Krainische Mehlkäferartige Schröter.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 75. No. 10.
Thorax antice tridentatus; *caput* antice marginatum; terminatum cornu simplici erecto curvo. Totus niger, nitens, punctatus, statura et crassitie *Tenebrionis molitoris.*

3. *Scaraboides*, der *Idrische Kolbenkäferartige Schröter.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 75. No. 11.
Statura prioris, sed fuscus; *elytra* striata non punctata; *tibiae* antice tridentatae. *Rarus.*

4. *Alces*, der *grosse asiatische Schröter.*

Fabric. S. E. p. 1. *Lucanus* 1.
Maxillis exsertis, apice *quadridentatis.*
Petiv. Gazoph. t. 47. f. 15.

5. *Elaphus*, der *kleinere Virginische Schröter.*

Fabric. S. E. p. 2. *Lucanus* 3.
Maxillis exsertis vnidentatis apice bifurcatis; *labio* deflexo conico.

6. *Dama*,

*) Dieses prächtige Insekt ist gleichsam eine *Mittelsorte* zwischen den *Lucanis* und *Cerambycibus.* Der Ritter hat es in seiner Mantissa p. 532. unter die letztern gebracht, wo wir die dazu gehörigen Schriften anführen werden.

6. *Dama*, der *virginische Pechschwarze Schröter.*

Fabric. S. E. p. 2. *Lucanus* 5.

Maxillis exsertis intus bidentatis, longitudine capitis.

Pro *femina* Capreoli habet Linn. Mus. L. V. an recte? *)

7. *Virescens*, der *amerikanische grüne Schröter.*

Fabric. S. E. App. p. 817.

Viridi-aeneus, *maxillis* tridentatis.

8. *Fuscus*, das *kleine braune Schröterchen.* **)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 64. *Platyc.* 5. la *Chevrette brune*; long $3\frac{1}{2}$ lin. lat. $1\frac{1}{3}$ lin.

Fuscus, *elytris* striatis.

9. *Capensis*, der *Hirschkäfer des Vorgebirgs.*

Catholicon C. p. 174. le *Cerf-volant du Cap, Hottentottengötze.* ***)

191. GESCHLECHT. *Dermestes.*

Speckkäfer; Hautkäfer; Hautfresser; Schabkäfer; holl. Torretjes.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 1508. *Rinden-Saamen-* und *Speckkäfer.*

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 99. *Kleinkäfer.*

Füesslins schweiz. Ins. S. 4. *Schabkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 20. *Schabkäfer.*

Börners

*) Das *Weibchen des Capreoli* hat der Herr von *Geer* Tom. IV. p. 337. beschrieben.

) S. No. 2. *) S. No. 1.

Börners Samml. 1. Th. S. 462. *Speckkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 91. *Speckkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 195. *Speckkäfer.*

Berlin. Samml. 7. B. S. 383. *Bücherfeinde.*

Fränkische Samml. 1. B. S. 277.

Bomar. Dict. P. IV. p. 64.

Catholicon D. p. 188. das *Hautkäferchen;* der *Hautfresser;* der *Speckkäfer;* der *Fettkäfer;* der *nagende Käfer;* der *Fettwurm; Scarabé dissequeur.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 601. der *Hautfresser.*

Scop. Entomol. carn. p. 13.

Commentar. Lipf. Dec. I. P. IV. p. 658. V. p. 605.

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 513. *Blattae carnivorae; Barbegiae; Carpae; Fleischschaben; Fleischwürmer.*

In *carnibus* nascuntur *salsis inveteratis;* primo vermes albi, dein toti *hirsuti* evadunt.

Fabric. S. E. p. 54-68. *)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 96-108 *Dermestes;* p. 109-112. Byrrhus; p. 306-309. Anthribus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 188. *Dermestes;* p. 190. *Ips.*

1. *Lar-*

*) *Fabricius* hat *sechs besondere* Geschlechter, zu welchen er die *Dermest. Linn.* rechnet. *Apate* p. 54; *Dermestes* p. 55-58; *Bostrichus* p. 59. 60; *Byrrhus* p. 60; *Anthrenus* p. 61. *Anobium* p. 62. *Sphaeridium* p. 66-68.

Es herrscht übrigens in diesem Fach noch eine grosse Verwirrung, indem viele Schriftsteller bald dieses, bald jenes Geschlecht darunter verstehen. Was der eine *Dermestes* nennet, nennet der andere *Silpha, Cistela, Anthribus, Ips, Byrrhus, Ptinus, Eruchus, Bostrichus* u. s. w. Daher sagt *Forster* nov. spec. Inf. Cent. I. p. 10. mit Recht:

Dermestis genus plane confiteor esse *maxime intricatum.*

1. *Lardarius*, der *eigentliche Speckkäfer.*

Müllers Linn. Naturf. 5. Th. 1. B. S. 100. No. 1. t. 3. f. 1. das *Speckkäferchen.*

Füeßlins Verz. S. 4. No. 43. der *Vielfraß.*

Krünitz ökonom. Encyklop. 7. Th. S. 345. *Bücherfeind.*

Fränkische Samml. 1. B. S. 277. Derm. *fasciatus*, der *bandirte Speckkäfer.*

Naturforscher 3. St. S. 58. 61.

Preußische Sammler 1. Th. S. 492.

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 1.

Dan. Klammer. *Germ.* Glanner; *holl.* Klander; *franz.* Calandre. *)

Frisch Inf. 5. Th. S. 25. t. 9. der *kleine Speckkäfer mit dem weißen Queerstrich auf den schwarzbraunen Flügeln.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der *kleine Speckkäfer.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 408. *Suec.* Aenger.

Schaeff. Elem. t. 57. f. 1. 2. *Dermestes*, *Speckkäfer.*

— Icon. t. 42. f. 3.

Poda Muf. graecenf. p. 22.

Petr. *Borellus* obff. microfc. obf. 45. p. 26. *Larva.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 2. No. 15.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 485. *Dan.* Klanner.

Fabric. S. E. p. 55. *Dermestes* 1. **)

Raj. Inf. p. 107. No. 1. *Scarabaeus* antennis clavatis, clavis in annulos divifis.

Catholi-

*) Eigentlith bezeichnet der Franzofen ihr Calandre den *Curculio granivorus.*

**) Scybala inter vorandum ex ano protrudit, concatenata pendula.

Catholicon D. p. 189.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 101. *Derm.* 5. Le *Dermeste du lard.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 192. No. 1. t. 7. f. 15. *Dermeste du lard.*

Niger, *elytris* antice cinereis, nigro-punctatis.

2. *Elongatus*, das *Fadenkäferchen.* *)

Müller l. c. S. 100. No. 2. das *Drathkäferchen.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 409.

3. *Vndatus*, das *Wellenkäferchen.*

Müller l. c. S. 101. No. 3.

Füesslins Verz. S. 4. No. 44.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 612. der *gewässerte Hautfresser.*

Schaeff. Icon. t. 157. f. 7. a, 7. b.

Catholicon D. p. 189. das *Wellenkäferchen.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 410. D. *vndulatus.*

Fabric. S. E. p. 56. *Derm.* 5.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 199. No. 5. *Dermeste ondé.*

Oblongus niger; elytris *fascia alba duplici* transversa *vndulata.*

4. *Pellio*, der *schwarze weissgefleckte Speckkäfer.*

Müller l. c. S. 101. No. 4. der *Kirschner;* (der *Wurm, Motte* t. 3. f. 2.)

Füesslins Verz. S. 4. No. 45. der *Kirschner, Brodkäfer.*

Naturforscher 3. St. S. 58. 63.

Frisch

*) Nicht abgebildet.

Frisch Inf. 5. Th. S. 22. t. 8. der *braune Mottenwurm mit dem langhaarichten Schwanze.*

Catholicon D. S. 189. der *Kirschner.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 606. der *Hautfresser mit zween weissen Punkten auf den Flügeldecken.*

Poda Mus. graec. p. 22.

List. Goed. p. 276. f. 114.

Raj. Inf. p. 85. No. 35. *Scarabaeus* parvus, corpore brevi fusco; *elytris puncto albo* notatis.

Schaeff. Icon. t. 42. f. 4.

Fabric. S. E. p. 55. *Derm.* 4. Niger, elytris *puncto albo.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 411. *Suec.* Mahl.

Mülleri Faun. Fridr. p. 2. No. 16.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 486.

Niger, elytris *punctis albis binis*, variat *elytris fuscis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 100. *Derm.* 4. Le *Dermeste à deux points blancs.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 197. No. 3. *Dermeste à deux points blancs.*

D. *bipunctatus*, ovatus niger, elytris singulis *puncto albo.*

5. *Capucinus*, der *Zopfkäfer.*

Müller l. c. S. 102. No. 5. der *Kapuziner.*

Füesslins Verz. S. 4. No. 47. der *Kapuziner.*

Sulzers Gesch. S. 21. t. 2. f. 5. b. c. das *Kapuzkäferchen.*

Handbuch der Natur 4. Th. S. 403.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 602. der *Kapuziner.*

Schaeff. Elem. t. 28. *Bostrichus, Kapuzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 59. *Bostr.* 1.

Niger, *elytris abdomineque rubris, thorace* emarginato retuso,

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 302. *Boſtr.* 1. t. 5. f. 1. Le *Boſtriche.*

Niger, elytris *rubris.*

6. *Muricatus*, das *afrikaniſche Stachelkäferchen.**)

Müller l. c. S. 100. No. 6.

Beckmanns phyſ. oek. Bibl. 5. Th. S. 286.

Pallas Spicil. zool. faſc. 9. p. 6.

Fabric. S. E. p. 54. *Apate* 1.

Elytris reticulatis, poſtice retuſis dentatis, *thorace* muricato gibbo.

7. *Typographus*, der *Borkenkäfer.*

Müller l. c. S. 100. No. 7. der *Buchdrucker.*

Füeſslins Verz. S. 4. No. 48. der *Buchdrucker.*

Sulzers Geſch. S. 21. t. 2. f. 4. a. der *Buchdrucker.*

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 202. t. 11. f. 21. der *Käfer mit vierzehn gezähnten Einſchnitten auf den Flügeldecken.*

Scarabaeus thorace mutico, *elytris* apice excavatis 14 mucronibus inſtructis.

Berlin. Samml. 8. B. S. 17.

Schriften der Dronth. u. Norw. Geſ. 3. B. S. 345.

Linné Reiſe durch Oel. S. 31.

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 611. der *Buchſtabenmachende Hautfreſſer.*

Catholicon D. p. 189. der *Buchdrucker*; der *Buchſtabenmachende Hautfreſſer*; der *Borkenkäfer*, der *fliegende Wurm*; der *ſchwarze Wurm.*

Raj. Inſ. p. 100. No. 10. *Scarabaeus* antennis clavatis 10.

Act. Vpſal. 1736. p. 17. No. 6. *Dermeſtes* pubeſcens, *elytris* apice eroſis.

Acta

*) Nicht abgebildet.

Acta Acad. Scient. Suec. 1752. p. 156. t. 3. f. 11. 12.
Fabric. S. E. p. 59. *Bostrichus* 2.
Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 488.
Fuscus, pilosus, *elytris* striatis, postice retusis.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 193. *Ips* 1. t. 6. f. 1. 2. *Ips typographe.*
Pilosus fuscus; *elytris* postice oblique truncatis *dentatis.*

8. *Chalcographus*, der *Kupferstecher.**)
Müller l. c. S. 103. No. 8.
Fuesslins Verz. S. 4. No. 49. der *Kupferstecher.*
Catholicon D. p. 189. der *Kupferstecher.*
Fabric. S. E. p. 59. *Bostrichus* 3.

9. *Micrographus*, der *Kleinschreiber.***)
Müller l. c. S. 104. No. 9.
Füesslins Verz. S. 4. N. 50. der *Kleinschreiber.*
Catholicon D. p. 189. der *Kleinschreiber.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 605. der *Hautfresser mit haarichten Flügeldecken.*
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 195. *Ips* 4. *Ips micrographe.*
Ferrugineus, pedibus flavis, *elytris* postice oblique truncatis dentatis.

10. *Polygraphus*, der *Vielschreiber.*†)
Müller l. c. S. 104. No. 10. der *Zeichner.*
Füesslins Verz. S. 4. No. 51. der *Geschwindschreiber.*
Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 581. der *haarige schimmelgraue Rindenkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 610. der *Hautfresser mit schimmelfarbenen Flügeldecken.*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nirgends abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 196. *Ips* 5. *Ips Polygraphe.*

Rufo-fuſcus; *elytris* poſtice rotundatis.

11. *Piniperda*, der *Fichtenzerſtörer.*

Müller l. c. S. 104. No. 11. der *Waldgärtner.*
Füeſslins Verz. S. 4. No. 52. der *Kienbohrer.*
Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 505. der *fliegende ſchwarze Wurm*; der *haarige ſchwarze Fichten- und Tannenwurm.*

Catholicon D. p. 189. das *zottige Fichtenkäferchen*; der *Fichtenzerſtörer*; der *Waldgärtner*; *Dermeſte en deuil* *), das *Trauerkäferchen.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 607. der *die Fichten zerſtörende Hautfreſſer.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 421. *Naturae hortulanus.*

Fabric. S. E. p. 60. *Boſtrichus* 5.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 194. t. 6. f. 8. 9. *Ips* 2. *Deſtructeur du Pin.*

Subvilloſus niger nitidus; *elytris* punctis excavatis, *antennis plantisque* rufis.

Dieſe von No. 5. bis No. 11. u. ſ. w. will *Pallas* Spicil. zool. faſc. 9. p. 6. nicht zu den *Dermeſten* gerechnet wiſſen, ſondern ſagt: iſtas omnes *Ligniperdas* a victu conſtante appellari poſſe.

Ich werde einige dieſes *neuen* Geſchlechts gleich hinter die *Dermeſten* ſetzen.

12. *Do-*

*) *Geoffroi* Tom. I. p. 107. *Derm.* 19. heiſt auch *Dermeſte en deuil*; ſolcher iſt aber nach *Fabric.* S. E. p. 67. No. 3. *Silpha atomaria* Linn. No. 35.

12. *Domesticus*, das *Hauskäferchen*; das *Klopfkäferchen*; der *Tischbohrer*.

Müller l. c. S. 105. No. 12. das *Hauskäferchen*.
Fürstlins Verz. S. 4. No. 53. der *Hausschabkäfer*.
Swammerd. B. der N. S. 120. das *Kopfklopferchen*; *Hoofdklopperkens*; *Sonicephalus*.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 603. der in *den Häusern befindliche Hautfresser*.
Catholicon D. p. 189. der *Hautfresser in den Häusern*; das *Hauskäferchen*; la *Vrillette des Tables*, *Tischbohrer*; *holl.* Kloptorretje, *Klopfkäferchen*.
Acta Vpsal. 1736. p. 17. No. 17. *Dermestes* cylindraceus; collari crasso subhirsuto; *elytris* testaceis.
Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 20.
— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 489.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 111. t. 1. f. 6.*) *Byrrhus* 1. La *Vrillette des Tables*; *Pediculus pulsatorius*; *Horloge de la mort*; *Horologium mortis*.
Testaceo-niger; *thorace* subhirsuto.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 196. *Ips* 6. *Ips domestique*.
Niger, *elytris* griseis, margine nigris; *thorace* villoso.
Thom. Brown essai sur les erreurs populaires T. I. chap. 7. p. 219.

L'animal, qui fait ce bruit, est un petit Insecte *gris*, qui a des ailes doublées ou envelopées, et qu'on trouve pendant l'été dans les *Lambris*, ou autres ouvrages de *Menuiserie*. J'en ai pris un grand nombre, et les ayant enfermés en des bôites très minces, je les ai vu heurtrer avec leur *petite trompe* les cotés de la bôite, à peu près comme l'*Apicus martius* ou le *Grimpereau*

*) Nach dem *Linné* ist die sogenannte *Todtenuhr Termes pulsatorium* p. 1015. gen. 263. No. 2.

contre un arbre. Il est plus actif pendant les chaleurs, et frappe d'ordinaire *neuf* ou *onze* coups de suite.

13. *Violaceus*, der *Violetblaue Hautfresser.*

Müller l. c. S. 105. No. 13. der *Todtenfreund.*
Fuesslins schweiz. Inf. S. 4. No. 54. der *blaue.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 612. der *violette Hautfresser.*
Rajus Inf. 100. No. 12. *Scarabaeus* antennis clavatis 12.
Scopol. Entom. carn. No. 51. *Violaceus;* thorace elytrisque villosis. An idem?
Fabric. S. E. p. 57. *Dermestes* 10.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 487. *Coeruleus, thorace* villoso; *elytris* striatis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 304. *Clerus* 2. Le *Clairon bleu.* *Clerus* nigro-coeruleus.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 163. No. 4. t. 5. f. 13. *Clairon bleu.*
Clerus *) *coeruleus*, oblongus nigro-coeruleus nitidus; *elytris* punctis excavatis.

14. *Hirtus*, das *Rauchkäferchen.***)

Müller l. c. S. 106. No. 14. das *Bärenkäferchen.*
Catholicon D. p. 189. das *Bärenkäferchen.*
Fabric. S. E. p. 70. *Hispa* 4. Antennis *serratis*, atra, hirta.

15. *Fe-*

*) Aus einigen Käfern, welche *Linné Altelabos*, (Bienenkäfer, Afterrüsselkäfer) nennt, hat der Herr von *Geer* mit *Geoffroi* ein eigenes Geschlecht gemacht, und solche les *Clairons*; *Cleros* genannt.

**) *Nicht abgebildet.*

15. *Fenestralis*, der *Fenstergucker.**)

Müller l. c. S. 106. No. 15.

Füesslins Verz. S. 4. No. 55. der *Fenstergucker.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 443. *Chrysomela* fusca; capite nigricante.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 19.

— Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 505. *Byrrhus* festralis, castaneus, elytris punctato-striatis, oculis nigris.

Fabric. S. E. p. 58. *Dermest.* 19.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 197. *Ips* 7. *Ips epineux.*

Ips *spinosus* fusco-castaneus, *pedibus* rufis, *elytris* postice *sex-spinosis.*

16. *Melanocephalus*, der *Schwarzkopf.***)

Müller l. c. S. 106. No. 16.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 605. der *Hautfresser mit einem schwarzen Kopf.*

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 4.

Atrum glabrum; *elytris* griseis: macula communi baseos nigra.

17. *Scarabaeoïdes*, der *Erdkolbenkäferartige Hautfresser.*

Müller l. c. S. 106. No. 17. der *Distelfuss.*

Catholicon. D. p. 189. das *scharrkäferähnliche Fleischkäferchen.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *einem Skarabaeus gleichende Hautfresser.*

Scop. Entom. carn. No. 36. das *Cervellatwurstkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 66. *Sphaeridium* 1.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 494. Ovatus, niger, glaber, elytris maculis duabus *rubris.*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 106. *Dermeſt.* 17. Le *Dermeſte à quatre points rouges ſans ſtries.*

Niger, coleoptris *punctis rubris* quaternis, *elytris* laevibus, ſubrotundus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 345. t. 12. f. 17. *Eſcarbot d'ecaille.**)

HISTER (*teſtudinarius*) ovatus niger, glaber, pedibus fuſcis; *elytris* antice macula rubra poſtice fulva.

18. *Murinus*, das *Mauſekäferchen.*

Müller l. c. S. 107. No. 18.

Friſch Inf. 4. Th. S. 34. t. 18. der *ſchwarze glatte Fettwurm.*

Catholicon D. p. 189. das *wollichte braun- und aſchgraugewölkte Speckkäferchen.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 605. der *mauſefarbene Fettwurm.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 8.

Acta Vpſal. 1736. p. 17. No. 9. *Dermeſtes* oblongus; elytris *murinis* vix ſtriatis.

Schaeff. Icon. t. 42. f. 1. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 21.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 495. Ovato-oblongus, niger, tomentoſus, *abdomine* piceo.

Fabric. S. E. p. 56. *Dermeſtes* 7.

Oblongus, tomentoſus, nigro-alboque *nebuloſus*; abdomine niveo.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 102. *Derm.* 7. *Dermeſte à écuſſon chaune.*

Laevis, niger, *cinereo-nebuloſus*, ſcutello luteo.

de *Geer* Inf. T. IV. p. 197. *Derm.* 2. *Dermeſte nebuleux.*

D. (*nebuloſus*) niger, *cinereo-nebuloſus*, corpore ſubtus albido cinerascente, ſcutello hirſuto rufo.

19. *Pa-*

*) Der *Hiſter* Linn. iſt des *Geoffroi Attelabus; Eſcarbot.*

19. *Paniceus*, der *Brodfresser.*

Müller l. c. S. 107. No. 19.

Füesslins Verz. S. 4. No. 56. *Brodfresser.*

Berlin. Samml. 7. B. S. 387. 391. der *braungelbe Brodkäfer.*

Krünitz oekon. Encyklop. 7. Th. S. 336. der *eigentliche Bücherfeind*; der *Kleisterfresser.*

Frisch Ins. 2. Th. S. 36. t. 8. der *kleine gelbe Brodkäfer.*

Catholicon D. p. 189. der *Kleisterkäfer*; der *Papierkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 606. der *sich vom Brod nährende Fettkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 23.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 490. Ferrugineus, oculis rufis.

Fabric. S. E. p. 57. *Derm.* 14.

20. *Eustatius*, das *Schwammkäferchen.*

Müller l. c. S. 107. No. 20.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der *Hautfresser von der Insel Eustat in Amerika.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 197. t. 15. f. 20. 21. *Ips* exot. 1. *Ips d'Eustache.*

Niger nitidus, punctis minimis excavatis, *pedibus* rufo-fuscis, *capite* sub thorace recondito.

21. *Ferrugineus*, das *Roſtkäferchen.**)

Müller l. c. S. 107. No. 21.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 25.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 498. Ferrugineus, semicylindricus, *elytris* abbreviatis.

*) *Nirgends abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 77. *Nitidula* 3.

Ovata, *thorace* marginato, ferruginea, *capite* fusco.

22. *Fumatus*, das *Rauchkäferchen.**)

Müller l. c. S. 108. No. 22.

Füesslins Verz. S. 4. No. 57. der *Mistschabkäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 199. No. 11. *Stercoreus.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *sich in Koth aufhaltende Hautfresser.*

Scop. Entom. carn. No. 39. *Dermestes Rosae.* Ovatus, *ferrugineus*, villosus, *oculis nigris.*

Fabric. S. E. p. 57. *Dermestes* 12.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 24. Derm. *stercoreus.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 432. *Derm. stercoreus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 104. *Derm.* 12. *Dermeste du fumier.*

de *Geer* Inf. Tom. T. p. 195. *Ips* 3. *Ips du fumier.*

Testaceo-flavus, *oculis* nigris *elytris* punctis excavatis.

23. *Pediculatius*, das *Lausekäferchen.***)

Müller l. c. S. 108. No. 23.

Füesslins Verz. S. 4. No. 58. der *Stutzschabkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 26.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 497.

Flavus, oblongus; *elytris* abdomine acuto brevioribus.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 411. *Chrysomela* dilute testacea, hemiptera.

24. *Pu-*

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

24. *Pulicarius*, das *Flohkäferchen.**)

Müller l. c. S. 108. No. 24.

Füesslins Verz. S. 4. No. 59. der *Springer.*

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 793. No. 30. der *kleinste schwarze Blumenfloh.*

Acta Upsal. 1736. p. 16. No. 7. *Scarabaeus* minimus ater florilegus.

Raj. Ins. p. 108. No. 29. *Scarabaeus* antennis clavatis, clavis in annulos divisis.

Catholicon D. p. 189. der *Blumennager.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *gleich einem Floh hüpfende Hautfresser.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 200. No. 12.

Fabric. S. E. p. 68. *Sphaeridium* 9.

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 27.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 496.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 308. No. 4. *Antribe des fleurs.*

Niger; *elytris* abdomine brevioribus.

25. *Psyllius*, der *Flohsaame.***)

Müller l. c. S. 108. No. 25.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 610. der *Blumenhautfresser.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 28.

— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 492.

Ovatus, niger, *abdomine* obtuso; *thorace elytrisque* marginatis.

26. *Scanicus*, der *Hautfresser mit dem braunen Brustschilde.*†)

Müller

*) *Nirgends abgebildet.*

Einerley mit Linn. *Silpha pulicaria* No. 33.

**) *Nicht abgebildet.* †) *Nicht abgebildet.*

Müller l. c. S. 109. No. 26. der *Schwede.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *Hautfresser aus Skanien.*
Fabric. S. E. p. 58. *Dermestes* 18.
Ater, *thorace punctoque elytrorum* testaceis.
Mülleri Faun. Fridr. p. 4. No. 29.
— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 491.
Fuscus; *thorace* testaceo.

27. *Colon*, das *Kolonkäferchen.**)
Müller l. c. S. 109. No. 27.
Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 192. das *Kolonkäferchen.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 602. der *Hautfresser mit gelben Seiten an dem Brustschilde.*

28. *Niger*, das *Mohrkäferchen.***)
Müller l. c. S. 109. No. 28.
Fabric. S. E. p. 62. *Anobium* 4.
Scop. Entom. carn. No. 131. *Cantharis* pilosa.
Nigra, *longis pilis* vbique pubescens, *antennis* extrorsum crassioribus.

29. *Surinamensis*, der *Surinamische gestreifte Speckkäfer.*†)
Müller l. c. S. 109. No. 29. der *Surinamer.*
Lepechins Tageb. 1. Th. S. 262. der *Surinamische Speckkäfer.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. der *Surinamische Hautfresser.*

30. *He-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

30. *Hemipterus*, die *halbe Flügeldecke.*

Müller l. c. S. 110. No. 30. der *Halbdecker.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 603. der *Hautfresser mit halbharten Flügeldecken.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 224. No. 3. t. 18. f. 8. *Dermeste à etuis courts.*

Nigro-fuscus; *elytris* abbreviatis pallide griseis, *fascia* transversa vndulata nigra, pedibus rufis.

Unabgebildete Speckkäfer.

1. No. 2. Derm. *Elongatus.*
2. No. 6. *Muricatus.*
3. No. 8. *Chalcographus.*
4. No. 9. *Micrographus.*
5. No. 10. *Polygraphus.*
6. No. 14. *Hirtus.*
7. No. 15. *Fenestralis.*
8. No. 16. *Melanocephalus.*
9. No. 21. *Ferrugineus.*
10. No. 22. *Fumatus.*
11. No. 23. *Pedicularius.*
12. No. 24. *Pulicarius.*
13. No. 25. *Psyllius.*
14. No. 26. *Scanicus.*
15. No. 27. *Colon.*
16. No. 28. *Niger.*
17. No. 29. *Surinamensis.*

Neue Dermestesarten.

1. *Carnivorus*, der *neuseeländische Fleischfresser.*

Fabric. S. E. p. 55. *Dermest.* 2.

Niger, *elytris* antice testaceis *abdomine* albo.

2. *Cada-*

2. *Cadaverinus*, das *Aaskäferchen von der Insel Helena.*

Fabric. S. E. p. 55. *Dermest.* 3.
Niger, ore ferrugineo.

3. *20-guttata*, der *hallische Zwanzigtropfen.*

Fabric. S. E. p. 56. *Dermest.* 6.
Oblongus, ater, *punctis viginti* albis.

4. *Tessellatus*, das *englische gewürfelte Speckkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 56. *Derm.* 8.
Oblongus, tomentosus, fusco-cinereoque *nebulosus*, abdomine fusco.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 102. *Dermest.* 8. Le *Velours jaune Flavescens*, pilosus, oculis nigris.

5. *Navalis*, der *neuseeländische Schiffs-Speckkäfer.*

Fabric. S. E. p. 56. *Dermest.* 9.
Elongatus, ferrugineo-fuscus, oculis atris.

6. *Ruficollis*, der *ostindische Rothhals.*

Fabric. S. E. p. 57. *Dermest.* 11.
Violaceus, *thorace elytrorumque* basi rufis.

7. *Tomentosus*, das *englische Muffkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 57. *Dermest.* 13.
Oblongus, villosus, griseus, capite *punctis duobus* fuscis.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 199. No. 4. t. 7. f. 18. *Dermeste velu.*
Tomentosus oblongus, villosus, griseo-murinus, *oculis* nigris *pedibus* fulvis.

8. *Testa-*

8. *Testaceus*, das *holländische muschelbraune Speckkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 57. *Dermest.* 15.
Oblongus, testaceus, *oculis* abdominisque basi nigris.

9. *Scaber*, der *neuseeländische Hökerflügel.*

Fabric. S. E. p. 57. *Dermest.* 16.
Gryseus, thorace elytrisque *scabris.*

10. *Chinensis*, der *Chinesische Saamenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 58. *Dermest.* 17.
Oblongus, ferrugineus; *elytris* striatis.

11. *Scolytus*, das *Kolbenkäferchen.*

Sulzers Gesch. S. 21. t. 2. f. 13. k.
Schaeff. Icon. t. 112.

12. *Scolytus Geoffroi*, *Geoffrois Kolbenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 59. *Bostrichus* 4.
Glaber, *elytris* truncatis integris, abdomine retuso.
Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 310. No. 1. t. 5. f. 5. le *Scolite.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 503. SCOLYTUS *punctatus* niger, thorace fossulato; *elytris* lineis quatuor elevatis, intervallo punctorum duplice serie.

13. *4-punctatus*, *Sulzers vierpunktirter Speckkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 21. t. 2. f. 3.
Füesslins Verz. S. 4. No. 46. *der Vierpunkt.*

14. *Fa-*

14. *Fasciatus*, der *gelbgestreifte Speckkäfer*(*)

Mülleri Faun. Fridr. p. 4. No. 29.

Niger, elytris *fascia* longitudinali flava.

15. *Carbonarius*, der *Köhler*.

Scop. Entom. carn. p. 15. No. 38. Totus niger, *clavae* articulus quilibet pilum ex latere proferens.

16. *Variegatus*, der *buntgescheckte Speckkäfer*.

Scop. Entom. carn. No. 41. *Nigro-albo-rubroque varius*, in floribus Chaerophylli.

17. *Cellaris*, der *Kellerspeckkäfer*.

Scop. Entom. carn. No. 42. Rufus, oculis fuscis; *thorace* dentato.

In cellis vinariis ad *cavos cylindros*, vnde vinum educitur, non rarus.

18. *Boleti*, der *Speckkäfer auf dem Löcherschwamm*.

Scop. Entom. carn. No. 44. Niger, villosulus, punctulatus, oblongus; maxillis exsertis, incurvis, apice bidentatis.

19. *Brassicae*, das *Kohlspeckkäferchen*.

Scop. Entom. carn. No. 45. Atro-coeruleus, lucidus, punctatus; pedibus subrufis, in floribus Brassicae oleraceae.

20. *Ciliatus*, das *Speckkäferchen mit einem Augenhaar*.

Scop. Entom. carn. No. 46. Fuscus, thorace basi deflexo; *oculis vnico pilo ciliatis*.

21. *Leptu-*

*) S. No. 31.

21. *Lepturoïdes*, das *Lepturenartige Speckkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 47. *Elytris* truncatis; *tibiis* posticis ciliatis.

22. *Lepturoïdes rufus*, das *ungarische röthliche Speckkäferchen.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 35.

Rufus, thoracis lateribus parallelis marginatis; *elytra* rufa, striata.

23. *Lycoperdi*, das *Staubschwammspeckkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 48. Villosus, *thorace* fusco; *elytris* castaneis.

24. *Calthae*, das *Schmalzblumenspeckkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 49. Fuscus, punctatus nitens; abdominis apice pedibusque ferrugineis.

25. *Coerulescens*, das *himmelblaue Speckkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 50. Atro-coeruleus; *thorace* laevi, pedibus rufis.

26. *Plicatus*, das *Faltenspeckkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 52. Fuscus, *elytris* obiter striatis; *plica* frontali transversa bifida, inter antennas collocata.

27. *Punctatus*, das *punktirte Speckkäferchen.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 32. Niger, elytro singulo *punctis octo* albis.

28. *Spinipes*, der *Dornfuss.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 33. Niger, ovatus, femoribus rufis, *spinosis.*

29. *Pulvinatus*, das *Speckkäferchen mit einem runden polsterförmigen Brustschilde.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 87. No. 34.

Thorax subrotundus, pulvinatus, *elytrum* rufum, marginibus lineaque media longitudinali nigris.

30. *Rufipes*, der *Rothfuss.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 88. No. 36.

Oblongus, niger, nitens; antennarum clavae, palpi, pedes, rufo colore tincti.

31. *Fasciatus*, das *Idrische schwarz bandirte Speckkäferchen.**)

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 88. No. 37.

Oblongus, niger; *elytris* castaneis, *fascia nigra.*

32. *Silphoïdes*, das *silphenähnliche Speckkäferchen.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 38.

Oblongus niger; *elytris* plicatostriatis, *seriebus binis punctorum* impressorum intra singulas lineas.

33. *Bifasciatus*, der *Speckkäfer mit zwo Banden.*

Lepechin Tageb. 2. Th. S. 206. t. 10. f. 3.

Ater; *elytris* flavis; *fasciis* duabus nigro-coerulescentibus denticulatis.

34. *Capucinus*, der *schwarzbäuchige Kapuziner.*

Lepechin Tageb. 2. Th. S. 207. t. 11. f. 31.

Dermestes exacte *Capucinum* Linnei referens, excepto abdomine in nostro *nigro.*

35. *Lectu-*

*) S. No. 14.

35. *Lectularius*, der *Federwurm.**)
von *Gleichen* Neueſtes im Reiche der Pflanzen. Anh. S. 21. t. 9.
Neue Berlin. Mannichfalt. 3. Jahrg. S. 640. f. 1-7.
Nigricans, piloſus, coleopteris inaculis albis binis; in *plumis detritis.*

36. *Boleti verſicoloris*, der *Fettkäfer an dem bunten Löcherſchwamm.*
Franz von Paula *Schranck* Beytr. zur Naturgeſch. S. 49. t. 2. f. 21. t. 3. f. 1.
D. thorace marginato.

37. *Bipunctatus*, der *Fettkäfer mit zween Brandpunkten.*
Paula Schranck Beytr. S. 61. §. 1.
Oblongus niger; *thoracis* apicibus ferrugineis; ſtatura D. Linn. *violacei.*

38. *Glaber*, der *ganz glatte Speckkäfer.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 493. Ovatus niger, elytris apice, pedibusque brunneis.

39. *Ieſuita*, der *Ieſuit.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 494.
Oblongus niger, ſegmentis abdominis, ciliis albis.

40. *Vernalis*, der *Frühlings-Speckkäfer.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 500.
Oblongus, glaber, fuſcus, *antennis tarſisque flavis.*

*) vergl. *Friſch* 1. Th. S. 36. t. 10. der *rauhe Fleiſch- oder Speckwurm.*

41. *Salicinus*, der *Weiden-Speckkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prod. p. 57. No. 501. Cylindraceus niger, pedibus brunneis.

42. *Nebulosus*, der *ausgeblasste Speckkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 101. No. 6. le *Dermeste effacé.*

Nigro-fuscus, *elytris* antice pallidioribus *nebulosis.*

43. *Linearis*, das *schmale gestreifte Speckkäferchen.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 103. No. 9. le *Dermeste levrier à stries.*

Oblongus fuscus; *elytris* striatis.

44. *Punctato-striatus*, das *schmale punctirtgestreifte Speckkäferchen.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 103. No. 10. le *Dermeste levrier ponctué et strié.*

Oblongus ferrugineus, elytris *punctato-striatis.*

45. *Auritus*, der *geöhrte Speckkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 103. No. 11. le *Dermeste à oreilles.*

Tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus.

46. *Cristatus*, der *Federbusch-Speckkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 104. No. 13. le *Dermeste panaché.*

Nigro-fuscoque nebulosus; *elytris* vix striatis.

47. *Costatus*, das *Rippenförmig gestreifte Speckkäferchen.*

Geoffr.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 105. No. 14. le *Dermeſte à côtes.*

Nigro-fuſcoque nebuloſus; *thorace elytrisque* profunde ſtriatis punctatisque.

48. *Gagates*, das *ſchwarze achatfarbige Speckkäferchen.*

Geoffr. Inſ. T. I. p. 106. No. 18. le *Dermeſte jayet.*
Niger, ſubrotundus, *elytris* laevibus.

49. *Antennulatus*, das *langhörnige Speckkäferchen.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 107. No. 20. le *Dermeſte noir à longues antennes.*

Niger, ſubrotundus; *elytris* laevibus; *antennis* thorace longioribus.

50. *Fulvipes*, der *Gelbfuſs.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 108. No. 21. le *Dermeſte à pattes fauves.*

Niger, oblongus; *elytris* punctatis, pedibus fulvis.

51. *Pellucidus*, das *durchſichtige Speckkäferchen.*

Geoffr. Inſ. p. 108. No. 22. le *Dermeſte à etuis transparens.*

Elytris corneis pellucidis; *thorace* obſcuriore.

52. *Fornicatus*, der *gewölbte Speckkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 216. No. 9. t. 8. f. 15. *Dermeſte voute.*

Fuſcus obſcurus; *corpore* ovato laevi *fornicato*; *antennis* longiſſimis; *clava* ſubulata.

53. *Atomarius*, das *Atomenſpeckkäferchen.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 218. No. 10. t. 8. f. 16-19. *Dermeſte atome.*

Ovatus, *minutiſſimus* nigro fuſcus; antennis corporis dimidio longitudine; apice hirſutiſſimis.

54. *Armadillus*, der *gepanzerte Speckkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 220. No. 11. t. 8. f. 21. 23. *Dermeſte armadille.*

Minutiſſimus ovatus niger nitidus; *thoracis* marginibus pedibusque rufo-fuſcis pallidis.

Naturforſcher 8. St. S. 68. der *Panzerkäfer.*

55. *Ater*, der *ſchwarze Surinamiſche Speckkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 223. No. 1. t. 18. f. 7. *Dermeſte noir.*

Ovatus nigro-fuſcus; *antennis* rufis.

56. *Maculatus*, der *Surinamiſche gefleckte Speckkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 223. No. 2. *Dermeſte tacheté.*

Ovatus fuſcus; *thoracis* lateribus cinereis, abdomine ſubtus albo nigroque *maculato;* antennis rufis.

Neues, den Dermeſten ähnliches Geſchlecht.

*Ligniperda; Perce-bois, Holzverderber; Holzbohrer.**)

1. *Tere-*

*) Mehrere zu dieſem Geſchlecht gehörige Arten hat de *Geer* Tom. V. p. 191. unter dem Namen *Ips.* Was die Alten unter *Ips, Thrips, Cis, Midas, Trox* verſtanden haben: davon ſiehe *Schwenkfeld* Theriotr. Sileſ. p. 560.

1. *Terebrans*, der *antiguaische Holzbohrer.*

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. p. 6. 7. t. 1. f. 3.

Cylindricus; *thorace* subgloboso, *capite* scabro; *antennis* brevibus; *palpis* exiguis; *maxillis* acutis; *elytris* marginatis integris; *pectus* ferrugineo-hirsutum; *pedes* parvi, postici breviores.

2. *Cornutus*, der *gehörnte Holzbohrer.*

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. p. 8. t. 1. f. 4.

Magnitudo *Capucini;* caput ore hirsuto; *antennae* filiformes; *thorax* globosus, dentatus, mucronatus, *elytra* subpurpurascentia.

Dermestoïdes, das *afrikanische dermestesartige neue Insekt.*

Erxleb. physikal. Bibl. 2. B. S. 220.

In Nucibus arboris *Cocos. Coleoptera* Dermestidi proxima.

CISTELA, *Fugenkäfer.**)

Eberhards Thiergesch. S. 195. *Kegelkäfer.*
Sulzers Gesch. S. 26. *Fugenkäfer.*
Füesslins Verz. S. 5. *Fugenkäferchen.*
Schaeff. Elem. t. 45. f. 1. *Kegelkäfer.*
Fabric. S. 1. p. 116.
Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 12.**)
Geoffr. Ins. I. p. 115. la *Cistele.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 189. †)

*) Zu diesem Geschlecht gehören viele *Linnéische* Chrysomelen.

**) In *Cistelis* mortuis aut taotis pedes intra foveolam abdominis plicati, adpressique, et tarsi in fossulam tibiarum recipiuntur.

†) Die *Cistelas* des *Geoffroi* reclinet der Herr von *Geer* zu seinen *Dermesten.*

1. *Ornata*, das *gezierte Fugenkäferchen.*

Füesslins Verz. S. 5. No. 65.
Sulzers Gesch. S. 27. t. 2. f. 12.
Ovata, obscure-fusca, multisque *hilare-testaceis striis maculisque* variegata.

2. *Fasciata*, der *bandirte Fugenkäfer.**)

Füesslins Verz. S. 5. No. 66. *Forsters Fugenkäferchen.***)

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 12. No. 12. *Fasciata.*
Subvillosa fusca; *fasciis* longitudinalibus nigricantibus interruptis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 116. No. 1. t. 1. f. 8. la *Cistele satinée.*
Subvillosa viridescens, *fasciis* longitudinalibus fuscis interruptis.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 3.
Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 513. Cistela *Pilula*, ovata, nigra, subtomentosa. *Isl.* Guldvorta.
Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 1. †)
Cervina, livida, pedibus fuscis.

3. *Pustulata*, das *blatterichte Fugenkäferchen.*

Füesslins Verz. S. 5. No. 67. *Geoffrois Fugenkäferchen.* ††)

Forsteri

*) Dieses Käferchen ist des *Linnei* Byrrhus *Pilula* p. 568. No. 4. wie der Herr von *Geer* Tom. 4. pag. 213. *Dermest.* 8. gezeigt, und dabey eben diese Citata des *Geoffroi* und *Schaeffer* angeführt hat.

**) *Forster* hat noch mehrere Cistelas, warum sollte ich diesen vorzüglich *Forsters* Fugenkäfer nennen.

†) Diese *Geoffroische Cistele satinée* führt *Fabric.* l. c. bey seiner *Cistela cervina* an, und behauptet, es sey des Linn. *Chrysomela cervina* p. 602. No. 115. Welche *Verwirrung!*

††) Warum *Geoffrois* Fugenkäferchen, da derselbe drey Arten beschreibt?

Forsteri nov. spec. Ins. Cent. I. p. 13. No. 13. Ovata nigra, macula *elytrorum* rufa, vndata.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 116. No. 2. *Cistele à bande.* Subvillosa atra, *fascia* elytrorum transversa aurato-fusca.

4. *Nigro-nitida*, das *schwarzglänzende Fugenkäferchen.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 117. No. 3. la *Cistele noire lisse.*

Nigra, nitens, glabra.

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 14. No. 14. C. *nigra.* Ovata, nigra, nitens glabra.

5. *Striata*, das *gestreifte englische Fugenkäferchen.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 15. No. 15. Obovata nigra, *elytris* striatis.

6. *Sericea*, das *englische Seidenfugenkäferchen.*

Forsteri Ins. nov. sp. Cent. I. p. 16. No. 16. Ovata, fusco-viridis, *elytrorum* fasciis longitudinalibus interruptis.

7. *Stoica*, das *Fugenkäferchen mit rothem After.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 514. Ovata, nigra, *abdomine ferrugineo.*

8. *Nitens*, das *messinggländzende Fugenkäferchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 515. Ovata, *oricalcica;* abdomine pallido.

9. *Livida*, das *grüngelbliche feuerländische Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 2.
Livida, *antennis* fuscis.

10. *Testacea*, das *muschelbraune nördlicheuropäische Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 4.
Nigra, *thorace*, *elytris* abdomineque testaceis.

11. *Analis*, der *Tranquebarische Schwarzafter.*

Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 6.
Rufescens, antennis macula elytrorum, *anoque* nigris.

12. *Pallida*, das *blassfahle englische Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 8.
Pallida, *capite elytrorum*que apicibus fuscis.

13. *Aeruginea*, das *afrikanische rossfärbige Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 9.
Flava, *capite pectore*que nigris, *elytris* viridibus.

14. *Innuba*, das *amerikanische bandirte Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 117. *Cystela* 10.
Nigra, *thorace* rufo, *elytris* nigris margine *vitta*que luteis.

15. *Melanocephala*, der *amerikanische Schwarzkopf.*

Fabric. S. E. p. 118. *Cistela* 11.
Thorace flavo, *elytris* pallidis *vitta* media nigra.

16. *Quin-*

16. *Quinquevittata*, das *karolinische fünfbandirte Fugenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 118. *Cistela* 12.

Testacea, *elytrorum* marginibus *vittaque* media nigris.

192. GESCHLECHT. *Ptinus, Bohrkäfer.**)

Müllers Linn. Naturs. 5 Th. 1. B. S. 111. *Bohrkäfer.*
Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 4. *Bohrkäfer.*
Sulzers Gesch. S. 21. *Bohrkäfer.*
Neuer Schauplatz der Natur 1. B. S. 902. *Bohrkäfer.*
Naturforscher 8. St. S. 62.
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 700. *Bohrkäfer.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 64. *Ptilinus;* la *Panache;* p. 108. *Byrrhus;* la *Vrillette.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 224. *Vrillette.*

1. *Pectinicornis*, der *Federkamm.***)

Müller l. c p. 111. No. 1. t. 3. f. 3.
Füesslins Verz. S. 4. No. 60. *Federkamm.*
Sulzers Gesch. S. 22. t. 2. f. 6. *Federkamm.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 412.
Dermestes pectinicornis.

Ono-

*) Dieses Geschlecht ist lange genug mit den *Dermestibus*, *Cassidis* (Schildkäfern) und *Cerambycibus* (Holzböcken) verwechselt worden, bis ihm *Geoffroi* sein Recht gegeben, und daraus ein eigenes Geschlecht gemacht hat, so er *Byrrhus* nennt. *Linné* ist ihm darinn gefolgt, nur mit dem Unterschiede, dass er es *Ptinus* nennet.

**) *Linn.* Citat. Geoffr. 1. Ptinus 2. ist falsch, und muss heissen Ptilinus 1. denn der *Ptilinus* 2. des *Geoffr.* p. 66. la *Panache jaune* mögte wohl des *Linn. Cantharis pectinicornis* p. 650. No. 20. seyn.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 606. der *strahlförmige Fettkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 3. No. 17.

— Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 874.

PTILINVS *cylindricus*, niger, *antennis pedibus* rufis, *abdomine* elytrisque fuscis.

Fabric. S. E. p. 70. *Hispa* 3. *Antennis* pectinatis, fusca, pedibus luteis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 65. *Ptilinus* 1. la *Panache brune.* Atro-fuscus, thorace convexo, *pedibus antennisque* pallidis.

2. *Pertinax*, der *Trotzkopf.*

Müller l. c. S. 112. No. 2. t. 3. f. 4. der *Holzbohrer.*

Füeſslins Verz. S. 4. No. 61.

Beckmanns Anfangsgr. S. 91. der *halsſtarrige Speckkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 666. P. 3. p. 607. P. 6. p. 700. *Cassida* nigra etc. der *ſchwarze Schildkäfer mit borſtenähnlichen Fühlhörnern.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 384.

Cassida nigra, antennis ſetaceis.

— — — ed. 2. No. 414. *Dermeſtes* fuscus, antennis filiformibus.

Fabric. S. E. p. 62. *Anobium* 1.

Fuscum immaculatum.

Acta Vpſal. 1736. p. 17. No. 5. *Dermeſtes* corpore oblongo; *elytris* ſtriatis; *capite* clypeato.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 504.

Byrrhus pertinax, niger, *elytris* ſtriato-punctatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 112. *Byrrhus* 4. la *Vrillette Savoyarde.*

Totus nigro-fuscus.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 227. No. 1. t. 8. f. 24. 25. *Vrillette opiniâtre.*

Nigro-fuſcus; *elytris* ſtriatis, *thorace* ad angulos macula fulva.

3. *Mollis*, der *Weichſchild.*

Müller l. c. S. 112. No. 3.

Füeſslins Verz. S. 4. No. 62. *Weichſchild.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 605. P. 6. p. 700. der *weiche Hautfreſſer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 3. No. 18. *Dermeſtes* mollis.

Fabric. S. E. p. 62. *Anobium* 2.*)

Teſtaceum, oculis nigris.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 111. *Byrrhus* 2. la *Vrillette de la farine.*

Teſtaceus glaber, *oculis* nigris.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 230. No. 4. t. 8. f. 29. *Vrillette molle.*

Rufo-fuſcus, oculis nigris; *elytrorum* apice rufo.

4. *Imperialis*, der *Adler.*

Müller l. c. S. 112. No. 4.

Füeſslins Verz. S. 4. No. 63. *Kayſerlicher.*

Sulzers Geſch. S. 22. t. 2. f. 7. der *Kayſerliche.*

Fabric. S. E. p. 63. *Ptinus* 3.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 507.

BRVCHVS *imperialis* ſubovatus cinereus, *elytris* fuſcis, macula futurae alba, pinnata.

5. *Fur*,

*) Nach dem *Geer* iſt es des *Geoffroi Vrillette de la farine*; nach dem *Fabric.* aber deſſen *Byrrhus* 3. p. 112. La *Vrillette fauve.* Fulvus obſcurus, oculis nigris. Es ſcheint, als habe lezterer nur die Beſchreibung verwechſelt, weil die richtige No. 2. daſtehet.

5. *Fur*, der *Insektendieb.**)

Müller l. c. S. 113. No. 5. der *Kräuterdieb.*
Füesslins Verz. S. 5. No. 64. der *Dieb.*
Sulzers Gesch. S. 22. t. 2. f. 8. der *Dieb.*
Berlin. Magazin 4. B. S. 413.
— — *Samml.* 7. B. S. 383.
Stralf. Magaz. 1. B. 3. St. S. 247. *Ceramb. fur*, der *kleine schädliche Holzbock.*
Bonnets Insektol. S. 342.
Fränkische Samml. 1. B. S. 277.
Der *Naturforscher* 3. St. S. 58-61. 8. St. S. 62. t. 2. *Verwüster, Verderber.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 206. t. 16. *Ceramb. fur.*
Frisch Ins. 13. Th. S. 22. t. 15. Ein *schwarzer brauner Holzkäfer von den kleinsten.*
Goed. Ins. Tom. II. t. 41.
List. Goed. p. 276. No. 114. f. 114.
Mas gracilis, *femina* rotundior, duabus *fasciis* albis.
Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 761. P. 6. p. 700. der *muschelfarbigte Holzbock mit einem gedoppelten weissen Strich auf den Flügeldecken, und Dornen an der Brust.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 487.
Cerambyx testaceus, elytrorum *fascia* duplici alba, *thorace* spinoso.
— — — ed. 2. No. 657.
Cerambyx fur, thorace spinoso gibboso, *coleoptris* ovatis; *fascia* duplici albida, antennis filiformibus mediocribus.
Schaeff. Elem. t. 30. *Bruchus, Buckelkäfer.*
Scop. Entom. Carn. No. 210. *Bupreftis* fur. *Thorax* latere vnidentatus, tuberculis posticis binis. Variat

1. colore

*) Merkwürdig, dafs die *Weibchen* keine Flügel haben.

1. colore ferrugineo absque fasciis et tuberculis thoracinis obscurioribus.
2. fasciis elytri 2. albis.

Fabric. S. E. p. 63. *Ptinus* 2.
Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 127.
Cerambyx fur.
— Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 509.

BRVCHVS *fur*, ovatus testaceus subapterus, thorace trisulcato; *elytris* rufis *fasciis* duabus albis.

Bog-Möll.

Variat *elytris* pilis hirtis punctisque quatuor albis.

Acta Nidr. P. 3. p. 12.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 164. *Bruchus* 1. t. 2. f. 6. la *Bruche à bandes.*

Testaceus, *elytrorum* fascia duplici alba.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 231. No. 5. t. 9. f. 5. 6. *Vrillette carnacière.*

Rapax, ovatus rufo-fuscus, albedine maculatus, *thorace* angulato, villis flavis, *antennis* longitudine corporis.

6. *Germanus*, der *Runzelbohrer.**)

Müller l. c. p. 113. No. 6.
der *Naturforscher* 8. St. S. 87. t. 2. f. 10. 11.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 57. No. 508.

BRVCHVS *furunculus*, oblongus testaceus, *alatus*, thorace trisulcato, *elytris* concoloribus immaculatis.

Mas furis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 112. *Byrrhus* 5. la *Vrillette brune à bandes grises.*

Fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

Neue

*) Das Männchen hat lange *Flohrflügel*, und variirt auch zuweilen mit einigen *aschgrauen Queerstreifen auf den Flügeldecken.*

Neue Ptinusarten.

1. *Gigas*, der *neuholländische gröſste Bohrkäfer.*

Fabric. S. E. p. 63. *Ptinus* 1. Griſeus, elytris poſtice cinereis.

2. *Latro*, der *Straſsburgiſche Räuber.*

Fabric. S. E. p. 63. *Ptinus* 4.
Thorace bidentato, teſtaceus, immaculatus.

3. *Pannonicus*, der *ungariſche Bohrkäfer.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 89. No. 39.
Fuſco-rufus, *pedibus rufis*, ſubpellucidis, nitidis.

4. *Rufo-villoſus*, der *Fuchs.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 230. No. 2. *Vrillette velue rouſſe.*
Rubro-fuſcus, villoſus, oculis nigris.

5. *Punctatus*, der *punktirte Bohrkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 230. No. 3. *Vrillette pointillée.*
Griſeo-fuſcus; *elytris* ſtriatis punctatisque excavatis.

6. *Teſtaceo-villoſus*, der *braune Bär.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 235. No. 6. t. 9. f. 8. *Vrillette fauve velue.*
Oblongus griſeo-teſtaceus villoſus; antennis pedibusque rufis.

193. GESCHLECHT. *Hister*, der *Harlekin*, der *Gaukler*; *französ.* Escarbot; *holl.* Mestkeverties.

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 114. *Dungkäfer.*
Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 5. *Stutzkäfer.*
Sulzers Kennz. S. 50. *schwarzer Speckkäfer.*
— — Gesch. S. 23. *Stutzkäfer*; Escarbot.
Börners Samml. 1. Th. S. 460. *schwarzer Speckkäfer.*
Beckmanns Anfangsgr. S. 92. der *Gaukler.*
Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 268.
Pontoppidans N. G. v. D. S. 200. der *Harlekin.*
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 252. der *Gaukler.*
Schaeff. Elem. t. 24. *Altelabus, Schildkrötenkäfer.*
Fabric. S. E. p. 52.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 93. *Altelabus, Escarbot.*
de *Geer* Ins. Tom. 4. Prael. VII. No. 49. pag. 340. *Escarbot.*

1. *Maximus*, der *gröste einfarbige indianische Stutzkäfer.**)
Müller l. c. S. 114. No. 1. der *Indianer.*
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 253. der *gröste Gaukler.*

2. *Maior*, der *grosse afrikanische Stutzkäfer.***)
Müller l. c. S. 115. No. 2. der *Afrikaner.*
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 253. der *grosse Gaukler.*
Fabric. S. E. p. 52. No. 1.

3. *Vnicolor*, der *ganz schwarze europäische Stutzkäfer.*
Müller.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Müller l. c. S. 115. No. 3. t. 3. f. 7. der *Europäer.*
Füeſslins Verz. S. 5. No. 69. *Einfarbigter.*
Fabric. S. E. p. 52. No. 2.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 410.
Coccinella atra glabra; *elytris* abdomine brevioribus, margine inflexis.
Acta Vpſal. 1736. No. 10. *Dermeſtes* ſubrotundus ater nitidus; *elytris* brevibus.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 27. die *ſchwarze kahle Coccinelle, mit kurzen am Rande eingebogenen Flügeldecken.*
— — P. 4. p. 254. der *gleichfarbene Gaukler.*
Scop. Entom. carn. No. 30.*)
Niger, lucidus, glaber; *elytro* ſtriis 5 exterioribus obſoletis; *tibiis* anticis multidentatis.
Raj. Inſ. p. 91. No. 7. *Scarabaeus* antennis globuloſis.
Schaeff. Icon. t. 42. f. 10.
Müllleri Faun. Fridr. p. 4. No. 31.
— Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 482.
Act. Nidr. Tom. 4. p. 5. t. 16. f. 4.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 94. *Altelab.* 4. t. 1. f. 4. *L'Eſcarbot noir.*
Totus niger, *elytris* laevibus nonnihil ſtriatis.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 342. No. 1. t. 12. f. 12. *Eſcarbot noir.*
Niger nitidus, *elytris* ſtriatis.

4. *Pygmaeus*, das *ſchwediſche Zwerglein.*

Müller l. c. S. 116. No. 4. t. 3. f. 8. der *Zwerg.*
Füeſslins Verz. S. 5. No. 70. das *Zwerglein.*
Onomat. hiſt. nat. P. 4. p. 253. der *Zwerg.*
Fabric.

*) Neglectis *Antennis* a *Scarabaeo* nemo diſtinguet. *Acaris Coleoptr.* infeſtatur.

Fabric. S. F. p. 53. No. 5.
Schaeff. Icon. t. 42. f. 10.
Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 56. N. 484.
Ater, *punctulatus*, pedibus piceis.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 344. No. 4. *Eſcarbot nain.*
Nigro-fuſcus; *elytris* dimidio ſtriatis.

5. *Bimaculatus*, der *rothe Zweyfleck.*

Müller l. c. S. 116. No. 5. der *Zweyfleck.*
Füeſslins Verz. S. 5. No. 71. der *Zweyfleck.*
Onomat. hiſt. nat. P. 4. pag. 253. der *Gaukler mit zween rothen Flecken.*
Fabric. S. E. p. 53. No. 7.
Scop. Entom. carn. No. 31. *Hiſter ſimetarius.* Niger, *elytris* apice rufis.
Vddm. Diſſ. 20. *Coccinella* atra *glabra - maculis duabus rubris.*
Schaeff. Elem. t. 24. f. 1.
— — Icon. t. 3. f. 9.
Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 56. No. 483. Ater, *elytris* ſtriatis; macula media *rubra.*
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 95. *Altelabus* 2. L'*Eſcarbot à taches rouges.*
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 343. No. 2. *Eſcarbot à deux taches rouges.*
Niger nitidus, *elytris* ſingulis *macula obſcura rubra.*

6. *4-maculatus*, der *rothe Vierfleck.*

Müller l. c. S. 116. No. 6. der *Vierfleck.*
Füeſslins Verz. S. 5. No. 72. der *Vierfleck.*
Onomatol. hiſt. nat. P. 4. p. 253. der *Schiltkröten-käfer.*
Schaeff. Elem. t. 24. f. 2.

Fabric. S. E. p. 53. No. 8.
Müllerі Faun. Fridr. p. 4. No. 32.
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 86. No. 30.
Niger, elytro singulo *maculis binis rubris*, superiore lunata.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 344. No. 3. *Escarbot à quatre taches rouges.*
Niger nitidus; *elytris* singulis *maculis binis* obscure nitidis.

Unabgebildete.

1. No. 1. *Maximus.*
2. No. 2. *Major.*

Neue Stutzkäferarten.

1. *Planus*, der *platte Gaukler.*

Füesslins Verz. S. 5. No. 68. der *Platte.*
Sulzers Gesch. S. 23. t. 2. f. 9. das *Blättchen.*

2. *Cyaneus*, der *neuholländische himmelblaue Stutzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 52. No. 3. *Thorace* aeneo, *elytris* coerulescentibus.

3. *Brunneus*, der *schwedische ganz braune Stutzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 52. No. 4. *Ferrugineus; elytris* substriatis.

4. *Abbreviatus*, der *nordamerikanische Kurzstrich.*

Fabric. S. E. p. 53. No. 6. Ater; *elytris* crenato-striatis, striis interioribus abbreviatis.

5. *Aeneus*,

5. *Aeneus*, der *englische kupferfarbigte Stutzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 53. No. 9. *Elytris* basi striatis, apice punctatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 95. *Altelabus* 3.
Nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.

6. *Detritus*, der *neuholländische verblaßte Stutzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 53. No. 10. Ater, nitens, *elytris* piceis, apice obscuris-punctatis et quasi *detritis.*

7. *Apterus*, der *Skopolische ungeflügelte Stutzkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 32. Fulvus, alisque destitutus.

8. *Striatus*, der *englische gestreifte Stutzkäfer.*

Forster. nov. sp. Inf. Cent. I. p. 11. No. 11. Ater, thorace elytrisque *striatis.*

194. GESCHLECHT. *Gyrinus; Drehkäfer; Taumelkäfer; Wasserfloh; Wasserläufer.*

Müllers Linn. Naturf. 5. Th. 1. B. S. 117. *Drehkäfer.*
Füeßlins Verz. schweiz. Inf. S. 5. *Taumelkäfer.*
Sulzers Gesch. S. 24. *Taumelkäfer.*
Eberhards Thiergesch. S. 194. *Taumelkäfer.*
Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 400. *Drehkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 115. 116. *Taumelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 234. *Gyrinus.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 193. *Tourniquet.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. prael. VIII. No. 51. p. 354 *Tourniquet.*

1. *Natator*, der *Schwimmer.*
Müller l. c. S. 117. No. 1.
Füeſslins Verz. S. 5. No. 73. der *Schwimmer.*
Sulzers Geſch. S. 25. t. 2. f. 10. der *Schwimmer.*
— *Kennz.* S. 42. t. 6. f. 43. *Dytiſcus natator*, der *glatte eyrunde Waſſerkäfer.*
Abhandl. der ſchwed. Akad. der W. 32. B. S. 321. *Gyrinus natator.*
Röſels Inſektenbel. 3. B. S. 194. t. 31. der *kleine glänzende ſchwarze und ſtinkende Waſſerkäfer.*
Neuer Schauplatz der Natur 2. Band, S. 400. der *Schwimmmer; Waſſerfloh.*
Trembley Geſch. der Polypen. *Ueberſ.* S. 180. der *kleine eyförmige Waſſerkäfer mit ſtahlblauen Flügeldecken.**)
Beckmanns phyſik. oekon. Bibl. 5. B. S. 259.
Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 696. der *kleine glänzende ſchwarze und ſtinkende Waſſerkäfer; Dytiſcus* natator.
— P. 4. p. 115. *Gyrinus* natator, der *Taumelkäfer.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 779. *Dytiſcus* natator ovatus glaber. *Smol.* Walten-bagge.
Merret pin. 203. *Pulex* aquaticus.
Scop. Entom. carn. No. 299. *Dytiſcus* natator.
Fabric. S. E. p. 234. No. 1.
Schaeff. Elem. t. 67. *Taumelkäfer.*
— Icon. t. 134. f. 5. a. b.
Müllerі Faun. Fridr. p. 19. No. 193.
— Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 651.
Niger, *elytris* ſtriatis; pectore anoque rufis; pedibus luteis.
Vand-Loppe; Lille Vand-Torbiſt.
Act. Nidr. IV. p. 27. t. 16. f. 13.

Geoffr.

*) In *Trembley* l. c. hab' ich den *Dytiſcus caraboïdes* L. p. 664. No. 2. ſtatt dieſes unrichtig angegeben.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 194. No. 1. t. 3. f. 3. le *Tourniquet.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 355. No. I. t. 13. f. 4. *Tourniquet nageur.*

Coeruleo-ater nitidus, pedibus rufis.

2. *Americanus*, der *ungeſtreifte amerikaniſche Taumelkäfer.**)

Müller l. c. S. 118. No. 2. der *ungeſtreifte.*

Neuer Schauplatz der N. 2. B. S. 400.

Abhandl. der ſchwed. Akad. der W. 32. B. S. 334.

Onomat. hiſt. nat. P. 4. pag. 118. der *amerikaniſche Taumelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 235. No. 3.

Neue Arten dieſes Geſchlechts.

1. *Auſtralis*, der *neuholländiſche grünliche Taumelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 235. No. 2.

Vireſcens, ſubſtriatus, *elytris* abbreviatis, vnidentatis.

2. *Villoſus*, der *zottige Taumelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 652. Subtus luteus, ſupra cinereus, pubeſcens.

195. GESCHLECHT. *Byrrhus. Nagende Wollenkäfer; Knollkäferchen; Blumenblütenkäferchen.***)

*) *Nicht abgebildet.*

**) Zu dieſen Linnéiſchen *Byrrhis* gehört das *Geoffroi Anthrenus*, und der Aeltern *Ciſtela*; der Herr von *Geer* hat ſie zu den *Dermeſten* gerechnet.

Müllers Linn. Naturſ. 5. Th. 1. B. S. 119. *nagende Wollenkäfer.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 5. *Knollkäferchen.*

Sulzers Geſch. S. 25. *Knollkäferchen.*

Eberhards Thiergeſch. S. 195. *Anthrenus; Blumenſtaubkäfer.*

Catholicon B. p. 430.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 113. *Anthrenus.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. prael. VII. No. 46. p. 189.

1. *Scrophulariae*, das *geſprenkelte Knollkäferchen.**)

Müller l. c. S. 119. No. 1. t. 3. f. 5. der *Braunwurznager.*

Füeſslins Verz. S. 5. No. 74. der *Braunwurznager.*

Sulzers Geſch. S. 26. t. 2. f. 11. der *Braunwurznager.*

Naturforſcher 8. St. S. 68.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 412.

Coccinella villoſa, coleopterorum margine inflexo, *futuris rubris.*

— — ed. 2. No. 429. *Dermeſtes* Scrophulariae.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 34. No. 5. *Coccinella* villoſa etc. die *zottige Coccinell mit rothen Näthen.*

— — P. 3. p. 611. *Dermeſtes* Scrophulariae.

Schaeff. Elem. t. 17. *Anthrenus, Blumenſtaubkäfer.*

— — Icon. t. 176. f. 4.

Raj.

*) Auf allen *Birnblüten.* Es hat ordentliche *Federſchuppen*, die mit kurzen Kielen in den Löchern der Flügeldecken ſtecken, wie die *Schmetterlinge.* Vermuthlich eben das Käferchen, von welchem *Needham* ſolches ſchon angemerkt hat. S. das alte *hamb. Magaz.* 1. B. S. 407. wie denn der Herr von *Geer* dergleichen auch von verſchiedenen *Rüßelkäfern* verſichert. Inſ. Tom. 4. p. 204. Die prächtigſten hat der Curculio *argentatus.*

Raj. Inſ. p. 85. No. 37. *Scarabaeus* parvus, corpore ſubrotundo, collo oblongo, alarum *elytris* nigris, binis punctis albicantibus notatis.

Acta Vpſal. 1736. p. 18. No. 3. *Gyrimus* nigricans maior.

Fabric. S. E. p. 61. *Anthrenus* 2.

Niger, *elytris* albo-maculatis *ſutura ſanguinea.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 516. *Anthrenus* Scrophulariae.

Niger, *ſquamulis albis*, tibiis flavis. *Dan.* Skiael-Baſſe.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 114. *Anthrenus* 1. t. 1. f. 7. Anthrenus *ſquamoſus; l'Anthrene à broderie.*

Squamoſus niger; faſcia punctisque coleoptrorum albis, *futuris* fuſcis.*)

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 200. *Dermeſtes* 6. t. 7. f. 20. *Dermeſte de la Scrophulaire.*

Ovatus niger, maculis ſquamoſis albis; *ſutura elytrorum rubra.*

2. *Muſaeorum*, der *Kabinetkäfer.*

Müller l. c. S. 120. No. 2.

Füeſslins Verz. S. 5. No. 75.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 411.

Coccinella villoſa, coleopterorum margine inflexo, thoracis macula baſeos vtrinque alba.

— — ed. 2. No. 430. *Dermeſtes* Muſaeorum.

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 35. die *zottigte Coccinell mit zwey weiſſen Bruſtflecken.*

Fabric. S. E. p. 61. *Anthrenus* 3.

Nebuloſus, *elytris* ſubnebuloſis.

*) Dieſes Citatum hat *Fabricius* zu ſeinem Anthren. 1. *Pimpinellae* geſetzt.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 517. *Anthrenus* Musaeorum.

Nebulosus, *elytris* striato-punctatis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 115. *Anthrenus* 2. L'*Amourette.**)

Squamosus niger, *elytris* fuscis, *fascia* triplici vndulata alba.

de *Geer* Ins. T. IV. p. 203. *Dermestes* 7. t. 8. f. 11. 12. *Dermestes des Cabinets.*

Ovatus, fuscus, obscurus, *maculis squamosis* griseis.

3. *Verbasci*, der *Wollkrautfresser.***)

Müller l. c. S. 120. No. 3.

Füesslins Verz. S. 5. No. 76. der *Wollkrautnager.*

Fabric. S. E. p. 61. *Anthrenus* 4.†)

Niger, *elytris* fasciis tribus vndatis albis.

4. *Pillula*, die *Pillenkugel.*††)

Müller l. c. S. 120. No. 4.

Olaffs Reise durch Isl. 1. Th. S. 319. *Guldvarte* (Goldwarze).

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 427. *Dermestes Pilula.*

— — — ed. 1. No. 536. *Mordella* subrotunda colore murino.

Acta Vpsal. 1736. p. 18. No. 2. *Mordella* colore murino.

Müllеri

*) Dieses Citatum stehet im *Geer* bey diesem B. Musaeorum; im *Fabricius* aber bey B. *Verbasci*, wozu es Linné auch gesetzt hat.

**) *Nicht abgebildet.*

†) Zu diesem hat *Fabric.* das vorige Citatum des *Geoffroi* gesetzet.

††) v. *Cistela fasciata* No. 2.

Müllleri Faun. Fridr. p. 3. No. 22. *Dermestes* Pilula.
Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus* 1.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 213. No. 9. t. 7. f. 23. *Dermeſte pilule.*
Ovatus, ſupra nigro-aeneus, ſubtus totus niger; *elytris* faſciis interruptis aeneis.

5. *Vagus*, der *Schwärmer.**)
Müller l. c. S. 121. No. 5.

Unabgebildete.

1. No. 3. *Verbaſci.*
2. No. 5. *Vagus.*

Neue Byrrhusarten.

1. *Varius*, die *engliſche Buntſchecke.*
Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus* 2.
Niger, *thorace* aeneo, *elytris* fuſcis, ſtriis tribus abbreviatis viridibus nigro-maculatis.

2. *Aeneus*, das *upſaliſche kupferfarbigte Knollkäferchen.*
Fabric. S. E. p. 60. *Byrrhus* 3.
Totus aeneus.

3. *Pimpinellae*, der *Pimpinellnager.*
Fabric. S. E. p. 61. *Anthrenus* 1.**)
Niger, *elytris* faſcia alba, apice ferrugineis, litura alba.

*) *Nicht abgebildet.*
**) Hierbey hat *Fabric.* noch des *Geoffroi Anthrenus* 1. Tom. I. p. 114. angeführt, welches Citatum nach dem *Geer* bey B. *Scrophulariae* ſtehet.

196. GESCHLECHT. *Silpha. franz.* Bouclier; *Geiferkäfer; Aaskäfer; Bisamkäfer; Todtengräber; Maulwurfskäfer; Erdkäfer.*

Müller L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 122. *Todtengräber.*

Füesslins schweiz. Ins. p. 5. *Aaskäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der Naturh. p. 93. *Todtengräber.*

Eberhards Versuch einer Thiergesch. p. 195. *Aaskäfer.*

Sulzers Kennz. S. 51. *Todtengräber.*

Neuer Schauplatz der Natur 1. Th. S. *Aaskäfer, Todtengräber.*

Börners Samml. aus der Naturgesch. etc. 1. Th. S. 464. *Todtengräber; Maulwurfskäfer.**)

Gleditsch vermischte physikalisch-botanisch-oekonomische Abhandl. 3. Th. S. 200. ff.

Sulzers Gesch. S. 27. *Aaskäfer.* le *Bouclier, Fossoyeur.*

Ionst. hist. nat. de Ins. p. m. 98. t. 14. Tab. Aldrov. 1-7. Scar. *foetidus.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 147.

Mülleri Faun. Fridrichdal. p. 4.

Mülleri

*) Der Herr M. *Börner* hat davon eine besondere Unterabtheilung gemacht, welche der Ritter nicht hat.

1. mit Flügeldecken, die *kürzer* als der Hinterleib sind;
2. mit Flügeldecken, die *länger* als der Hinterleib sind.

Pallas fasc. 9. p. 6. will die *Silphas* lieber, zu den *Dermesten* gerechnet wissen.

Des Linn. Silph. *russicam* No. 10. rechnet de *Geer* Ins. T. 5. p. 283. zu dem eigenen Geschlecht, welches *Geoffroi* Anthribus, *Bürstenkäfer*, nennet.

In den ersten Ausgaben des Natursystems, und der Faun. Suec. nannte diese der Ritter Cassidas, oder *Schildkäfer.*

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 63. *Peltis.* p. 96. *Silpha.*

Fabric. S. E. p. 72. *Nicrophorus*, *Silpha*, *Opatrum*, *Nitidula.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 200.

de *Geer* Inf. Tom. 4. prael. VI. No. 44. p. 164. des *Boucliers.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 96. fq. *Dermeſtes. Peltis.* p. 117. et *Anthribus* p. 308.

Commentar. Lipſ. Dec. I. P. III. 679. Suppl. p. 276.

1. *Germanica*, der *gröſte ſchwarze Todtengräber.**)

Müller l. c. p. 123. t. 3. f. 9. der *Trauergräber.*

Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 5. No. 77.

Sulzers Kennz. t. 2. f. 10.

Berlin. Samml. 8. B. p. 573.

Gleditſch vermiſchte Abhandl. 3. Th. p. 225. der *gröſte Todtengräber.* t. 1. f. C.

Pontopp. N. G. v. D. p. 200. No. 1. t. 16.

— — Atlas Dan. I. t. 29.

Berlin. Samml. 8. B. S. 573. der *groſse ſchwarze Todtengräber.*

von *Geer* Inſ. Ueberſ. 3. Qu. S. 83.

Fabric. S. E. p. 71. *Nicrophorus* 1. Ater, clypeo obrotundo, inaequali.

Rajus Inſ. 107. 1. *Scarabaeus* antennis clavatis, clavis in annulos diviſis, *primus.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 99. No. 2. Le *grand Dermeſte noir.* *Thorace marginato*, *elytris* abſciſſis, totus niger.

de *Geer* Inſ. Tom. 4. p. 173. No. 2. t. 6. f. 4. *Grand Bouclier noir.*

*) Das *Männchen* unter den *neuen* No. 1. *Specioſa.*

Silpha (*nigra maior*) tota atra, *elytris* truncatis abdomine brevioribus.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1087.

Nigra, clypeo subrotundo, gibbo; *elytris* truncatis; margine laterali obsolete ferrugineis.

2. *Vespillo*, der *schwarz und roth gefleckte Todtengräber.**)

Müller l. c. p. 123. t. 3. f. 10. der *Bisamkäfer.*

Füesslins schweiz. Ins. p. 5. No. 78. der *Todtengräber.*

Rösels 4. B. S. 3. t. 1. der *mit Recht sogenannte Todtengräber.*

Frisch Ins. 12. Th. S. 28. 3. Platte t. 2. f. 2. der *Muskäfer.*

Pontoppidans N. G. v. D. p. 200. No. 2. der *Gräber.*

Gleditsch vermischte Abhandlungen etc. 3. Th. S. 222. t. 1. f. A. der *kleinste Todtengräber*, der *gemeine Todtengräber.*

Bonnets Abhandlungen aus der Insektologie. S. 248.

— — und anderer Naturf. Abhandl. aus der Insektol. S. 157.

Neue Berlin. Mannichfalt. 3. Jahrg. S. 266.

Lessers Theol. der Ins. S. 310. der *Muskuskäfer.*

Linn.

*) Wenn diese Käfer nach der Begattung wieder aus der Erde hervorkommen, starren sie von *Milben* (Acaris Coleoptratorum Linn. p. 1026. No. 27.), welche die meisten Schriftsteller *Läuse* nennen; daher dieser Käfer auch der *Lausekäfer* heissen könnte. Bey der Beschreibung dieser Käfer in *Müllers* Erklär. 5. B. 1. Th. S. 122. 124. hab' ich nur *zweyerley* zu berichtigen:

1. dass sie das begrabene Aas unter der Erde nicht *verspeisen*, sondern ihre Brut hineinlegen.
2. dass es keine *achtfüßige Läuse*, wohl aber *Milben* giebt, deren Hauptkarakter dieser ist: dass sie *acht Füße* haben.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 444.

— Faun. Suec. ed. 1. No. 349. *Scarabaeus* clypeo marginato, *elytris* nigris; fasciis duabus transversis rubris.

Mouffet lat. p. 149. lin. 7. f. 3. ord. perpend. et app. t. ult. *Cantharis* tertius.

Imperat. alt. 692. t. 2. f. 2. *Cantharis* fasciata.

Rajus Hist. Ins. p. 106. *Scarabaeus foetidus* primus Aldrovandi, der *erste Aldrovandische Stinkkäfer.*

Aldrovand. Lib. 4. c. 3. p. 79. *Scar. Serpentarius*, der *Schlangenkäfer.*

Ionston hist. nat. Ins. p. m. 98. Tab. XIV. Aldrov. t. 6. f. 3. Scar. *Serpentarius.*

Scopoli Entom. carn. No. 33. *Dermestes* Vespillo.

Mülleri Faun. Fridr. p. 4. No. 33.

— Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1086. Atra, *clypeo* quadrato; *elytris* truncatis; *fasciis* binis rufis.

Fabric. S. E. p. 72. NICROPHORVS *vulgaris* 2. Ater, *elytris* fascia duplici ferruginea.

Lister loqu. 381. 2. *Scarabaeus* majusculus, *niger, duabus luteis fasciis* vndulatis transversim ductis supra alarum thecas.

Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. III. 680.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 4.

de *Geer* Ins. T. 4. p. 168. No. 1. t. 6. f. 1. *Bouclier fossoyeur.*

S. *nigra*, elytris truncatis abdomine *brevioribus:* fascia lata duplici *ferruginea* transversa undata.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 98. No. 1. t. 1. f. 5. Le *Dermeste à point d' Hongrie (mit Steppwerk, das wellenförmig gemacht ist).*

Dermestes thorace marginato, *elytris* abscissis nigris, *fasciis* duabus transversis undulatis luteis.

3. *Bimaculata*, der *barbarische Zweyfleck.**)

Müller l. c. p. 125. No. 3.

4. *Bipustulata*, der *Dóppelpunkt.***)

Müller l. c. p. 125. No. 4.

Mülleri Faun. Fridr. p. 4. No. 34. der *zweypunktirte Küchenkäfer.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 591. *Peltis* bipust. Nigra, *elytrorum* punctis binis pedibusque rufis.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 13. der *rothgesprenkelte Glander.*

Fabric. S. E. p. 77. *Nitidula* 1.
Ovata, nigra, *elytris* puncto rubro.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 363. *Dermestes* niger etc,

— — — ed. 2. No. 445.

Acta Upsal. 1736. pag. 17. No. 12. *Dermestes* niger etc.

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 186. No. 13. t. 6. f. 22. 23. *Bouclier à deux points rouges.*

Nigra, corpore obtuso, *elytris* singulis macula vnica *rubra.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 100. No. 3. Le *Dermeste à deux point rouges.*

5. *4-pustulata*, der *viergefleckte Faulholzkäfer.*

Müller l. c. p. 125. No. 5. der *Vierfleck.*

Frisch Ins. 9. Th. p. 36. t. 19. der *gelbfleckigte kleine Käfer aus dem wollschwitzenden Wurm.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 364. *Dermestes* niger etc.

— — — ed. 2. No. 446. *Silpha* quadripust. *Fabric.*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Ist dem Dermestes *Pellio* sehr ähnlich.

Fabric. S. E. p. 69. *Tritoma* 3.

Oblonga, nigra, *elytris* punctis *duobus* ferrugineis.

de *Geer* Inſ. Tom. 4. p. 185. No. 12. t. 6. f. 20. 21. *Bouclier à quatre points rouges.*

Silpha nigra oblonga depreſſa, *elytris* ſingulis maculis *duabus rubris.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 106. No. 16. Le *Dermeſte à quatre points rouges, ſtrié.**)

Dermeſtes niger, coleoptris punctis rubris *quaternis*, elytris ſtriatis, oblongus.

6. *Indica*, der *indianiſche zweygezähnte Bruſtſchild.***)

Müller l. c. p. 126. No. 6. der *Indianer.*

Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 3.

7. *Americana*, der *amerikaniſche Todtengräber, mit dem gelben Schilde.*

Müller l. c. p. 126. No. 7. der *Amerikaner.*

Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. f. 5. BLATTA *americana*, die *amerikaniſche Schabe.*

Seligmann ausländiſche und ſeltene Vögel Tom. 4. t. 108. f. 7. *Scarabaeus peltatus*, der *Schildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 4.

Depreſſa nigra, thorace *flavo;* centro nigro.

8. *Semi-*

*) Von dieſem leztern Citato ſagt der Herr Prof. *Fabricius:* de Synomino *Geoffr.* dubito; nam *elytra* in noſtra *laeviſſima.*

Sehr ſelten.

**) *Nirgends abgebildet.*

8. *Seminulum*, das *Saamenkorn.**)

Müller l. c. p. 126. No. 8.
Füesslins schweiz. Ins. p. 5. No. 79.
Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 14.

9. *Agaricina*, der *Lerchenschwammkäfer.***)

Müller l. c. p. 126. No. 9. der *Schwammkäfer.*
Scopoli Entom. carn. No. 43. *Dermestes agaricinus.*

10. *Russica*, der *rothe russische Todtengräber.*

Müller l. c. p. 126. No. 10. der *Russe.*
Vddmann diss. 7. *Dermestes* elytris nigris, capite, clypeo et abdomine *rubro.*
Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 5.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 283. No. 1. t. 8. f. 12. *Anthribe rouge à etuis noirs*, der *rothe Bürstenkäfer mit schwarzen Flügeldecken.*
Anthribus (ruber) ovato-oblongus ruber nitidus, *antennis elytrisque* nigris nitidis.†)

11. *Littoralis*, der *Uferkäfer.*

Müller l. c. p. 127. No. 11.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 81. der *Strandaaskäfer.*
Frisch Ins. 6. Th. S. 12. t. 5. f. 1. die *Feldschabe* und ihr *Käfer.*
Pontoppid. N. G. v. D. p. 200. No. 3.

Linn.

*) *Nirgends abgebildet.* S. unter den *neuen* No. 44.
**) *Nirgends abgebildet.*
†) Er rechnet ihn also zu den *Anthribis* des *Geoffroi*, und sagt, dass er mit den *Chrysomelen* viel ähnliches habe; keinesweges aber zu den *Silphen* gehöre.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 380.

Cassida atra, elytris lineis tribus elevatis; antennis antice testaceis.

— — — ed. 2. No. 450.

Scop. Entom. carn. No. 55. *Silpha* littoralis.

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 590. *Peltis* littoralis.

Atra, *clypeo* orbiculato, nitido; *elytris* abdomine brevioribus.

Fabric. S. E. p. 72. *Silpha* 2.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 120. No. 3. Le *Bouclier à bosses*, der *bucklichte Aaskäfer.*

Peltis nigra, elytris *tribus lineis* elevatis, prima et secunda *gibbositate* connexis; *thorace* laevi.

de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 176. No. 4. *Bouclier à boutons roux*, der *rothknöpfige Aaskäfer.*

Silpha (rufo-clavata) oblonga nigra, thorace orbiculato nitido, elytris *lineis* elevatis tribus, clava antennarum rufa.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 663. *Cassida* atra etc. der *schwarze Schildkäfer mit drey erhabenen Strichen auf den Flügeldecken.*

12. *Atrata*, der *schwarzglänzende Aaskäfer mit punktirten Flügeldecken.*

Müller l. c. pag. 127. No. 12. t. 3. f. 11. die *Seidentrauer.* v. No. 18.

Pontopp. N. G. v. D. p. 200. No. 4.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 385. *Cassida* nigra etc.

— — — ed. 2. No. 451.

Poda Musf. graec. p. 23.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 667. der schwarze *Schildkäfer* mit dreyen erhöheten Strichen auf den Flügeldecken, und lauter Punkten dazwischen, und in einem ganzen vornen rund laufenden Schild.

Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 9.
Schaeff. Elem. t. 96. f. 1. *Peltis*, *Geiferkäfer.*
— — Icon. t. 93. f. 5.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 118. No. 1. Le *Bouclier noir à trois rayes et corcelet liſſe. Peltis* nigra etc.
de *Geer* Inſ. Tom. 4. p. 177. No. 5. t. 6. f. 15. *Bouclier à points concaves.*
Silpha (punctata) nigra nitida, *elytris* punctatis; *lineis* elevatis tribus laevibus; *clava* antennarum nigra.*)
Müller Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 587. *Peltis* atrata. Nigra, *clypeo* antice rotundato, nitido; *elytrorum* lineis tribus abbreviatis; ſpatio interjecto rugoſo.
— — Faun. Fridr. p. 4. No. 35.

13. *Thoracica*, der *Rothſchild.*

Müller l. c. p. 128. No. 13. der *Schildträger.*
Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. p. 6. No. 83. die *Rothbruſt.*
Sulzers Kennz. t. 2. f. 12. der *Schildkäfer.*
Pontoppid. N. G. v. D. p. 200. der *roſtfarbige Rückenſchild.*
Poda Muſ. graec. p. 23.
Onomatol. hiſt. nat. P. 2. p. 667. *Caſſida* nigra, clypeo ferrugineo etc. der ſchwarze *Schildkäfer* mit einem roſtfarbigen Schild, und einem erhabenen Strich auf jeder Flügeldecke.

Linn.

*) Zu dieſem Käfer hat der Herr von *Geer* das, vom *Linné* bey der vorigen Nummer angeführte Citatum des *Friſch* Inſ. 6. Th. p. 12. t. 5. geſetzt.

Da das Bruſtſtück dieſer Käfer vorne her einen glatten Rand hat, und alſo einem Schilde ſehr ähnlich ſiehet; ſo wird *dieſe Art* beſonders im Franzöſiſchen *Bouclier* genennet.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 386. *Cassida* nigra, clypeo ferrugineo.

— — — ed. 2. No. 452.

Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 6.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 4.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 121. No. 6. Le *Bouclier à corcelet jaune.*

Peltis nigra, thorace ferrugineo, lineis tribus elevatis acutis.

de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 174. No. 3. t. 6. f. 7. *Bouclier à corcelet rouillé.*

Silpha nigra, thorace ferrugineo, elytris lineis tribus longitudinalibus: *vnica* elevata.

Müllleri Faun. Fridr. p. 4. No. 36.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 583. *Peltis* thoracica. Nigra; *clypeo* rufo, emarginato; *elytrorum* linea extima elevatiori sinuata.

Act. Nidr. P. 3. p. 384. t. 6. f. 1.

14. *Quadripunctata*, der *gelbe Aaskäfer mit vier schwarzen Punkten.*

Müller l. c. p. 128. No. 14. der *Vierpunkt.*

Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 84. der *Vierpunkt.*

Pontoppid. N. O. v. D. p. 200. No. 6.

Prodr. Insect. Siaelland.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 86. No. 31.

Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 14.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 122. No. 7. t. 2. f. 1. Le *Bouclier jaune à taches noires.* *Peltis* nigra etc.

de *Geer* Inf. Tom. 4. pag. 181. No. 6. *Bouclier* à quatre points noirs.

Silpha corpore nigro, *thorace* testaceo: macula magna nigra; *elytris* flavo-testaceis, punctis duobus nigris.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 63. *Peltis* quadripunctata. Dan. St. *Hans Orm*, *Glands-Flue.* Nigra, *thoracis* lateribus *elytrisque* flavis, *maculis* 4 elytrorum nigris.

15. *Opaca*, der *braune Aaskäfer.*

Müller l. c. p. 128. No. 15. der *braune Gräber.*
Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 85. der *Braune.*
Schaeff. Icon. t. 93. f. 6.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 383. *Cassida* nigra etc.
— — — ed. 2. No. 454.
Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 668. *Cassida* nigra etc.
der *schwarze Schildkäfer mit fünf glatten Streifen auf den Flügeldecken, und einem Rand vorn an dem Brustschilde.*

Fabric. S. E. p. 74. *Silpha* 12.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 585. *Peltis* opaca. Nigra, supra murina, tomentosa; *clypeo* truncato, *elytris* lineis elevatis subternis; *unguibus rubris.*

16. *Rugosa*, der *runzlichte Aaskäfer.*

Müller l. c. p. 129. No. 16. der *Runzelkäfer.*
Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 86. der *Runzlichte.*
Lepechins R. durch Rufsl. 1. Th. p. 262. der *runzlichte Todtengräber*, der *Kofszaken-* der *Lappländische Hüttenkäfer.*
Müller Faun. Fridr. p. 4. No. 37.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 379. *Cassida* nigra etc.
— — — ed. 2. No. 455.
Acta Upsal. 1736. No. 3. *Dermestes* niger, punctis elevatis etc.
Raj. Inf. p. 90. No. 9. *Scarabaeus* inter cadavera frequens etc.

Onoma-

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 663. *Cassida* atra etc. der *schwarze Schildkäfer mit fünf erhabenen Strichen und Punkten auf den Flügeldecken.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 120. No. 4. *Bouclier noir chifonné, à corcelet raboteux; Peltis* nigra — *thorace* scabro.

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 182. No. 7. *Bouclier raboteux. Silpha* nigra opaca, elytris tuberculatis, lineis tribus elevatis inaequalibus.

— — Tom. 5. p. 43. No. 5. t. 2. f. 21. *Tenebrion chagriné*, die *chagrinartige Hausschabe.**)

Tenebrio *rugosus* alatus niger, corpore ovato, *thorace* rugoso; *elytris* tuberculis scabris.

17. *Sabulosa*, der *Sandgräber.***)

Müller l. c. p. 129. No. 17.

Füesslins schweizer. Ins. p. 6. No. 87.

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B. pag. 347.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 382. *Cassida* nigra etc.

— — — ed. 2. No. 456.

Acta Upsal. 1736. p. 17. *Cassida* nigra etc.

Vddm. diss. 5. *Dermestes* niger etc.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 350. No. 7. Le *Tenebrion à stries dentelées. Tenebrio* atra, elytris striis quinque utrinque dentatis.

Müller Faun. Fridr. p. 5. No. 38.

*) Der Herr von *Geer* rechnet dieses Insekt nachmals aus folgenden Gründen zu den *Schaben* (Tenebrio), und nicht mehr zu den *Silphis*, weil es keine durchblätterte Fühlhörner (perfoliatae), und die Fussblätter am lezten Paar Füsse nur *vier*, die andern aber *fünf* Gelenke haben.

**) *Nirgends abgebildet.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 589. *Peltis* fabulosa. Nigra, supra cinerea, *clypeo* emarginato; *elytris* lineis tribus vtrinque tuberculatis.

Fabric. S. E. p. 76. *Opatrum* 1.

Fuscum, *elytris* lineis elevatis tribus dentatis, *thorace* emarginato.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 688. *Cassida* nigra etc. der *schwarze Schildkäfer mit fünf auf den Seiten mit Zähnen versehenen Streifen auf den Flügeldecken, und einem Rand vorn an dem Schilde.*

18. *Obscura*, der *ohnglänzige schwarze Aaskäfer.**)

Müller l. c. p. 129. No. 18. die *Tuchtrauer*. v. No. 12.

Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 88.

Müller Faun. Fridr. p. 5. No. 39.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 584. *Peltis* obscura. Nigra, *clypeo* truncato, *elytrorum* lineis tribus elevatis, punctis inaequalibus.

Vddm. diss. 8. *Cassida* ovata nigra etc.

Poda Mus. gr. p. 23.

Fabric. S. E. p. 74. *Silpha* 11.

19. *Ferruginea*, der *rostfarbige Breitkopf.*

Müller l. c. p. 130. No. 19. die *Breitbrust.*

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 665. *Cassida* ferruginea etc. der rostfarbige *Schildkäfer mit vertieften Punkten und erhöheten Strichen auf den Flügeldecken.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 387. *Cassida* ferruginea etc.

— — — ed. 2. No. 458.

Schaeff. Icon. t. 40. f. 7.

Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 16.

Raj.

*) *Nirgends abgebildet.*

Raj. Inſ. 84. 33. *Scarabaeus* minor e rufo ſordide nigricans, *elytris* ſtriatis.

de *Geer* Inſ. Tom. 4. p. 183. No. 9. *Bouclier punaiſe*, der *Wanzenähnliche Aaskäfer.*

Silpha *Cimicoides*, ſupra fuſco-caſtanea rufo-marginata, ſubtus rufa, *elytris* lineis elevatis ſenis punctisque excavatis.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 600. *Peltis* ferr. Rufa, *clypeo* emarginato, *elytrisque* ſtriatis nigro-maculatis.

20. *Reticulata*, der *netzförmige Aaskäfer.**)

Müller l. c. p. 130. No. 20. der *Breitkopf.*

21. *Groſſa*, der *dickrunde Aaskäfer.*

Müller l. c. p. 130. No. 21. der *Dickſack.*

— — Faun. Frid. p. 5. No. 40.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 588. *Peltis* groſſa. Nigra, *clypeo* antice emarginato, poſtice lineari; *elytris* punctatis; *lineis* elevatis tribus.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 3.

22. *Oblonga*, der *länglicht ſchmale Aaskäfer.***)

Müller l. c. p. 131. No. 22. der *Smalhans.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 2. p. 664. *Caſſida* atra, elytris ſtriis *decem* elevatis etc. der ſchwarze *Schildkäfer mit zehn erhabenen Strichen und vertieften geſtreiften Punkten auf den Flügeldecken.*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.* Iſt es aber nach *Sulzers* Geſch. S. 28. des *Geoffr.* Antribe noir ſtrié Tom. I. p. 307. ſo nehme ich dieſes zurück, daſs er nicht abgebildet ſey. S. hinten unter den neuen No. 8. *Flavifrons.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 381. *Cassida* atra etc.
— — — ed. 2. No. 460.
Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 17.
de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 185. No. 11. *Bouclier oblong.*
Silpha *oblonga*, fusco-nigra, elytris lineis octo elevatis punctisque excavatis.

23. *Scabra*, der *schwarze Aaskäfer mit höckrichten Deckschilden.*

Müller l. c. p. 131. No. 23. der *Rauhpelz.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 586. *Peltis scabra.* Nigra, fronte pube rufa; *thorace* antice emarginato, *elytrisque* tuberculis depressis nitidis.
Schaeff. Icon. t. 93. f. 4.

24. *Rufipes*, der *Rothfuss.**)
Müller l. c. p. 131. No. 24.
Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 8.
Nigra, nitida, *pedibus pallidis.*

25. *Aquatica*, der *Wasseraaskäfer.*
Müller l. c. p. 131. No. 25. der *Wasserpatscher.*
Füesslins schweiz. Inf. p. 6. No. 91. der *Schwimmer.*
Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 3. B. p. 348. No. 4.
Fabric. S. E. p. 66. *Elophorus* 1.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 105. No. 15. Le *Dermeste bronzé*, der *kupferfarbige Hautfresser.*
Dermestes viridi-aeneus, thorace fasciis quatuor elevatis, *elytris* punctato-striatis.
de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 379. No. 5. t. 15. f. 5. 6.
Hydrophile bronzé. *Hydrophilus* (aeneus) viridi-aeneus,

*) *Nirgends abgebildet.*

neus, *thorace* virescente sulcato, *elytris* punctato-striatis, antennis pedibusque rufis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 606. *Peltis* aquatica. Viridi aenea; *thorace* longitudinaliter rugoso; *elytris* punctatis striatis; pedibus flavis.

26. *Succincta*, der *Gürtelträger*.*)

Müller l. c. p. 131. No. 26.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 92.

27. *Colon*, das *Kolon*.

Müller l. c. p. 132. No. 27.
Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 192.
Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 4.

Nigra, *elytris* ferrugineo variis, *thorace* emarginato.

de *Geer* Ins. Tom. 4. pag. 187. No. 14. t. 6. f. 24. *Bouclier Colon.*

Rufo-fusca nigro maculata, thorace *duplici puncto* impresso, corpore subtus toto fusco.

28. *Fusca*, der *Pechbauch*.**)

Müller l. c. p. 132. No. 28.

29. *Depressa*, der *Plattbauch*.†)

Müller l. c. p. 132. No. 29.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 601. *Peltis* depressa. Ferruginea, capite nigro; *elytris* maculis pallide luteis.

. 30. *Gri-*

*) *Nirgends abgebildet.* S. unter den *neuen* No. 41.
**) *Nirgends abgebildet.*
†) *Nirgends abgebildet.*

30. *Grisea*, der *Greis.**)

Müller l. c. p. 132. No. 30.

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 184. No. 10. *Bouclier tacheté*, der *gefleckte Aaskäfer.*

Supra rufo-fusca nigro-maculata; subtus rufa immaculata.

31. *Testacea*, der *muschelbraune Aaskäfer.***)

Müller l. c. p. 133. No. 31. der *Ziegler.*

32. *Aestiva*, der *Blumenkratzer.*†)

Müller l. c. p. 133. No. 32.

Müller Faun. Fridr. p. 5. No. 41.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 64. No. 604. *Peltis* aestiva. Testacea subtomentosa; *thorace* emarginato, *oculis* nigris.

Fabric. S. E. p. 77. *Nitidula* 2.

Testacea, subtomentosa, *thorace* emarginato, oculis nigris.

33. *Pulicaria*, der *Blumenfloh.*††)

Müller l. c. p. 133. No. 33.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 611. *Dermestes pulicarius.*
Catholicon A. p. 364. *Anthribus, Flohkäferchen.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 308. No. 4. *Anthribus.*
Charlet. Onom. p. 50. *Wingless-Hornet.*

34. *Pediculatia*, die *Blumenlaus.*†††)

Müller l. c. p. 133. No. 34.

Fabric.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) *Nirgends abgebildet.*

††) Eben dieses Insekt hat *Linné* bereits als *Dermestes pulicarius* No. 24. mit einerley Worten beschrieben.

Nirgends abgebildet.

†††) *Nirgends abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 6.
Nigra, *elytris* laevibus, *thorace* marginato.

35. *Atomaria*, die *Blumenmilbe.**)
Müller l. c. p. 134. No. 35.
Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 3.
Laeve, atrum, *elytris* crenato-striatis, pedibus pallidis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 107. No. 19. Le *Dermeste en deuil*, das *Trauerkäferchen.***) *Dermestes* niger, subrotundus, *elytris* striatis.

Unabgebildete Linnéische Silphae.

1. No. 3. *Bimaculata.*
2. No. 6. *Indica.*
3. No. 8. *Seminulum.*
4. No. 9. *Agaricina.*
5. No. 17. *Sabulosa.*
6. No. 18. *Obscura.*
7. No. 20. *Reticulata.*
8. No. 22. *Oblonga.*
9. No. 24. *Rufipes.*
10. No. 26. *Succincta.*
11. No. 28. *Fusca.*
12. No. 29. *Depressa.*
13. No. 30. *Grisea.*
14. No. 31. *Testacea.*

15. No-

*) *Nirgends abgebildet.* Vielleicht gehört er zu den *Geerischen* Derm. *atomar.* S. die neuen *Dermestesarten* No. 40.
**) Die Benennung: *Dermeste en deuil*, sagt Herr Prof. *Müller* Erkl. 5. B. 1. Th. S. 105. gäbe man in Frankreich einer gewissen Art kleiner Käferchen, wozu vielleicht Derm. *Piniperda* No. 11. gehöre.

15. No. 32. *Aestiva.*
16. No. 33. *Pulicaria.*
17. No. 34. *Pedicularia.*
18. No. 35. *Atomaria.*

Neue Aaskäfer- oder Silphenarten.

1. *Speciosa*, der *ansehnlichste und gröste deutsche Todtengräber, mit vier orangefarbenen Flecken auf den Flügeldecken.*

Der *Naturforscher* 6. St. p. 95. 96. t. 4. f. 3.

Oblonga, *atra*, *maculis 4 aurantiacis*, superioribus didymis; in *Germania* prope agros fecalinos.*)

An *sexu* diversa a Silpha *germanica*?

2. *Humator*, der *mittlere Todtengräber.***)

Gleditsch vermischte physikalisch-botanisch-oekonomische Abhandl. 3. B. p. 224. No. 2. t. 1. f. B.

Oblonga nigra, clypeo orbiculato inaequali, *elytris* nigris, antennarum lamellis ferrugineis; inter *germanicum* et *vespillonem* media; in *Saxonia.*

Raj. Inf. p. 107. No. 1.

List. loqu. 381. *Scarabaeus majusculus* ex toto niger.

3. *Contusa*, der *schwarze Todtengräber mit stumpfen Flügeldecken.*

Müller

*) Auch in unsern Gegenden bey *Quedlinburg* findet sich dieser ansehnliche Käfer, den ich, weil er sich seltener zeiget, für das *Männchen* von Silpha *germanica* halte. Die rothen Flecke aber vergehen mit der Zeit.

**) Da der Ritter den Lister bey Silph. *germ.* angeführet hat; so erhellet, dass er diesen nicht gekannt, sondern mit jenem verwechselt habe.

Müller Faun. Fridr. p. 5. No. 42.
Nigra, elytris sulcatis, *contusis*; in *Semita*.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 593. *Peltis* contusa.
Nigra, clypeo tomentoso, antice et postice emarginato, elytris *trilineatis* pubescentibus.

4. *Grisea*, der *graulichte Todtengräber*.
Pontoppid. N. G. von D. p. 201. No. 16. t. 16. a. b. *)
Thorace pallide-fusco; *elytra* testacea, marginibus et fascia fuscis.

5. *Clavipes*, der *Keulschenkel*.**)
Sulzers Gesch. t. 2. f. 14. S. 28.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 80.
Tota *nigra;* maxima in *Helvetia*, *antennae* antice ferrugineae; postica crura mirum *crassa*, inclinata, denteque instructa.

6. *Appendiculata*, der *Deckelschwanz*.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 89.
Sulz. Gesch. t. 2. f. 15. S. 28. der *Geschwänzte*.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 120. *Peltis* 2. Le *Bouclier noir à corcelet raboteux*. *Peltis* nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, *thorace scabro*.
Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 13. *Sinuata*. Thorace emarginato rugosissimo, elytris lineis elevatis tribus apice *sinuatis*.

7. *Polita*,

*) Ausser diesem, sagt der *Bischof*, findet man noch *sechs andere Arten* von veränderter Grösse, Linien, u. s. w. die aber nicht beschrieben sind.
**) V. No. 35.

7. *Polita*, der *glatte Todtengräber.*

Füesslins, schweiz. Ins. p. 6. No. 90.
Sulz. Gesch. t. 2. f. 16. S. 28. der *Glatte.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 122. *Peltis* 8. La *gouttière.*
Peltis nigra tota, elytris *laevibus*, punctis minimis excavatis.
Fabric. S. E. p. 74. Silpha 10. *laevigata.*
Atra, elytris *laevibus* subpunctatis.

8. *Flavifrons*, der *Gelbkopf.*

Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 93.*)
Sulz. Gesch. t. 2. f. 17. S. 28.
Geoffr. Ins. Tom. I. t. 5. f. 2. p. 307. *Anthribus* 3. *Antribe noir strié.* Ater, *elytris* apice cinerascentibus.
Schaeff. Elem. t. 18. f. 1. *Anthribus*, *Bürstenkäfer.*

9. *Multistriata*, der *alexandrinische Vielstrich.*

Forskal descript. Animal etc. in itin. orient. p. 77.
Cinerea; elytris striis plurimis; *thorace* emarginato.
Facies et magnitudo Silphae *fabulosae.* Tota cinerea; *striis* in singulo elytro 8. excavatis; interstitiis, microscopio visis, tuberculatis.
Alexandriae sub herbis, rarius.

10. *Nov-*

*) Da ihn *Füeßlin* nie auf den *Blumen*, sondern oft in hartem, schon lange gelegenen *Buchholz*, unter desselben Rinde angetroffen hat; so rechnet er ihn unter die *Silphen.* *Füeßlin* hat ihn mit einem Sternchen bezeichnet, weil ihn *Linné* nicht hat; *Sulzer* aber sagt l. c. es sey *Linnei* No. 22. S. *oblonga*, welches ich nicht entscheiden will.

10. *Noveboracensis*, der *neuyorkische Rothrand.*

Forster nov. spec. Ins. Cent. I. p. 17. No. 17.

Nigra, *elytris* piceis; lineis elevatis subternis, clypeo retuso, disco atro, *margine rubro.*

In *Americae Septentrionalis* provincia *Noveboracensi.*

11. *Scabra*, der *hökrichte Aaskäfer.*

Scopoli Entom. carn. No. 59.

Thorax subcinereus, *tuberculis* atris seriatis *scaber.* *Elytris* striis 3. elevatis ramosis.

12. *Flavicans*, der *russische Todtengräber mit gelben Flügeldecken, und vier schwarzen Punkten.*

Lepechins Reise durch Russl. 1. Th. S. 202. t. 16. f. 4.

Elytris flavis, punctis quatuor nigris; *thorace* atro, margine flavicante.

13. *Cassidoidea*, der *russische schildkäferartige Todtengräber.*

Lepechin Reise durch Russl. 1. Th. p. 312. t. 19. f. 3.

Superne atra, *inferne* ferruginea, marginibus *thoracis* atque elytrorum rubicundis.

14. *Tomentosa*, der *rauche Aaskäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 183. No. 8. *Bouclier velu.*

Villosa, supra nigro-fusca, subtus atra, capite *tomentoso; elytris* tribus elevatis.

15. *Rufipes*, der *Rothfuss.*

de *Geer* Ins. Tom. 4. p. 188. No. 15. *Bouclier à pattes rousses.*

Supra nigra, subtus fusca, *pedibus rufis*; *elytris* laevibus.

16. *Carolina*, der *karolinische Rothmond.*

Linn. Mantiss. p. 530.

Oblonga atra, clypeo orbiculato aequali; *elytris* basi apiceque *lunula ferruginea.*

17. *Dytiscoïdes*, der *wasserkäferartige Todtengräber von der Insel Helena.*

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 2.

Ferrugineum, elytris atris; Statura et magnitudo Derm. *Scarabaeoides* Linn. No. 17.

Mus. Dom. *Banks.*

18. *Haemorrhoidalis*, der *englische Todtengräber mit rothgespitzten Flügeldecken.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 308. No. 5. *L'Antribe à deux points rouges au bout des etuis.* *Anthribus* niger ovatus, *elytris* apice punctis duobus *rubris.*

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 5.

Atrum, elytris apice rufis; in stercore bovino *Angliae;* Statura *Silphae atomariae*, at paulo minus.

Dom. *Banks.*

19. *4-pustulata*, der *neuholländische Blutfleck.*

Fabric. S. E. p. 67. *Sphaeridium* 6.

Atrum, nitidum, *thoracis* margine *elytrorumque* macula sanguineis.

Mus. Dom. *Banks.*

20. *Fimetaria*, der *englische ganz schwarze, ungefleckte Aaskäfer.*

Fabric. S. E. p. 68. *Sphaeridium* 7.

Atrum, immaculatum; *elytris* laevissimis.

Mus. Dom. *Banks.*

21. *Mi-*

21. *Minuta*, das *englische ganz kleine Aaskäferchen.*

Fabric. S. E. p. 68. *Sphaeridium* 8.
Atrum, *elytris* striatis, pedibus concoloribus.
Musſ. Dom. *Banks.*

22. *Collaris*, das *neuholländische rothe Halsband.*

Fabric. S. E. p. 69. *Tritoma* 2.
Nigra, *thoracis* lateribus, *abdomineque* rufis.
Antennae *filiformes*, ideoque de *genere* haereo: forte potius *Anthrenus.*
Musſ. Dom. *Banks.*

23. *Crenata*, der *schwedische gerieffte Rothfleck.*

Fabric. S. E. p. 69. *Tritoma* 4.
Oblonga, nigra, *thorace* rugoſo, *elytris* striatis; maculis duabus *rubris.*

24. *Rufifrons*, die *englische Rothstirn.*

Fabric. S. E. p. 69. *Tritoma* 5.
Oblonga, glabra, atra, fronte, pedibus, maculisque duabus *elytrorum* ferrugineis.
Dom. *Banks.*

25. *Surinamensis*, die *Surinamische Zahnhüfte.*

Fabric. S. E. p. 72. *Silpha* 1.
Atra, elytris: faſcia poſtica flava, *femoribus* poſticis *dentatis.*
Musſ. Dr. *Hunter.*

26. *Laevicollis*, der *neuholländische Glatthals.*

Fabric. S. E. p. 73. *Silpha* 7.
Gibba nigra; *elytris* rugoſis lineis elevatis tribus; *thorace* laevi emarginato.
Musſ. Dom. *Banks.*

27. *Paedemontana*, der *muschelbraune piemontesische Aaskäfer.*

Geoffr. Ins. T. I. p. 123. No. 9. Le *Bouclier fauve.* *Peltis* tota *testacea.*

Fabric. S. E. p. 75. *Silpha* 15.
Testacea, antennis apice nigris.
Dr. *Allioni.*

28. *Gibba*, der *schwedische Buckelaaskäfer.*

Fabric. S. E. p. 76. *Opatrum* 2.
Nigrum; *elytris* lineis elevatis plurimis obsoletis; in *Sueciae* collibus arenosis.

29. *Arenaria*, der *kapensische Sandgräber.*

Fabric. S. E. p. 76. *Opatrum* 3.
Griseum, *elytris* striatis.
Mus. Dom. *Banks.*

30. *Orientalis*, der *Forskählische orientalische Dreyeckschenkel.*

Fabric. S. E. p. 76. *Opatrum* 4.
Cinereum, thorace elytrisque rugosis tibiis anticis dilatatis *triangularibus.* D. *Forskähl.*

31. *Cinereo-obscura*, das *kleine dunkelaschfarbige schwedische Aaskäferchen.*

Fabric. S. E. p. 77. *Opatrum* 5.
Cinereum; thorace rugoso; elytris lineis elevatis quatuor laevibus.

32. *Discoïdea*, der *schwarze englische Todtengräber mit röthlichem Mittelfleck auf den Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula* 5.

Thorace

Thorace marginato, nigra, elytrorum *disco* ferrugineo.

Dom. *Banks.*

33. *Aenea*, der *englische kupferfarbige Todtengräber.*

Fabric. S. E. p. 78. *Nitidula 7.*

Thorace marginato viridi, aenea, antennis pedibusque nigris.

34. *Cadaverina*, *Müllers Aaskäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 592. *Peltis cadaver.*

Nigra, *thorace* ferrugineo, elytris flavicantibus, puncto et maculis rivularibus nigris.

35. *Femorata*, die *Keilhüfte.**)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 594. *Peltis* femor.

Atra, *clypeo* orbiculato nitido, *femoribus posticis clavatis*, denticulatis.

36. *Vndata*, der *gewässerte Aaskäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 595. *Peltis* vnd.

Nigra, *thorace* punctato, elytris lineis tribus abbreviatis, spatio interjecto *undulato.*

37. *Dermestina*, der *dermestesartige Aaskäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 596. *Peltis* dermest.

Oblonga nigra, *elytris* testaceis, striis transversis flexuosis, nigris.

*) Vermuthlich No. 5. *Clavipes.*

38. *Villosa*, der *gelbwollichte Aaskäfer.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 597. *Peltis* villosa.

Nigricans, *tomento subflavo*, ore antennis pedibusque rufis.

39. *Scutellata*, der *schwärzliche Aaskäfer mit einem Schildchen.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 598. *Peltis* scutell.

Nigricans, elytris pedibusque testaceis.

40. *Truncatella*, das *glatte abgestumpfte Aaskäferchen.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 599. *Peltis* truncat.

Rufa, *glabra*, thorace emarginato, oculis nigris.

41. *Arborea*, der *punktirte Aaskäfer an den Bäumen.**)

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 64. No. 602. *Peltis* arbor.

Oblonga ferruginea, pilosa, *punctata*, elytris nigris basi flavicante.

42. *Lineata*, der *lineirte Aaskäfer.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. pag. 64. No. 603. *Peltis* lineata.

Subflava, *thorace* elytrisque lineis elevatis cinereis.

43. *Padina*, das *Schwarzauge.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 605. *Peltis* pad.

44. *Semi-*

*) Affinis Silphae *Succinctae* L. No. 26.

44. *Seminulum*, das *Körnlein.**)

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 606. *Peltis* semin.

Nitidissima, brunnea, *elytris* haemisphaericis.

Aufserdem hat *Geoffroi* noch *zween Silphas*, die ich bey keinem Schriftsteller angemerkt finde.

1. *Laevidorsa*, der *Glattrücken.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 121. *Peltis* 5. Le *Bouclier noir chiffonné à corcelet lisse.*

Nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, *thorace laevi.*

2. *Subvillosa*, das *Rauchkäferchen.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 123. *Peltis* 10. Le *Bouclier brun velouté.*

Niger, fusca *subvillosa.*

Ein *neues Geschlecht* von *Blumenkäfern*, welches *Scopoli* gleich nach den Silphen gesetzt, und *Laria* genennet hat.

Antennae extrorsum crassiores. *Thorax* pulvinatus. *Fulcrum femorale* nullum, aut obscurum.

1. *Hyoseris*, der *Hyoseriskäfer.*

Scopol. Entom. carn. No. 61.

Nigra, tibiis ferrugineis; in floribus *Lapsanae foetidae*, Fl. Carn. quae *Hyoser.* Linn.

*) Vielleicht eine Abänderung von Linn. *Seminulum* No. 8.

Alle diese lezteren von No. 34. bis 44. sind allein von dem Herrn Staatsrath *Müller* entdecket worden.

2. *Dulcamarae*, der *Bitterſüſskäfer.*

Scopol. Entom. carn. No. 62.

Thorax cum *elytris* punctatis, caſtanei fere coloris; in floribus *Solani dulcamarae.*

3. *Sileris*, das *Laſerpitienkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 64.

Fuſca; *elytris* abbreviatis, immaculatis, ſtriatis; in floribus *Laſerpitii Sileris.*

4. *Quadrimaculata*, das *kraynſche Bergkäferchen.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 85. No. 29.

Nigricans, ovata; *thorax* maculis quatuor rufis; in montanis *Carnioliae.*

197. GESCHLECHT. Caſſida, *Schildkäfer; holl.* Schild-Torretjes.

Müllers Linn. Naturſ. 5. Th. 1. B. S. 135. *Schildkäfer.*

Flieſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 6. *Schildkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 52. } *Schildkäfer.*
— — Geſch. S. 29. }

Börners Samml. 1. Th. S. 465. *Schildkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. S. 94. } *Schildkäfer.*
Eberhards Thiergeſch. S. 199. }

Pontopp. N. G. v. D. S. 201.

Onomat, hiſt. nat. P. 2. 663. *Schildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 88. *Caſſida.*

Catholicon C. p. 126. *Schildkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 5.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 310. la *Caſſide.*

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 165. des *Caſſides.*

Scop. Entom. carn. p. 37.

1. *Viridis*, der *grüne Distelschildkäfer.*

Müller l. c. S. 135. No. 1. t. 3. f. 12. a, b, B. der *Grünschild.*

Füesslins Verz. S. 6. No. 94. der *Grüne.*

Röfels 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 13. t. 6. der *auf grofsen Disteln sich aufhaltende Schildkäfer.*

Frisch Inf. 4. Th. S. 30. t. 15. 13. Th. S. 35. t. 29. der *grüne Schildmarienwurm; grüne Schildkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 668. der *grüne ablange glatte Schildkäfer.*

Acta Vpsal. 1736. p. 17. No. 1. *Cassida viridis*, corpore nigro.

Raj. Inf. p. 107. No. 5. *Scarabaeus* antennis clavatis, clavis in annulos divisis.

List. Goed. p. 286. t. 116. *Testudo* viridis.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 1.

Fabric. S. E. p. 88. No. 1.

Müllleri Faun. Fridr. p. 5. No. 43.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 608.

Nigra, supra viridis, *pedibus* luteis.

Schaeff. Icon. t. 27. f. 5.

Reaumur Inf. Tom. 3. t. 18. f. 15-19. *Scarabé des Chardons.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 312. No. 1. *Casside verte.*

de *Geer* Inf. T. 5. p. 174. No. 2. *Casside du Chardon.*

Cassida (*cardui*) viridis; *corpore* nigro, *pedibus* flavescentibus.

2. *Murraea*, der *Murrayische Schildkäfer.**)

Müller l. c. S. 137. No. 2. der *Alantkäfer.*

Martini Naturlex. (künftig) der *Rothschild.*

Fabric. S. E. p. 90. No. 10.

*) *Nirgends abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 314. No. 5. B. La *Cassidc panachée.*

Rubra, *maculis nigris* variegata.

3. *Nebulosa*, der *Wolkenschild.**)

Müller l. c. p. 137. No. 3.

— — Faun. Fridr. p. 5. No. 44.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 610.

Nigra, supra pallida, *elytris* striatis, *punctis* sparsis nigris.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 2. der *bleichgelbe schwarzgesprenkelte Schildkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 2. pag. 665. der *eyförmige, blasse, neblichte Schildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 89. No. 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 313. No. 2. La *Cassidc brune.*

Cassida, nebulosa, pallida, corpore nigro.

Schaeff. Icon. t. 27. f. 4.

4. *Nobilis*, der *Blaustrich.*

Müller l. c. p. 137. No. 4. t. 3. f. 12. c.

— — Faun. Fridr. p. 5. No. 45.

Müller

*) Bey diesem Schildkäfer sowohl, als bey dem ersten Viridis hat *Linné einerley Röselsche* Abbildung, nämlich 2. B. 3. Kl. der K. t. 6. angeführt; allein der Beschreibung und Ansehen nach ist der *Röselsche* Schildkäfer der Viridis, und nicht Nebulosa, welches auch der Herr von *Geer* bey seinen Citatis Tom. 5. p. 174. bestätiget. So gehöret auch das *Linneische* Citatum des *Frisch* 4. Th. p. 30. t. 15. nach dem von *Geer* zu der ersten Gattung, nämlich zu Viridis. Indessen scheint der Herr Prof. *Müller* Recht zu haben, der diesen nur für eine Verschiedenheit des ersten ausgiebt. Sichere Erfahrungen haben mich gelehrt, dass er *einerley* sey mit Viridis, weil dieser, wenn er todt ist, *ausblaßt*, und Nebulosa wird.

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 609.

Nigra, supra grisea, linea punctoque *elytrorum* oricalcico.

Pontopp. N. G. v. D. p. 201. No. 3. *)

Fabric. S. E. p. 90. No. 11.

Raj. Ins. p. 107. No. 7.

Schaeff. Icon. t. 96. f. 6.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 313. No. 3. La *Casside à bandes d'or.* *Cassida* pallida, linea duplici longitudinali viridi deaurata.

5. *Vibex*, der *schreberische Schildkäfer.* **)

Müller l. c. p. 138. No. 5. der *Striemenschild.*

Fabric. S. E. p. 89. No. 4.

6. *Maculata*, der *schreberische Fleckenschild.*

Müller l. c. p. 138. No. 6. der *Fleckenschild.*

Fabric. S. E. p. 88. No. 2.

Raj. Ins. p. 88. No. 13. *Scarabaeus minor*, sordide fulvus, punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 314. No. 5. t. 5. f. 6. Viridis, *maculis nigris* variegata.

List. Goed. p. 287. No. 117. †)

de *Geer* Insect. Tom. 5. p. 175. No. 3. *Casside panachée.* ††) *Cassida* supra viridis, subtus nigra, *elytris* aliquot nigro-maculatis, pedibus nigris.

Raj.

*) Sehr rar, und wird nur, wenn er lebendig ist, an einer *grünen Linie* erkannt, die im Tode vergehet.

**) *Nirgends abgebildet.*

†) Eben dieses Citatum hat *Linné* zu Nebulosa No. 3. gesetzt, welches nach dem Herrn von *Geer* zu diesem Maculata gehört.

††) Diese Benennung gehört eigentlich zu der 2ten Gattung des *Geoffroi*, als einer Varietät, oder zu No. 2. *Murraea.*

Raj. Inf. p. 88. No. 13. *Scarabaeus* minor fordide fulvus, punctis et *maculis* aliquot nigris temere ſparſis notatus.*)

7. *Spinifex*, der *Stachelträger*.**)

Müller l. c. p. 138. No. 7.
Fabric. S. E. p. 92. No. 20.

8. *Bicornis*, der *zweyhörnige Schildkäfer mit abgeſtutzten Flügeldornen*.†)

Müller l. c. p. 139. No. 8. der *Flügeldorn*.
Fabric. S. E. p. 91. No. 18.

9. *Cruciata*, der *Kreuzträger*.

Müller l. c. p. 139. No. 9.
Fabric. S. E. p. 90. No. 12. *Flaveſcens; coleopteris* diſco nigro; maculis quatuor flaveſcentibus.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 187. No. 12. t. 15. f. 15. *Caſſide en croix.* *Cassida* hyalina pallide flava; *elytris* diſco macula magna fuſca cruciata.

10. *Bifaſciata*, das *Doppelband*.

Müller l. c. p. 139. No. 10.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 189. No. 15. t. 15. f. 18. *Caſſide à quatre taches noires.*
Nigro-maculata, pellucida albo-flaveſcens; *elytris* ſubtus maculis quatuor nigris, abdomine nigro maculato.

11. *Flava*,

*) Dieſes vom Herrn von *Geer* hierbey angeführte Citatum ſtehet nach dem *Linné* bey No. 3. *Nebuloſa*. Bey dieſer Gelegenheit will ich den Fehler in *Müllers* Verzeichniſs der *illuminirten* Figuren 6. B. 2. Th. 197. Caſſida No. 3. berichtigen, da es ſtatt *Röſels* 88. No. 13. *Rajus* heiſsen muſs.

**) *Nirgends abgebildet.* †) *Nirgends abgebildet.*

11. *Flava*, der *Gelbling.*

Müller l. c. p. 139. No. 11.
Fabric. S. E. p. 92. No. 21.
de *Geer* Inf. T. 5. p. 184. t. 15. f. 13. *Casside jaune.*
Pallide flava immaculata, corpore subtus pedibusque rufis.

12. *Purpurea*, der *Purpurfleck.*

Müller l. c. p. 139. No. 12.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 190. No. 16. t. 15. f. 19. *Casside à disque rouge.*
Flavo-cytrea; *elytrorum disco* macula rotunda dorsali rubro-purpurea.

13. *Leucophaea*, der *Gelbpunkt.**)

Müller l. c. p. 140. No. 13.
Fabric. S. E. p. 92. No. 22.

14. *Marginata*, *(Cincta)* der *Gelbrand.***)

Müller l. c. p. 140. No. 14.
Fabric. S. E. p. 90. No. 13. *Tuberculata.*
Testacea, margine *thoracis elytrorumque* flavis; coleoptris basi *trituberculatis.*
de *Geer* Inf. T. 5. p. 186. No. 11. t. 15. f. 14. *Casside à bordure.*
Cincta ferruginea, *thorace* aeneo *elytrisque* punctatis, margine flavo.

15. *Reticularis*, der *gelbe himmelblau gescheckte Schildkäfer.*

Müller

*) *Nirgends abgebildet.* Bey diesem muss es heissen Amoen. Acad. Vol. 6. p. 393. No. 10.

**) Da No. 23. auch *Marginata* heisst; so würde ich diesen lieber *Cincta*, den *Gürtelschildkäfer* nennen.

Müller l. c. p. 140. No. 15. das *Scheckenschild.*
Fabric. S. E. p. 92. No. 23.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 188. No. 14. t. 15. f. 17. *Casside à rezeau.**)

Cassida pellucida albo flavescens; *elytrorum* disco nigro-reticulato.

Linn. S. N. ed. 10. p. 363. No. 9.
Flava nigro-punctata reticulata.

16. *Variegata*, das *Buntschild.*

Müller l. c. p. 140. No. 16.
Fabric. S. E. p. 92. No. 24.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 178. No. 2. t. 15. f. 6. *Casside variée.*

Fusco-rubra; *elytris* scabris nigro variegatis; lateribus bifasciatis; *thorace* angulato; antennis nigris.

17. *Grossa*, der *grosse schwarzpunktirte amerikanische Schildkäfer.*

Müller l. c. p. 141. No. 17. t. 3. f. 12. d. der *Schwarzpunkt.***)

Sulzers Gesch. der Ins. S. 29. t. 3. f. 1. der *Tieger.*
Naturforscher 6. St. p. 89. t. 4. No. 1.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 176. No. 1. t. 15. f. 5. *Casside grosse.*

18. *Cla-*

*) Vielleicht nur eine Varietät von dem *Geerischen* No. 13. *Quadrata.*

**) Dass sich hier der sel. Herr Prof. *Müller* in der Abbildung geirret, und den *Sulzerschen* Schildkäfer: Kennz. t. 2. f. 12. welches eigentlich Linn. *Silpha thoracica* No. 13. der *Schildträger* ist, mit diesem *Grossa* des Ritters offenbar verwechselt habe, wird Jedermann eingestehen, dem es gefallen sollte, die angeführten Abbildungen im *Naturforscher* und in dem *Geerischen* Werke mit dem *Sulzerschen*, und nachgestochenen *Müllerschen* Exemplare zu vergleichen.

18. *Clatrata*, der *Gitterschild.*

Müller l. c. p. 141. No. 18.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 179. No. 3. t. 15. f. 7. *Casside treillée.*

19. 7-*guttata*, der *Siebentropf.**)

Müller l. c. p. 141. No. 19.

Fabric. S. E. p. 92. No. 26.

20. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen.***)

Müller l. c. p. 141. No. 20.

Fabric. S. E. p. 92. No. 27.

21. *Iamaicensis*, das *Kupferschild.*†)

Müller l. c. p. 142. No. 21.

Fabric. S. E. p. 91. No. 17.

22. *Cyanea*, der *Blauschild.*

Müller l. c. p. 142. No. 22. t. 3. f. 13.

Fabric. S. E. p. 91. No. 19.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 181. No. 5. t. 15. f. 9. *Casside azurée.*

23. *Marginata*, der *Schwarzrand.*††)

Müller l. c. p. 142. No. 23.

Fabric. S. E. p. 91. No. 16.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 185. No. 10. *Casside marginée.*

Thorace

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) *Nirgends abgebildet.*

††) *Nirgends abgebildet*, aber No. 11. *Flava* vollkommen, ausser der Farbe, ähnlich.

Thorace violaceo-nigro; *elytris* testaceis; margine punctisque duobus nigris.

24. *Inaequalis*, der *Hökerschild.*

Müller l. c. p. 142. No. 24.
Fabric. S. E. p. 93. No. 28.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 182. No. 6. t. 15. f. 10. *Casside à deux taches jaunes.*

Bimaculata, supra fusco-aenea, subtus viridis nitens; *elytrorum* disco macula magna flava.

25. *Supposita*, der *Schildkäfer mit geringelten Flügeldecken.*

Müller l. c. p. 143. No. 25. die *Ringeldecke.*
Ledermüller mikrosk. Gem. und Augenerg. t. 28. fig. f, ff, g. der *Cochenillekäfer*. t. 44. fig. f. b. c. d.
Sloane, Voy. to the Islands etc. t. 237.

26. *Lateralis*, der *Seitenfleck.*

Müller l. c. p. 143. No. 26.
Sulzers Gesch. S. 29. t. 3. f. 2. *)
Fabric. S. E. p. 93. No. 29.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 184. No. 8. t. 15. f. 12. *Casside laterale.*

Fusco-aenea, *abdomine* nigro nitido, *elytrorum* margine exteriore, macula magna flava.

27. *Discoïdes*, der *Mittelfleck.*

Müller l. c. p. 143. No. 27.
Fabric. S. E. p. 93. No. 30.

de *Geer*

*) Im *Sulzer* ist ein Druckfehler, da es statt Linn. 36. Linn. 26. heissen muss.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 183. No. 7. t. 15. f. 11. *Casside à quatre taches jaunes.*

4-maculata, viridi-aenea nitida, *abdomine* nigro; elytrorum *disco* maculis binis magnis flavis.

28. *Petiveriana*, der *petiverische Riesenschildkäfer.*

Müller l. c. p. 143. No. 28. der *Vierfleck.*

Fabric. S. E. p. 272. No. 11. *Blatta* Petiveriana, die *petiverische Schabe.*

Petiv. Gazoph. t. 71. f. 1.

Seba Thes. Vol. IV. p. 95. t. 95. No. 21. Scarabaeus fuscus, maculis dilute flavis.

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. pag. 9. t. 1. f. 5. Blatta *Heteroclita.*

Sulzers Gesch. S. 113. t. XI. lit. a.

Schröters Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte. 1. Th. S. 323. t. 1. f. 7. 8.

29. *Bipunctata*, der *Zweypunkt.**)

Müller l. c. p. 143. No. 29.
Fabric. S. E. p. 93. No. 33.

30. *Bipustulata*, der *Blatterschild.*

Müller l. c. p. 144. No. 30.
Naturforscher 6. St. p. 91. t. 4. f. 4.
Fabric. S. E. p. 93. No. 31.

31. *Angustata*, die *Schmaldecke.***)

Müller l. c. p. 144. No. 31.

Unab-

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

Unabgebildete Linnéische Schildkäfer.

1. No. 2. *Murraea.*
2. No. 5. *Vibex.*
3. No. 7. *Spinifex.*
4. No. 8. *Bicornis.*
5. No. 13. *Leucophaea.*
6. No. 19. *7-guttata.*
7. No. 20. *Exclamationis.*
8. No. 21. *Iamaicensis.*
9. No. 29. *Bipunctata.*
10. No. 31. *Angustata.*

Neue Schildkäferarten.

1. CASSIDA *Noctiluca: Scopoli* Entom. carn. No. 118. v. LINN. *Lampyris Noctiluca* p. 643. No. 1.

2. *Perforata*, der *surinamische durchbohrte Schildkäfer.*

Pallas Spicil. Zool. fascic. 9. p. 3. t. 1. f. 1.

Majuscula, fere tota testacea, subtus nitida, supra absque nitore. Longitudo 5‴. — *Elytron* singulum ad basin auriculae humeralis extenuatum, et *foramine oblongo pervium.*

3. *Affinis*, der *deutsche grauliche schwarz gesprenkelte Schildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 88. No. 3.

Elytris griseis nigro punctatis; *thorace* flavescente, immaculato. Nimis *affinis* S. maculatae Linn. No. 6.

4. *Marginella*, das *brasilianische Gelbrändchen.*

Fabric. S. E. p. 89. No. 6.

Viridis, thoracis elytrorumque *marginibus* flavis.

Mus. Dom. *Banks.*

5. *Inter-*

5. *Interrupta*, die *neuholländische breite unterbrochene Schwarzlinie.*

Fabric. S. E. p. 89. No. 7.

Flavescens, *thorace* immaculato *elytris* ante marginem punctisque nigris, flavescentibus, *linea lata atra in medio interruptis.*

Mus. Dom. *Banks.*

6. *Deusta*, der *neuholländische Schildkäfer mit rothen Flügeldecken, und neun grosen schwarzblaulichen Seitenpunkten.*

Fabric. S. E. p. 89. No. 8.

Rufescens, *thorace* punctis duobus; *elytris* numerosis cyaneo-nigris, clypeo integro — *punctis circiter novem lateralibus* majoribus nigro-cyaneis.

Dom. *Banks.*

7. *Cribraria*, der *amerikanische Siebschildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 90. No. 9.

Rufescens; *thorace* punctis quatuor; *elytris* numerosis, nigris, clypeo emarginato.

Mus. Dom. *Banks.*

8. *Biguttata*, der *kayennische Zweytropf.*

Fabric. S. E. p. 91. No. 14.

Thorace flavo; *elytris* rufescentibus; maculis duabus lateralibus flavis.

9. *Miliaris*, der *gelbe zehnpunktirte Schildkäfer von der Insel Helena.*

Fabric. S. E. p. 91. No. 15.

Flava, thorace immaculato; *elytris* nigro-punctatis; margine bifasciato.

Mus. Dom. *Banks.*

10. *Decussata*, der *jamaische bekreuzte Schildkäfer.*

Fabric. S. E. p. 93. No. 32.

Nigro-coeruleſcens; *elytris* flavo-maculatis; maculis dorſalibus *reticulatis*, lateralibus diſtinctis.

Muſ. *Brit.*

11. *Tigrina*, der *grüne getigerte Schildkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 168. No. 1. t. 15. f. 15. 16. *Caſſide tigrée.*

Viridis, punctis nigris, corpore ſubtus nigro; thorace maculis binis albis.

Schaeff. Icon. t. 27. f. 4. a, b.

12. *Punctata*, der *amerikaniſche punktirte Schildkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 180. No. 4. t. 15. f. 8. *Caſſide ponctuée.*

Flavo-teſtaceo-rufa, maculis inaequalibus nitidis viridi-aeneis, corpore ſubtus nigro.

13. *Quadrata*, der *ſurinamiſche Schildkäfer mit dem Viereck.*

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 188. No. 13. t. 15. f. 16.

Pellucida albo-flaveſcens; *elytrorum* diſco griſeo-fuſco, margine nigro.

14. *24-punctata*, der *oeſterreichiſche Vierundzwanzigpunkt.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 92. No. 47.

Rubra, elytro ſingulo *punctis 12.* et macula nigra; ſubtus nigra.

15. *San-*

15. *Sanguinolenta*, der *rothgesäumte Schildkäfer.*

Franz von *Paula Schrank* Beyträge zur Naturgesch. S. 61. §. 2.

Nigra, thorace elytrisque margine *sanguineis.*

16. *Subferruginea*, der *strohfarbene Schildkäfer.*

Fr. v. P. *Schrank* Beytr. zur Naturgesch. S. 62. §. 3.

Nigra, thorace, elytris, pedibusque *subferrugineis* immaculatis.

17. *Sanguinolenta*, der *Blutfleck.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 611.

Nigra, supra viridis, scutelli regione *coccinea.*

18. *Rubiginosa*, der *Rostfuss.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 612. *Sciold-Bille.*

Nigra, supra viridis, *tibiis tarsisque* luteis.

19. *Ferrugineus*, der *Rostschild.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 314. No. 4. La *Casside verte à corcelet brun.*

Viridis, *thorace ferrugineo.*

198. GESCHLECHT. Coccinella, *Blattlauskäfer; Marienhühnchen.*

Holl. Lieven-heers Haantjes, *Engel-tiets.*

Engl. Lady-Cow.

Französ. Bête à Dieu; Vache à Dieu; Cheval de Dieu; Bête de la Vierge.

In *Deutschl.* Herr Gotts Mückel; Marienkäfer; Gotteskübigen; Gotteskälbchen; Marienhühnchen; Marienwürmchen, u. s. w.

Frisch Inf. 4. Th. S. 1. 2. *Gottes Küchlein-Schäflein.*
Müllers Linn. Naturf. 5. Th. 1. B. S. 145. *Sonnenkäfer.*
Füesslins schweiz. Inf. p. 6. *Halbkugelkäferchen.*
Börners Sammlungen etc. 1. Th. p. 466. *Gotteskübigen.*
Sulzers Kennz. der Inf. S. 54. *Runde Blattkäferchen.*
— — Gesch. S. 30. *Halbkugelkäferchen.*
Röfels Insektenbel. 2. B. Erdk. *dritte* Kl. S. 8.
Beckmanns Anfangsgr. der Naturhist. p. 93. *Sonnenkäfer.*
Eberhards Versuch einer Thiergesch. p. 202. *Blattlauskäfer.**)
Swammerd. Bibel der N. S. 170. *Unsres lieben Herrn; unserer lieben Frauen Hähngen.*
Bonnets Insektol. Uebers. S. 17. *Halbrunde Käfer; Gotteskälbichen; Marienwürmchen.*
Lessers Theol. der Inf. p. 70. 283. *Runde Schildkäfer;* Scarabaei *testudinarii; Marienkäfer; Gotteskälbergen; Cantharides rubeae; Unser Frowen Hänken.*
Pontoppid. N. G. v. D. p. 201. VI. *Dänisch* Jomfrue Mariähöne, Agerhöne; vor Herres Höne. (Marienhuhn, Rebhuhn, unsres Herrn Huhn).

Bom.

*) Der Name, den der Herr Prof. *Eberhard* diesen Insekten beygelegt hat: *Blattlauskäfer*, ist der schicklichste, und ihrer ganzen Natur und Oekonomie angemessenste, der ihnen hat gegeben werden können. Denn ihre Larven leben unter den Blattläusen, und verzehren sie, als ihre eigentliche Speise. Man muss sie mit der eigentlich sogenannten *Cochenille* (Coccus) nicht verwechseln.

Sulzer untersucht ihre Benennungen, und sagt: man könne sie auch

Körnerkäferchen von *Kokkos;*
Schönkäferchen von *coccineus* oder *purpureus* nennen.

Bom. Dict. P. III. p. 221.

Catholicon. C. p. 377. 378. *Coccinella, Cocchenille; Sonnenkäfer; Färbewurm; Marienkäfer.*

Reaumur Inf. Tom. 3. P. 2. p. 151. *Scarabés hemiſphériques; Vaches à Dieu; Bêtes à Dieu; Cheveaux de Dieu; Bêtes de la Vierge.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 27. *Coccinella.*

Commentar. Lipſ. Dec. I. Vol. V. p. 606.

Liſt. Goed. p. 721. *Beſtiolae Domini; Mariae Animalcula; Onze Lieven Heerens beeſties; Onze Lieve Vrouwens beeſties.*

Fabric. S. E. p. 79.

de *Geer* Inſ. Tom. 4. Prael. XII. No. 68. Tom. 5. p. 359. *Scarabés hemiſphériques.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 318. La *Coccinelle.*

Hill hiſt. Anim. *Hemiſphaeria.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 65.

I. *Rothe, oder gelbe Flügeldecken, mit ſchwarzen Punkten.*

1. *Marginata*, der *Breitſaum.**)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. p. 147. No. 1.

Fabric. S. E. p. 79. No. 1. Coleoptris *rubris;* margine nigro; thorace vtrinque puncto marginali albo.

2. *Surinamenſis*, das *Schwarzſchild.***)

Müller l. c. p. 147. No. 2.

Fabric. S. E. p. 79. No. 2.

3. *Sanguinea*, der *Blutflügel*,†)

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) *Nirgends abgebildet.*

Müller l. c. p. 147. No. 3.
Fabric. S. E. p. 79. No. 3.

4. *Impunctata*, der *Ungefleckte.**)

Müller l. c. p. 147. No. 4.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 95. das *ungefleckte Halbkugelkäferchen.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 615. Nigra, supra pedibusque rubris; *elytris* puncto nullo.
Fabric. S. E. p. 79. No. 4.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 369. No. 1. *Coccinelle rouge sans taches.*

5. *Annulata*, *Schrebers Ringelfleck.***)

Müller l. c. p. 148. No. 5.

6. *Vnipunctata*, der *Einfleck.* †)

Müller l. c. p. 148. No. 6.
Schriften der *Dronth. und Norweg. Gesellsch.* 3. Th. p. 348. No. 5.
Fabric. S. E. p. 20. *Scarab.* 78. *vnipunctatus.* Scarab. muticus, scutellatus, *ater* coleopteris flavescentibus, *puncto communi nigro.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 616.

7. *2-punctata*, der *Zweypunkt.*

Müller l. c. p. 148. No. 7.
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 96. ††)
Sulz. Gesch. t. 3. f. 3. S. 32.

Schriften

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) *Nirgends abgebildet.*

††) Im *Füeßlin* muss es bey dem Citato des *Frisch* nicht t. 9. sondern t. 16. heissen.

Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 3. Th. p. 349. No. 6. t. 6. f. 2.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. p. 759. der *rothe Marienkäfer mit zwey schwarzen Punkten.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 31. die *kleine rothe englische Coccinelle mit zwey schwarzen Punkten.*

Fabric. S. E. p. 79. No. 6.

Frisch. Ins. P. 9. p. 33. t. 16. f. 4. der *runde Platt-* oder *Marienkäfer der zweyten Gröfse mit zwey Flügelpunkten.*

List. loqu. s. Scar. Angl. 383. 8.

Scarabaeus alter, niger, exiguus, pennarum crustis miniatulis, in quibus duae tantum maculae nigrae.

Petiv. Gazoph. p. 34. t. 21. f. 4. *Coccinella* anglica bimaculata, seu *minor rubra.*

Reaum. Ins. Tom. 3. P. 2. p. 153. t. 31. f. 16. le *petit Scarabé hemisphérique.*

Raj. Ins. 86. 2. *Scarabaeus haemisphaericus* minor etc.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 46.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 65. N. 617. Nigra, *thoracis* lateribus albis; *elytris* flavis, punctis nigris duobus.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 9.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 369. No. 2. *Coccinelle rouge à deux points noirs.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 320. No. 1. *Coccinelle rouge à deux points noirs.*

8. *3-punctata*, der *Dreypunkt.**)

Müller l. c. p. 149. No. 8.

Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 97.

*) *Nirgends abgebildet.*

9. *4-punctata*, der *Vierpunkt.**)

Müller l. c. p. 149. No. 9.

Fabric. S. E. p. 80. No. 10.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 618. Nigra; *thoracis* lateribus albis; *elytris* rubris; *punctis nigris* quatuor.

10. *Hebraea*, der *Hebräer.***)

Müller l. c. p. 150. No. 10.

11. *5-punctata*, der *Fünfpunkt.*

Müller l. c. p. 150. No. 11.

Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 6. No. 98.

Fabric. S. E. p. 80. No. 11.

Mülleri Faun. Fridr. p. 6. No. 47.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 620. Nigra; *thoracis* angulis anticis albis; *elytris* rubris, *punctis nigris quinque.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 32. die *rothe Coccinelle mit fünf ſchwarzen Punkten.*

Schaeff. Icon. t. 9. f. 8.

Merian. Inſ. t. 61.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 320. No. 2.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 370. No. 7. *Coccinelle rouge à 5 points noirs.* Coleopteris rubris; punctis *tribus* magnis *duobusque* minimis.

12. *6-punctata*, der *Sechspunkt.*

Müller l. c. p. 150. No. 12.

Liſt. Goed. p. 268. f. 112.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 622. Nigra, *thorace* luteo; punctis quinque; *elytris* fulvis; *punctis ſex* nigris, in triangulum diſpoſitis.

13. *Tri-*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

13. *Trifasciata*, der *Dreyband.**)

Müller l. c. p. 151. No. 13.
Fabric. S. E. p. 80. No. 9. In *Europae hortis.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 30. die *rothe Coccinelle mit fünf queerlaufenden schwarzen Linien.*
Raj. Ins. 87. No. 9. *Scarabaeus haemisphaericus* minor, elytris ex albo liventibus, lineolis nigris in medio dorso pictis.

14. *Hieroglyphica*, die *gelbliche Coccinelle mit hieroglyphischen Figuren auf den Flügeldecken.*

Müller l. c. p. 151. No. 14. der *Egyptier.*
Sulzers Gesch. S. 31. t. 3. f. 4. der *Hieroglyph.***)
Fabric. S. E. p. 80. No. 7.
Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 48.
— — Zool. Dan. p. 65. No. 621.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 382. No. 15. *Coccinelle hieroglyphique.*
Coleopteris flavo-rubris; *fasciis* irregularibus sinuatis nigris.

16. *Septempunctata*, der *Siebenpunkt.*

Müller l. c. p. 151. No. 15. t. 4. f. 1. der *Wurm oder die Larve.*
Füesslins schweiz. Ins. p. 6. No. 99.
Frisch Ins. 4. Th. S. 1. t. 1. f. 4. der *runde Blattkäfer der grösern Art.*
Rösels Insektenbel. 2. B. Erdkäf. 3. Kl. S. 7. t. 2. f. 3. der *runde, hochrothe Marienkäfer mit schwarzen Punkten.*
Act. Nidr. III. p. 388.

Fabric.

*) *Nirgends abgebildet.*
**) Im *Sulzer* fehlt am Rande Fig. 4.

Fabric. S. E. p. 81. No. 13.

List. loqu. f. Scarab. angl. 382. 7. *Scarabaeus alter niger.*

Raj. Inf. 86. 1. *Scarabaeus* subrotundus, f. haemisphaericus rubens, *major* vulgatissimus.

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 49.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 623. Nigra; *thorace* angulis anticis albis; *elytris* rubris; punctis nigris septem.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 33. No. 2. die *grosse rothe Coccinelle.*

Poda. Mus. graec. p. 24. c. metamorphosi.

Faun. Suec. ed. 2. No. 477.

Suecis *Akerhöns*, *Nyckelpiga*, *Jungfru Mariae Höna.*

Schaeff. Icon. t. 9. f. 7.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 321. No. 3. t. 6. f. 1.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 370. No. 4. t. 10. f. 14. *Coccinelle rouge à 7 points noirs.*

Petiv. Gazoph. p. 33. t. 21. f. 3. *Coccinella* anglica vulgatissima, f. rubra, *septem* nigris maculis punctata.

16. *9-punctata*, der *Neunpunkt.**)

Müller l. c. p. 152. No. 16.

Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 100.

Fabric. S. E. p. 81. No. 16.**)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 322. No. 4. La *Coccinelle rouge à neuf points noirs et corcelet noir.*

Coccinella coleopteris rubris; punctis *novem* nigris; *thorace* nigro, lateribus albis.

de *Geer*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) In *Fabric.* S. E. ist sie vermuthlich durch einen Druckfehler 10-punctata genennet.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 373. No. 6. *Coccinelle rouge à neuf taches noires.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 625.

17. *10-punctata*, der *Zehnpunkt.**)

Müller l. c. p. 152. No. 17.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 101.
Fabric. S. E. p. 82. No. 17.
Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 51.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 626. Nigra; *thorace* albo punctis ſeptem; *elytris* rubris punctis nigris decem.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 374. No. 7. *Coccinelle rouge à 10 points noirs.*

Coccinella *coleoptris* flavo-rubris; punctis nigris *decem* in cruce directis.

18. *11-punctata*, der *Eilfpunkt.*

Müller l. c. p. 153. No. 18.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 6. No. 102.
Fabric. S. E. p. 82. No. 19.
Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 52.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 627.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 34. die *rothe Coccinelle mit eilf ſchwarzen Punkten.*
Acta Vpſal. 1736. p. 18. No. 2.
de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 375. No. 8. *Coccinelle à 11 points noirs.*
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 325. No. 9. La *Coccinelle argus.*
Coleoptris rubris; punctis *undecim* nigris; *thorace* rubro immaculato.
Act. Nidr. III. t. 6. f. 2.

19. *12-pun-*

*) Nirgends abgebildet.

19. *12-punctata*, der *Zwölfpunkt.**)

Müller l. c. p. 153. No. 19.
Fabric. S. E. p. 82. No. 20.
Müller Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 628.**)

20. *13-punctata*, der *Dreyzehnpunkt.*

Müller l. c. p. 582. No. 20.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 103.
Schriften der Dronth. und Norweg. Geſellſchaft. 4. B. p. 269.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 33. die *rothe Coccinell mit dreyzehn ſchwarzen Punkten.*
Acta Vpſal. 1736. p. 18. No. 2.
Fabric. S. E. p. 83. No. 25.
Schaeff. Icon. t. 48. f. 6.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 323. No. 6. La *Coccinelle rouge à 13 points noirs et corcelet jaune varié.*
de *Geer* Inſ. Tom. I. p. 375. No. 9. *Coccinelle* à *13 points noirs.*
Coccinella *coleoptris* rubris, punctis nigris *tredecim.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 629.
Nigra, *thorace* luteo; macula media, punctoque vtrinque nigro; *elytris* rubris; punctis nigris *tredecim.*
— — Faun. Fridr. p. 6. No. 53.

21. *14-punctata*, der *Vierzehnpunkt.*

Müller l. c. p. 154. No. 21.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 104.
Friſch Inſ. 9. Th. p. 34. t. 17. No. 4. 5. der *gelb- und ſchwarzfleckige Marienkäfer.*†)

Gleditſch

*) *Nirgends abgebildet.* **) Vix *12-punct.* L.
†) Eben dieſes Citatum hat *Linné* auch bey No. 31.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. p. 759. No. 94. der *rothe weifsspunktirte Marienkäfer.*

Müller Faun. Fridr. p. 6. No. 54.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 630. Coccinella *tessulata.*

Lutea; *thorace* macula tetraloba, *elytris* quatuordecim tetragonis nigris, saepe contiguis.

Fabric. S. E. p. 83. No. 26.

Scop. Entom. carn. No. 243. Coccinella *tessulata*, die *Würfel-Coccinelle.*

Schaeff. Icon. t. 62. f. 6.

Poda Mus. graec. p. 25.

22. *16-punctata*, der *Sechzehnpunkt.**)

Müller l. c. p. 154. No. 22.

Füefslins schweiz. Ins. p. 7. No. 105.

23. *Ocellata*, der *Funfzehnpunkt.***)

Müller l. c. p. 154. No. 23. t. 4. f. 2. der *Argus.*

Martini allgem. Gesch. der Nat. 3. B. 1. Abth. S. 215. *Argusfonnenkäfer; Argus* unter den *Halbkugelkäfern.*

Fabric. S. E. p. 83. No. 27.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 32. die *rothe grofse Coccinelle mit funfzehn schwarzen Punkten.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 638. Nigra; *thorace* albo maculato; *elytris* flavis aut rubris; punctis nigris annulatis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 376. No. 10. t. 11. f. 1. *Coccinelle rouge à 15 points noirs.*

Coleo-

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Gröfser* als die übrigen. Das *Sulzersche* Citatum im *Linné* mufs heifsen: t. 3. f. 14. und gehöret zu *No. 38.* wobey es *Füefslin* angeführet hat. v. unter den Neuen No. 18.

Coleoptris rubris; punctis *quindecim* nigris flavo-marginatis.

24. *18-punctata*, der *Achtzehnpunkt.**)

Müller l. c. p. 155. No. 24.
Neuer Schauplatz der Natur 1. Th. S. 80.
Fabric. S. E. p. 83. No. 28.

25. *19-punctata*, der *Neunzehnpunkt.***)

Müller l. c. p. 155. No. 25.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 106.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 632.
Lutea; *thorace* punctis ſex; *elytris* novemdecim, nigris.
Fabric. S. E. p. 83. N. 29.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 325. No. 10.
Coleoptris rubris, punctis 19 nigris.
La *Coccinelle rouge à dix-neuf points noirs.*

26. *22-punctata*, der *Zweyundzwanzigpunkt.*

Müller l. c. p. 155. No. 26.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 107.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 633.
Lutea; *thorace* punctis quinque; *elytris* viginti duobus *nigris.*
Fabric. S. E. p. 84. No. 31.
Raj. Inſ. p. 87. No. 6. *Scarabaeus* hemiſphaericus flavus, maculis nigris rotundis crebris notatus.
Schaeff. Icon. Inſ. Tab. 30. f. 10.
Geoffr. Inſ. Tom. 1. p. 329. No. 17. La *Coccinelle jaune ſans ſouture.*
Coleoptris flavis, punctis *viginti* nigris.†)

de *Geer*

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nirgends abgebildet.*

†) Dieſes von dem Herrn von *Geer* bey dieſer 22-punctata geſetzte

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 379. No. 12. *Coccinelle jaune à 22 points noirs.*

Coleoptris flavo-citreis: punctis *viginti-duobus* thoraceque quinque nigris.

27. *23-punctata*, der *Schreberſche Dreyundzwanzigpunkt.**)

Müller l. c. p. 156. No. 27.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 108.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 634.
Nigra, *thorace* maculato; *elytrisque* rubris; punctis viginti tribus nigris.
Fabric. S. E. p. 84. No. 32.

28. *24-punctata*, der *Vierundzwanziger.***)

Müller l. c. p. 156. No. 28.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 109.
Müllerі Faun. Fridr. p. 6. No. 55.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 635. Nigra; *thorace* maculato; *elytrisque* rubris, punctis 24 nigris.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 34. No. 2. die *rothe Coccinelle mit 24 ſchwarzen Punkten.*
Fabric. S. E. p. 84. No. 33.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 326. No. 11.
La Coccinelle rayée.
de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 381. No. 14. *Coccinelle rouſſatre à 24 points noirs.*
Coleoptris rufo-fuſcis, *maculis quatuordecim* quibusdam connexis, *punctisque decem* nigris.

29. *25-pun-*

ſetzte Geofroiſche Citatum hat *Fabric.* zu ſeiner neuen Art No. 30. 20-punctata geſetzt, wohin es auch zu gehören ſcheint. S. neue Coccinellenarten No. 14.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

29. *25-punctata*, der *Fünfundzwanziger.**)

Müller l. c. p. 156. No. 29.

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 381. No. 13. *Coccinelle rouge-brune à 22 points noirs.*

Coccinella *(22-punctata obscura)* coleoptris obscure rubris, punctis viginti duobus nigris connexis.

30. *Conglobata*, die *Grießdecke.***)

Müller l. c. p. 157. No. 30.

Füeßlins schweiz. Ins. p. 7. No. 110.

Frisch Ins. 9. Th. pag. 34. t. 17. f. 6. der *stachliche Wurm, und dessen gelb- und schwarzfleckige Marienkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. pag. 31. No. 2. die *rothe schwarz besprengte Coccinelle.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 326. No. 12. La *Coccinelle à bordure*, die *bordirte.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 378. No. 11. *Coccinelle couleur de Rose*, die *rosenrothe Coccinelle.*

Rosea, coleoptris rubris roseis, punctis *sedecim* nigris quibusdam connexis; *thorace* flavo punctis nigris.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 636.

31. *Conglomerata*, die *Hirsendecke.*†)

Müller l. c. p. 157. No. 31.

Füeßlins schweiz. Ins. p. 7. No. 111.

Fabric.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) In der 12ten Ausgabe des N. S. hat *Linné* bey dieser und der folgenden einerley Citatum des *Raji* Ins. 87. No. 5. Ich finde aber in der 2ten Ed. der Faun. Suec. und dem von *Geer*, dass es eigentlich zu der folgenden No. 31. gehöre.

†) Bey dieser und No. 21. hat *Linné* einerley Citatum des *Frisch* 9. t. 17. f. 4. 5. v. No. 21.

Fabric. S. E. p. 84. No. 35.
*Müller*i Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 637.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 28. die *gelbliche Coccinelle mit vielen schwarzen Punkten.*
Schaeff. Icon. t. 171. f. 1. a. b.
Raj. Ins. p. 87. No. 5. *Scarabaeus* hemisphaericus flavus, maculis nigris variae figurae depictus.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 328. No. 15. La *Coccinelle à l'échiquier*, das *Schachbrett.*
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 383. No. 17. *Tessellata*, coleoptris pallide flavis, maculis plurimis quadratis nigris connexis.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 402.
Cocc. coleoptris flavescentibus, punctis plurimis nigris, *omnibus connexis* sutura longitudinali nigra.

II. *Rothe oder gelbe Flügeldecken mit weissen Flecken.*

32. *Guttato-punctata*, der *Tropfpunkt.**)
Müller l. c. p. 157. No. 32.

33. *10-guttata*, der *Zehntropf.***)
Müller l. c. p. 157. No. 33.
Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 112.
Fabric. S. E. p. 85. No. 37.

34. *14-guttata*, der *Vierzehntropf.*
Müller l. c. p. 158. No. 34.
Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 113.
Fabric. S. E. p. 85. No. 38.

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nirgends abgebildet.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 32. No. 1. die *rothe Coccinelle mit vierzehn weissen Flecken.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 492. *Quatuordecim-punctata*, coleoptris rubris, punctis albis quatuordecim.

— — F. S. ed. 1. No. 397.

Act. Upsal. 1736. pag. 18. No. 5. Coccinella *punctis* 14.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 11.

Raj. Ins. p. 86. No. 3. *Scarabaeus* hemisphaericus; elytris fulvis, maculis albis pictus.

List. loqu. f. Scar. angl. p. 383. No. 10. *Scarabaeus* subrufus, cui in humeris pinnae maculatae, inque singulis alarum thecis septem maculae albae sunt.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 327. No. 13. La *Coccinelle à quatorze points blancs.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 385. No. 20. *Coccinelle rouge à 14 points blancs.*

Müllerî Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 639.

Rufa; *thorace* duobus; *elytris* punctis quatuordecim albis.

— — Faun. Fridr. p. 7. No. 57.

35. *16-guttata*, der *Sechzehntropf.*

Müller l. c. p. 158. No. 35.

Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 114.

Sulzers Gesch. t. 3. f. 5. b. S. 32.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 33. No. 1. die *rothe Coccinelle mit sechzehn weisen Punkten.*

Fabric. S. E. p. 85. No. 39.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 399. Cocc. coleoptris *rubris*; punctis *sedecim* albis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 385. No. 21. *Coccinelle jaune à 16 points blancs.*

Müllerî

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 640.
Lutea; *thorace* punctis sex sulphureis; *elytris* punctis tredecim albis.

36. *18-guttata*, der *Achtzehntropf.**)
Müller l. c. p. 159. No. 36.
Neuer Schauplatz der Natur 1. B. p. 80.
Schaeff. Icon. t. 9. f. 12.
Fabric. S. E. p. 85. No. 40. *18-guttata.***)

37. *20-guttata*, der *Zwanzigtropf.*†)
Müller l. c. p. 159. No. 37.
Fabric. S. E. p. 85. No. 41.
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 34. No. 1. die *rothe Coccinelle mit zwanzig weissen Punkten.*
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 386. No. 22.††) *Coccinelle à 20 points blancs.*
Coccinella flavo-rubra, seu nigra, coleoptris maculis magnis albis *viginti.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 495. et No. 505. *Tigrina.*

38. *Oblongo-guttata*, der *Langtropf.*
Müller l. c. p. 159. No. 38.
Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 115.

*) Dass im *Linné* ein Druckfehler sey, und statt *octodecim* sedecim stehe, wird kaum dürfen erinnert werden.

**) Hierbey hat zwar *Fabric.* den *Linné* nicht citirt; der Beschreibung nach scheinet es aber doch dieselbe zu seyn.
Coleoptris *rubris*, punctis albis *octodecim*; habitat in Europa; parva, *punctis novem* in singulo elytro.

†) *Nirgends abgebildet.*

††) Diese und No. 49. *Tigrina* hält der Herr von *Geer* für einerley Art, obgleich die leztere *schwarze* Flügeldecken hat.

Sulzers Kennz. t. 3. f. 14.

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 30. No. 3. die *rothe Coccinelle mit weissen länglichten Punkten.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 389.

Coleoptris *rubris*, lineis punctisque albis *longitudinalibus.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 496.

— — *It. Oeland.* 148. Coccionella coleoptris *rubris:* lineis quatuor albis longitudinalibus.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 384. No. 19. *Coccinelle rougeatre, à rayes blanches.*

Coleoptris flavo-rufis: *lineis* maculisque oblongis sordide albidis.

Fabric. S. E. p. 85. No. 42.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 10. t. 3. f. 14.

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 641. Rufa, *thorace* ex albo virente medio livido; *elytris* fulvis, lineis lutescentibus.

39. *Obliterata*, der *Wischtropf.**)

Müller l. c. p. 159. No. 39.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 382. No. 16. *Coccinelle jaune à 6 points pâles.*

Coleoptris flavis: punctis *sex* nigris pallidis, *thorace* flavo-albicante, punctis nigris.

Rajus Ins. p. 87. No. 7. *Scarabaeus* parvus hemisphaericus e luteo albicans, punctulis nigricantibus tribus in linea ad elytrum transversa, et vnico singulari ad ejus exortum.

III. Die

*) *Nirgends abgebildet.*

III. Die *Flügeldecken schwarz mit rothen Flecken.*

40. *Impustulata*, der *Ungefleckte.**)

Müller l. c. p. 160. No. 40.
Fabric. S. E. p. 85. No. 43.

41. *Cacti*, der *Melokakt*, die *wahre Cochenille.*

Müller l. c. p. 160. No. 41.
Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 900. die *amerikanische Coccinelle auf den indianischen Feigen.* v. P. 3. p. 29. eine blosse Verschiedenheit der *europäischen Cochenille.*
Catholicon C. p. 378. die *wahre* Coccinelle (vulg. Kutzenelle), oder der *Opuntien-Sonnenkäfer* (Cactus Opuntia) mit pechschwarzen Flügeldecken, worauf zween rothe Flecken sitzen: es scheint aber auch *Coccus cacti* eine wahre Cochenille zu geben.
Unzers kleine physikal. Schriften p. 347.
Fabric. S. E. p. 85. No. 44.
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 99.
Niger; *elytro* singula macula magna, rotunda, rubra.

42. *2-pustulata*, der *Zweyfleck.*

Müller l. c. p. 160. No. 42.
Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 116.
Frisch Ins. 9. Th. p. 33. t. 16. f. 6. der *runde Blatt- oder Marienkäfer der zwoten Grösse mit zwey Flügelpunkten.*
Röfels Insektenbel. 2. B. Erdkäfer 3te Kl. p. 10. t. 3. f. 4. der *kleine schwarze Schildkäfer mit zwey rothen Flecken.*

*) *Nirgends abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 86. No. 45.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 334. No. 26.*) La *Coccinelle tortûe à bande rouge.*
Coccinella rotunda nigra, *coleoptrorum* margine reflexo, *fascia transversa rubra.*
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 387. No. 23. t. 10. f. 25. *Coccinelle à deux points rouges.*
Coleoptris nigris: *maculis duabus* ovatis rubris, *abdomine sanguineo.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 642.

43. *4-pustulata*, der *Vierfleck.*
Müller l. c. p. 161. No. 43.
Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 117.
Fabric. S. E. p. 86. No. 46.
Schaeff. Icon. t. 30. f. 16. 17.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 333. No. 25. La *Coccinelle tortûe à quatre points rouges.*
Coccinella rotunda nigra, *coleoptrorum* margine reflexo, punctis quatuor rubris.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 389. No. 24. *Coccinelle à quatre points rouges.*
Coleoptris nigris: maculis *quatuor* rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 643.

44. *6-pustulata*, der *Sechsfleck.*
Müller l. c. p. 161. No. 44.
Füesslins schweiz. Inf. p. 7. No. 118.
Müller Faun. Fridr. p. 7. No. 58.

Fabric.

*) Diese hält Herr Staatsrath *Müller* für eine *neue* Art. S. Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 648. *fasciata.* Unter den neuen hinten No. 32. b.

Fabric. S. E. p. 86. No. 47.
Schaeff. Icon. t. 30. f. 12.
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 30. No. 1. die *schwarze Coccinelle mit sechs rothen Punkten.*

Raj. Ins. p. 87. No. 4. *Scarabaeus* hemisphaericus minor; *elytris* nigris rubris maculis pictis.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 331. No. 20. La *Coccinelle noire à points rouges.*
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 390. No. 25. *Coccinelle à 6 points rouges.*

Coleoptris nigris; maculis *duabus* magnis, *quatuor* minoribus *rubris.*

45. *10-pustulata*, der *Zehnfleck.**)

Müller l. c. p. 161. No. 45.
Füesslins schweiz. Ins. p. 7. No. 120.
Fabric. S. E. p. 87. No. 49.
Schaeff. Icon. t. 30. f. 10. t. 171. f. 2. a. b.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 644.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 330. No. 19. La *Coccinelle noire à dix points jaunes.*

Coleoptris nigris, punctis *decem* flavescentibus aut rubris.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 391. No. 26. *Coccinelle à 10 points rouges.*

Coleoptris nigris; maculis *decem* fulvis, anterioribus saepe connexis.

46. *14-pustulata*, der *Vierzehnfleck.*

Müller l. c. p. 161. No. 46.
Poda Mus. graec. p. 26. *14-maculata.*

*) Hier finde ich wieder eben das Citatum *Frisch* 9. t. 17. f. 4. 5. als bey No. 31. und 21.

Fabric. S. E. p. 87. No. 50.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 330. No. 18. La *Coccinelle noire à quatorze points jaunes.*

Coleoptris nigris; punctis *quatuordecim* flavescentibus.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 646.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 391. No. 27. *Coccinelle noire à 14 points jaunes.*

Coleoptris nigris: maculis *quatuordecim* aequalibus flavis.

Schaeff. Icon. t, 30. f. 10.

47. *16-pustulata*, der *Sechzehnfleck.**)

Müller l. c. p. 162. No. 47.

IV. *Schwarze Flügeldecken mit weifsen und gelben Flecken.*

48. *Pantherina*, der *Panther.***)

Müller l. c. p. 162. No. 48.

Müllerі Faun. Fridr. p. 7. No. 59.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 650. *Ager-Höne, Mari-Höne.*

Fabric. S. E. p. 87. No. 53.

de *Geer* Inf. T. 5. p. 392. No. 28. *Coccinelle panthere.*

Coleoptris nigro-fuscis: maculis *decem* albo-flavescentibus.

49. *Tigrina*, der *Tiger.*

Müller l. c. p. 162. No. 49.

Fabric. S. E. p. 88. No. 55.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 386. No. 22. †)

Schaeff. Icon. t. 30. f. 9.

Nach

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) v. No. 37. *20-guttata.*

Nach *Pontoppidans* Naturgesch. von Dännemark S. 201. 202. sind folgende *Linnéische Coccinellen* auch in *Dännemark* zu finden.

1. 2-punctata.
2. 5-punctata.
3. 7-punctata.
4. 9-punctata.
5. 10-punctata.
6. 11-punctata.
7. 13-punctata.
8. 14-punctata.
9. 22-punctata.
10. Conglobata.
11. Conglomerata.
12. 14-guttata.
13. 2-pustulata.
14. 4-pustulata.
15. 10-pustulata.
16. 14-pustulata.
17. Tigrina.

Unabgebildete Linneische Coccinellen.

1.	No.	1.	*Marginata.*
2.	No.	2.	*Surinamensis.*
3.	No.	3.	*Sanguinea.*
4.	No.	4.	*Impunctata.*
5.	No.	5.	*Annulata.*
6.	No.	6.	*Vnipunctata.*
7.	No.	8.	*3-punctata.*
8.	No.	9.	*4-punctata.*
9.	No.	10.	*Hebraea.*
10.	No.	13.	*Trifasciata.*
11.	No.	16.	*9-punctata.*
12.	No.	17.	*10-punctata.*
13.	No.	19.	*12-punctata.*
14.	No.	22.	*16-punctata.*
15.	No.	24.	*18-punctata.*
16.	No.	25.	*19-punctata.*
17.	No.	27.	*23-punctata.*
18.	No.	28.	*24-punctata.*
19.	No.	29.	*25-punctata.*

20. No. 32. *Guttato-punctata.*
21. No. 33. *10-guttata.*
22. No. 37. *20-guttata.*
23. No. 39. *Obliterata.*
24. No. 40. *Impustulata.*
25. No. 47. *16-pustulata.*
26. No. 48. *Pantherina.*

Neue Coccinellenarten.

I. *Rothe oder gelbe Flügeldecken mit schwarzen Punkten.*

1. *8-punctata*, der *Achtpunkt.*

Fabric. Syst. Ent. p. 81. No. 14.

Coleoptris rubris: punctis *nigris octo;* habitat in *Germania:* magnitudo 2-punctatae.

Müllleri Faun. Fridr. p. 6. No. 50. in *Nemore.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 624.

Nigra, *thorace* testaceo, elytris rubris, punctis *nigris* octo.

2. *Tredecim-maculata*, der *Dreyzehnfleck.*

Forsteri nov. spec. Insect. Cent. I. p. 18. No. 18.

Coleoptris luteis, punctis *nigris tredecim;* thorace albo nigro-punctato. In *Pinis*, *Corylis*, *Plantisque* variis *Angliae.*

3. *18-punctata*, der *Achtzehnpunkt.* *)

Stop. Entom. carn. No. 241.

Puncta *nigra* (8) in quolibet elytro, pleraque cohaerentia.

4. *20-pun-*

*) Vielleicht eine Abänderung von No. 24. *Linn.*

4. *20-punctata*, der *Zwanzigpunkt.*

Scop. Entom. carn. No. 242.
Elytrum flavum, punctis oblongis *nigris.*

5. *Lineola*, die *neuholländische Schwarzlinie.*

Fabric. Syst. entom. p. 79. No. 5.
Elytris *rubris:* lineola baseos apicisque *nigra.*
Mus. Dom. *Banks.*

6. *Inaequalis*, die *neuholländische ungleich gestreifte Coccinelle.*

Fabric. S. E. p. 80. No. 8.
Elytris flavis: punctis anticis tribus sutura fasciaque apicis (*inaequali*) *nigris.*
Mus. Dom. *Banks.*

7. *Glacialis*, der *amerikanische Sechspunkt.*

Fabric. S. E. p. 80. No. 12.
Coleoptris *rubris;* punctis *sex nigris*, intermediis majoribus sinuatis.
D. *Drury.*

8. *9-punctata*, der *neuholländische Neunpunkt.*

Fabric. S. E. p. 81. No. 15.
Coleoptris *rubris:* punctis *novem nigris*, postice communi, thorace bipunctato.
Mus. Dom. *Banks.*

9. *Dilatata*, der *amerikanische Breitrand.*

Fabric. S. E. p. 82. No. 18.
Subrotunda, coleoptris marginatis *fulvis:* punctis *nigris decem;* elytrorum margine *dilatato* nigro.

10. *Chry-*

10. *Chrysomelina*, die *chrysomelenartige zwölfpunktirte Coccinelle von der Insel Helena.*

Fabric. S. E. p. 82. No. 21.

Coleoptris *rufis:* punctis *duodecim nigris*, thorace immaculato.

Mus. Dom. *Banks.*

11. *Borealis*, der *nordamerikanische Zwölfpunkt.*

Fabric. S. E. p. 82. No. 22.

Coleoptris *flavis*, punctis *duodecim nigris*, duobus communibus, vltimis orbiculatis.

D. *Drury.*

12. *Cassidea*, die *maryländische schildkäferartige Coccinelle.*

Fabric. S. E. p. 82. No. 23.

Oblonga *rubra:* coleoptris punctis *duodecim*, thorace quatuor nigris.

Mus. *Brit.*

13. *13-maculata*, der *schwedische Dreyzehnfleck.*

Fabric. S. E. p. 83. No. 24.

Rotunda, coleoptris *flavis*, punctis *nigris tredecim.*

14. *20-punctata*, der *englische Zwanzigpunkt.*

Fabric. S. E. p. 84. No. 30.

Coleoptris *flavis:* punctis *nigris viginti.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 329. No. 17.*)

15. *28-punctata*, der *trankebarische Achtundzwanzigpunkt.*

Fabric.

*) S. No. 26.

Fabric. S. E. p. 84. No. 34.
Coleoptris *rubris;* punctis nigris *viginti octo.*

16. *Livida*, die *leberfarbige Coccinelle, mit zween braunen Flecken.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 383. No. 18. *Coccinelle grise à deux taches brunes.*

Coccinella *livida;* coleoptris *griseo-lividis*, postice maculis binis oblongis *fuscis.*

Raj. Inf. p. 87. No. 8. *Scarabaeus* hemisphaericus minor, *elytris* e luteo lividis.

17. *Maculata*, die *surinamische schwarzgefleckte Coccinelle.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 392. exot. No. 1. t. 16. f. 22. *Coccinelle mouchetée.*

Coccinella *maculata* ovata; coleoptris *rubris:* maculis magnis *novem nigris*, intermediis tribus in futuram positis.

18. *Ocellata*, der *sibirische Argus.**)

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 73.

Maxima inter europaeas. Coleoptris *rubris, nigro-punctatis.*

Müllers Supplementsband p. 221. No. 31. der *Argus.*

19. a. *Cimifugae*, die *Wanzenkraut-Coccinelle.*

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 73.

Coleoptris *rubris, quatuor* maculis transversis *nigris.*

Müllers Supplementsband pag. 222. der *Wanzenkrautkäfer.*

*) S. N. 23.

19. b. *4-punctata*, der *Vierpunkt.*

Pontopp. Nat. Gesch. v. D. p. 203. t. 16.

Thorace flavo multipunctato; coleoptris *rubris* margine luteo, punctis marginalibus 4 *nigris.*

20. *Marginella*, die *gerändelte Coccinelle.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 619. Nigra, thorace luteo, punctis quinque, elytris flavis margine luteo, punctis 4 nigris.

Pontopp. Atl. Dan. I. t. 29.

Cocc. *4 punctata.*

21. *6-punctata*, der *Sechspunkt.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 66. No. 622. Nigra, thorace luteo, punctis quinque, elytris fulvis, punctis sex nigris in triangulum disposítis.

22. a. *14-punctata*, der *Vierzehnpunkt.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 67. No. 631. Nigra, thorace flavo punctis quinque, elytris rubris, punctis nigris 14.

II. *Rothe oder gelbe Flügeldecken mit weissen Punkten.*

22. b. *Detrita*, die *neuholländische Coccinelle mit ungefleckten Flügeldecken, und zween weissen Punkten am Kopfe.*

Fabric. S. E. p. 85. No. 36.

Flava, coleoptris immaculatis; thorace *albo* maculato; caput punctis duobus orbitaque oculorum *albis.*

Mus. Dom. *Banks.*

23. *18-gut-*

23. *18-guttata*, der *Achtzehntropf.*
Fabric. S. E. p. 85. No. 40.
Coleoptris *rubris*, punctis *albis* octodecim.

III. *Schwarze Flügeldecken mit rothen Flecken.*

24. *8-guttata*, der *Achtfleck.*
Füeſslins ſchweiz. Inſ. p. 7. No. 119.*)
Sulzers Geſch. t. 3. f. 6. S. 32.

25. *Lunata*, der *Mondfleck von der Inſul Helena.*
Fabric. S. E. p. 86. No. 48.
Coleoptris *nigris*, maculis decem *rubris*, ſex *lunatis.*
Muſ. Dom. *Banks.*

26. *Guttato-puſtulata*, der *neuholländiſche Tropfenfleck.*
Fabric. S. E. p. 87. No. 51.
Coleoptris *nigris*, punctis duobus *flavis*, quatuor *rufis.*
Muſ. Dom. *Blanks.*

27. *3-puſtulata*, der *penſylvaniſche Dreyfleck.*
de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 393. exot. No. 2. t. 16. f. 23. *Coccinelle à 3 taches rouges.*
Coccinella *(3-puſtulata)* coleoptris *nigris:* maculis tribus oblongis *rubris.*

28. *Syſimbrii*, der *ruſſiſche Wellſaamen-Sonnenkäfer.*

Lepe-

*) Vielleicht nur eine Abänderung von No. 44. oder 45. *Linnei.* Im *Füeſslin* ſtehet ſtatt 8-guttata, 8-puſtulata.

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 10.
Atro capite, marginibus thoracis atque elytrorum vndique *sanguineis*.

29. *Axyridis*, die *sibirische Mengelkraut-Coccinelle.*

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 71.
Müllers Supplementsband p. 222. No. 47. der *Mengelkäfer.*

30. *Austriaca*, der *oesterreichische Sonnenkäfer.*

Franz von *Paula Schrank* Beyträge zur Naturgesch. S. 62. §. 4. Nigra, elytris *fascia rosea* abrupta. Cocc. *cacti* Linn. No. 41?

31. *12-pustulata*, die *Zwölfblatter.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 645.
Coleoptris nigris, punctis duodecim flavis, vltimo in singulo elytro hamato.
Pontopp. Atl. Dan. I. t. 29.

32. a. *Cincta*, die *gegürtelte.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 647.
Nigra, elytrorum maculis quatuor summoque margine *rubris.*
Schaeff. Icon. t. 13. f. 16. 17.

32. b. *Fasciata*, die *Band-Coccinelle.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 648.
Nigra, capite, abdomine elytrorumque serie transversali *rubra.*

S. *No. 42. Linn. 2-pustulata.*

IV. *Schwarze Flügeldecken mit weißen und gelben Flecken.*

33. *12-pustulata*, der *Zwölfflеck.*

Pontoppid. Nat. Gesch. v. D. p. 203. t. 16. a. b.
Coleoptris *nigris;* punctis 12 *flavis*, vltimo in singulo elytro hamato.

34. *2-maculata*, der *Zweyfleck.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 203. t. 16.
Coleoptris *nigris*, maculis 2 transversalibus *flavis*, margine exteriori adnatis, ante futuram versus basin elytrorum incurvatis. *Thorax* niger, margine flavescente.

35. *4-maculata*, der *idrische Vierfleck.*

Scop. Entom. carn. No. 250.
Elytrum *fuscum*, maculis *fulvis.*

36. *10-maculata*, der *Zehnfleck.*

Scop. Entom. carn. No. 251.
Elytrum *fusco-rufum*, maculis (5) *flavicantibus.*

37. *Felina*, die *nordamerikanische runde Coccinelle.*

Fabric. S. E. p. 87. No. 52.
Globosa, coleoptris *atris*, punctis sex *albis.*
D. *Drury.*

38. *Fimbriata*, das *Eingefaßte.*

Sulzers Gesch. S. 32. t. 7. lit. C.

39. a. *Leonina*, die *neuholländische Coccinelle.*

Fabric. S. E. p. 87. No. 54.
Coleoptris *atris*, punctis *albis* sedecim.

39. b. *Didyma*, der *Zweyfleck.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 649. Nigra, *thorace* vtrinque, margine maculaque *elytrorum* ac pedibus flavibus.

Pontopp. Atl. Dan. I. t. 29.

V. *Einige neue Scopolische Coccinellen, blos nach den Farben unterschieden.*

1. *Ganz einfarbige.*

40. *Riparia*, die *himmelblaue Ufer-Coccinelle.*

Scopoli Entom. Carn. No. 223.

Oblonga, nitens, *obscure coerulea tota*, elytris punctatim striatis.

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 132. *Chrysomela* riparia.

41. *Erratica*, die *kupfergrüne herumschwärmende Coccinelle.*

Scop. Ent. carn. No. 226.

Oblonga nitida *viridi-aenea;* elytris punctatim striatis.

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 133. *Chrysomela* erratica.

42. *Rufipes*, der *Rothfuss.*

Scop. Ent. carn. No. 227.

Oblonga, nigra, nitida; antennis pedibusque *rufis.*

2. *Zweyfarbige.*

43. *Liturata*, die *goldgrüne, violetgestreifte Coccinelle.*

Scop. Ent. carn. No. 230.

Aurato-

Aurato-virens; thorace elytroque fasciis binis, longitudinalibus, *violaceis.*

44. *Speciosissima*, die *schönste Coccinelle.**)

Scop. Ent. carn. No. 231.

Ovata; elytris *auratis;* margine lineaque media *coerulei* coloris.

45. *Fastuosa*, die *Prachtcoccinelle.***)

Scop. Ent. carn. No. 232.

Ovato-oblonga, fulgida, *aurato-virens;* elytris *aureis;* margine lineaque *viridibus;* alis *rubris.*

46. *Signata*, die *roth und schwarz gezeichnete Coccinelle.*†)

Scop. Ent. carn. No. 233.

Ovata, *rubra;* thorace punctis binis, capite, corpore subtus, pedibus *nigris.*

VI. *Zwey ungewisse Coccinellen.*††)

47. *Dubia*, die *zweifelhafte Coccinelle.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 97.

Rotundata; elytris *striatis fuscis*, margine *rufescentibus.*

48. *Spuria*, die *Aftercoccinelle.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 107. No. 98.

Viridi niteus; elytris *rubris.*

*) v. *Linn. Chrysom.* specioſa No. 19.

**) Des *Linn.* Chrysom. fastuosa No. 18.

†) *Linn.* Chr. *Viminalis* No. 31. nach *Fabric.* S. E. p. 98. No. 22.

††) Ich finde des *Scopoli* Satz sehr gegründet: Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 100. *Coccinellas* ex numero punctorum in species non bene distingui, didici demum, cum vidissem in copula varie punctatas.

Aufser diefen hat *Geoffroi* noch *zehn Arten* angeführt, die ich in keinem Schriftfteller finde.

I. *Zur erften Klaffe: rothe oder gelbe Flügeldecken, fchwarze Punkte.*

1. *Variegata*, der *Scheckrücken.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 322. No. 5. La *Coccinelle rouge à neuf points noirs, et corcelet varié.*

Coleoptris *rubris*, punctis novem *nigris*, *thorace* nigro, antice albo.

2. *Vittata*, der *Bandrücken.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 324. No. 7. La *Coccinelle rouge à treize points noirs, et corcelet rouge, à bande.*

Coleoptris *rubris* punctis *tredecim* nigris; thorace rubro, medio nigro.

3. *Flava*, der Gelbfchild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 324. No. 8. La *Coccinelle rouge, à onze points et corcelet jaune.*

Coleoptris *rubris*, punctis *undecim* nigris, *thorace luteo*, nigro-punctato.

4. *Suturata*, die *Schwarznath.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 329. No. 16. La *Coccinelle jaune à future.*

Coleoptris *flavis*, punctis fexdecim *nigris*, plurimis connexis, *futura nigra.*

II. *Rothe*

II. *Rothe oder gelbe Flügeldecken, weiſse Punkte.*

5. *Albo-marginata*, der *Weiſsrand.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 327. No. 14. La *Coccinelle à points et bordure blanche.*

Coleoptris *rubris*, punctis *quatuordecim* limboque *albis.*

III. *Schwarze Flügeldecken, rothe Flecke.*

6. *Subvilloſa*, das *Rauchhühnchen.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 332. No. 21. La *Coccinelle velue à bandes.*

Subvilloſa *nigra*, faſciis duabus transverſis *rubris.*

7. *Interrupta*, die *Unterbrochene.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 333. No. 23. La *Coccinelle velue à bande interrompue.*

Subvilloſa nigra, coleoptrorum faſcia transverſa *rubra interrupta.*

Reaum. Inſ. Tom. 3. P. 2. p. 170. t. 31. f. 20. 28. 29. Le *Barbet blanc*, der *weiſse Pudel* (von der Larve).

8. *Rubro-maculata*, der *Rothfleck.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 333. No. 24. La *Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.*

Subvilloſa nigra, *thorace* vtrimque macula *rubra.*

IV. *Schwarze Flügeldecken, gelbrothe, auch ſchwarze Flecke.*

9. *Luteo-rubra*, die *rothgelbe.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 332. No. 22. La *Coccinelle velue à points.*

Subvilloſa *nigra*, punctis quatuor *luteo-rubris.*

10. *Nigro-maculata*, der *Schwarzfleck.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 334. No. 27. La *Coccinelle noire à points rouges au corcelet.*

Rotunda *nigra*, coleoptrorum margine reflexo, thorace vtrinque *macula nigra.*

Noch zwey neue Coccinellen.

1. *Minima*, die *allerkleinste.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 613.

Tota atra.

2. *Pusilla*, die *kleine.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 65. No. 614.

Thorace nigro; *elytris* flavescentibus, impunctatis.

199. GESCHLECHT. Chrysomela. *Blattkäfer*, *Chrysomele*, *Goldhähnchen.* *Holl.* Gout-haantjes; *Friesl.* Gouden-Engeltjes.*)

Müllers Linn. Naturf. 5. Th. 1. B. S. 163. *Goldhähnchen.*

Füesslins schweiz. Inf. S. 7. *Blattkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 56. *Blattkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 32. *Blattkäfer.*

Börners

*) Zwischen diesen und den *Coccinellen* herrscht noch immer viel Verwirrung, und sie werden häufig verwechselt. *Geoffroi* hat fünf bis sechs besondere Geschlechter daraus gemacht.

1. *Cryptocephalus*, *(Gribouri)* und *Melolontha*, dazu verschiedene der 3ten Linnéischen Klasse.
2. *Crioceris*, dazu die vierte Linn. Klasse.
3. *Altica*, dazu des *Linnei* Chr. *saltatoriae*, oder die aus der 2ten Klasse.
4. *Galeruca*, dazu die *vierte* Linn. Klasse.
5. die eigentliche *Chrysomela*, wozu die mehresten der *ersten Linnéischen* gerechnet werden müssen.

Börners Samml. 1. Th. S. 467. *Blattkäfer.*
Eberhards Thiergesch. S. 200. *Blattkäfer.**)
Beckmanns Anfangsgr. der Naturh. S. 94. *Blattkäfer.*
Onomatol. hist. natur. P. 2. p. 836. *Chrysomela*, das *Mayenkäfergeschlecht.* **)
Schriften der Dronth. und Norw. Ges. 3. Th. S. 350.
Wochenblatt für Kinder. 6. B. S. 15.
Pontoppid. N. G. v. D. S. 203. *Goldfliege, Goldschmidt.*
Neuer Schauplatz der Natur. 1. B. S. 817. *Blattkäfer.* S. *Goldhähnchen.*
Gleditsch Einl. in die Forstwiss. 2. Th. S. 1508. *Länglichtrunde Blattkäfer.*
Catholicon. C. p. 321. der *Blattkäfer, Marienkäfer.* †)
Fabric. S. E. p. 94-124. dazu 1. Chrysomela, 2. Cryptocephalus, 3. Altica, 4. Cistela, 5. Crioceris, 6. Erotylus, 7. Lagria.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 160.
Scop. Entom. carn. p. 68.
Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. V. p. 606.

*) Der Herr D. *Eberhard* hat in seinem Versuch einer Thiergesch. S. 199. den Unterordnungen der *Geoffroischen* Chrysomelen geschickte Namen beygelegt.

1. CRYPTOCEPHALUS, *Fallkäfer.*
2. CRIOCERIS, *Lilienkäfer.*
3. ALTICA, *Hüpfkäfer.*

**) Die Benennung in der ONOM. *Mayenkäfergeschlecht* richtet Verwirrung an, wodurch eigentlich Scarab. *Melolontha* verstanden wird.

†) Das Synom. *Marienkäfer* in dem Cathol. gehet eigentlich auf die *Coccinellen.* Sonst merke ich noch an, dass zu der *dritten* Linnéischen Klasse: corpore cylindrico die *Melolonthae* des *Geoffroi* Inf. Tom. I. p. 195. gehören, wie denn auch einige von dessen *Tenebrions* und *Mordellis* Linneische Chrysomelen sind, besonders von der lezten Klasse (elongatae).

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 231-266.
de *Geer* Inf. T. IV. praef. P. XII. T. V. p. 285-358.
Bomar. Dict. III. p. 157.
Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 74. 81. 58. 57. 84. 83. 58. 83. 85.

I. *Mit eyrundem Körper.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 255-266.
de *Geer* Inf. Tom. 4. p. 290-329.
Fabric. S. E. p. 94-105.
Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 81.

1. *Gigantea*, der *indianische Riese.*

Müller l. c. S. 164. No. 1. t. 4. f. 3. das *Riesenhähnchen.*

Sulzers Kennz. pag. 6. t. 3. f. 15. a. der *Riese* unter diesem Geschlecht. Das *Mittel* zwischen den *Coccinellen* und *Chrysomelen.* *Coccinella* gigantea.

— — Gesch. der Inf. S. 33. t. 3. f. 8. der *Riese.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 349. exot. 1. t. 16. f. 8. Chrysomele *gigantesque.*

Oblonga *nigra*, *thorace* depresso, abdomine gibbo, elytris maculis subrotundis *rubris* numerosissimis.

Fabric. S. E. p. 123. *Erotylus* 1.

2. *Gibbosa*, das *surinamische Buckelhähnchen.*

Müller l. c. S. 165. No. 2. t. 4. f. 5. das *Buckelhähnchen.*

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 5.

Ovata, nigra, *elytris* flavis, *fasciis* duabus punctisque baseos *nigris.*

3. *5-pun-*

3. *5-punctata*, das *fünfpunktirte Goldhähnchen.*

Müller l. c. S. 165. No. 3. t. 4. f. 4. der *Grosspunkt.*

Fabric. S. E. p. 123. *Erotylus* 2.

4. *Göttingensis*, das *Schaafgarbenhähnchen.*

Müller l. c. p. 165. No. 4.

Füesslins schweiz. Ins. S. 7. No. 121. bey der *Schaafgarbe.*

Rösels Insektenbel. 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 12. t. 5. der *mattschwarze Graskäfer.**)

Mülleri Faun. Fridr. p. 7. No. 60.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 876.

Ovata, violacea, *tarsis* ferrugineis.

Fabric. S. E. p. 94. *Chrysom.* 2.

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 298. No. 8. *Chrysomele noire violette.*

Violaceo-nigra, ovata, thorace corporeque convexis.

5. *Tanaceti*, das *Reinfarnhähnchen.*

Müller l. c. S. 166. No. 5.

Füesslins schweiz. Ins. S. 7. No. 122. bey dem *Reinfarnkraut.*

Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellsch. 3. Th. S. 350.

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 51.

Oblonga, nigra, punctata, elytris coryaceis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. No. 83. *Galeruca* No. 906.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 836. No. 5. der *schwarze Mayenkäfer mit hohlen Punkten.*

Merian. Ins. t. 68.

Schaeff. Icon. t. 21. f. 14.

Geoffr.

*) Dieses Citatum hat der Herr von *Geer* zu der folgenden Numer 5. *Tanaceti* gesetzt.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 252. No. 1. t. 4. f. 6. *La Galeruque brunette.*

Galeruca atro-fuſca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numeroſis.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 299. No. 4. t. 8, f. 27. *Chryſomele de la Tanéſie.*

Ovata atra opaca punctata.*)

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 413. *Chryſomela* atra, punctis excavatis contiguis.

6. *Haemorrhoidalis*, der *Rothafter*, (der *Erlenblattkäfer.***)

Müller l. c. p. 166. No. 6. der *Rothſteiſs.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. p. 558. No. 17. der *ſchwarze glatte Blattkäfer der Erle.*

Fabric. S. E. p. 102. *Chryſom.* 47.

Scop. E. carn. No. 225. *Coccinella* haemorrhoidalis.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 414. *Chryſomela* nigra glabra, antennarum baſi ſubflava.

Onomatol. hiſt. nat. P. 2. p. 838. No. 1. der *ſchwarze glatte Mayenkäfer mit gelblichten Fühlhörnern an dem Grund.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 297. No. 6. *Chryſomele hemorrhoidale.*

Ovata nigra, ſeu rufa, thorace punctis duobus nigris, antennarum baſi ſubflava.†)

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 877. *Ovata*, violacea, punctata; *ano rubro.*

7. *Gra-*

*) Hierbey hat von *Geer* das vorige *Röſe'ſche* Citatum angeführt, von No. 4. *Götting.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) Dieſe und No. 31. *Viminalis* hat der Herr von *Geer* in der Begattung angetroffen, und hält ſie alſo für einerley Art.

7. *Graminis*, das *Grashähnchen.**)

Müller l. c. p. 167. No. 7.

Füesslins schweiz. Ins. S. 7. No. 123. auf den *Schmalgräsern.*

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 9.

Scop. Entom. carn. No. 220. *Coccinella* graminis.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 419. *Chrysomela* viridi-coerulea.

Acta Upsal. 1736. p. 17. No. 1. *Chrysomela* viridi-coerulea nitida.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 61.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 892. Norv. *Guldsmed.* *Ovata*, viridi coerulea, nitida, *alis* rubellis.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 844. No. 2. der grünblaue *Mayenkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 260. *Chrysom.* 10. Le *grand Vertubleu.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 304. No. 16. *Chrysomele verte du Gramen.*

Ovata viridi-coerulea aurata, antennis dimidio fuscis, pedibus viridibus.

8. *Aenea*, das *Kupferhähnchen*, (der *grünglänzende Blattkäfer*).

Müller l. c. p. 167. No. 8. t. 4. f. 6.

Füesslins schweiz. Ins. S. 7. No. 124. der *kupfrichte Blattkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 559. der *grüne glänzende eyförmige Blattkäfer der Erle.*

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B. S. 270.

Mülleri

*) Nirgends abgebildet.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 62.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 891.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 844. No. 3. der *grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen ausgehöhlten Brust.*

Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 57.

Oblonga, viridis, nitida, elytris *aeneis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 261. No. 12. Le *petit verd-tubleu.*

Viridis nitida, thorace antice excavato, *fasciis* elytrorum longitudinalibus coeruleis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 305. No. 18. t. 9. f. 4. *Chrysomele verte de l'Aune.*

Chr. (*viridis Alni*) ovata, viridi-aurata, nitida, thorace antice excavato, abdomine supra nigro apice testaceo, elytris punctis sparsis.

Schaeff. Icon. t. 21. f. 3. 4.

du Bois Tableau annuel. 1772. p. 121-123. Le *Velours verd;* Le *Gribouri de la Vigne; Coupe-Bourgeons; Pique-brots des Payſans.*

9. *Alni*, die *violette Erlenchrysomele.*

Müller l. c. p. 167. No. 9. der *Erlenfresser.*

Füesslins schweiz. Ins. S. 7. No. 125. der *Erlenblattkäfer.*

Frisch Ins. 7. Th. S. 13. t. 8. der *blaue und grüne Ellern- oder Elsenkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 559. der *violetblaue und eyrunde tiefpunktirte Blattkäfer der Erle.*

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 13. der *Fallkäfer* (Cryptocephalus).

Schaeff. Elem. t. 53. f. 1. 2. *Cryptocephalus, Fallkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 63.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 911. *Luperus.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 2. der *Erlenmayenkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 232. *Cryptocephalus* 1. Le *Gribouri bleu de l'Aune.*

Cryptoc. violaceus, punctis inordinatis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 314. No. 21. t. 9. f. 18. *Chrysomele violette de l'Aune.*

Chr. ovata, supra violacea subtus nigra, punctis excavatis sparsis, thorace minuto, antennis longis nigris.

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 53.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 416. *Chrys.* nigro-purpurea, punctis excavatis adspersa.

10. *Betulae*, die *Birkenchrysomele.*

Müller l. c. p. 168. No. 10. der *Birkenmeyer.*

Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 126. der *Birkenblattkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 552. der *violette eyrunde mit tiefen gestrichelten Punkten bezeichnete Blattkäfer der Birke.*

Röselś Insektenbelust. 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 5. t. 1. der *blau und grün schillernde Blattkäfer.**)

Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 54.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 66.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 893.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 1. et p. 46. No. 1. *Attelabus* coeruleus etc. der *blaue Birkenmayenkäfer.*

Acta Vpsal. 1736. p. 19. No. 3. *Attelabus* coeruleus nitidus oblongiusculus, subtus niger.

Linn.

*) Dieses *Röselsche* Citatum stehet auch bey No. 23. *Vitellina.* Der Herr von *Geer* hat es bey jener, nicht aber bey dieser, *Füeßlin* aber und *Müller* bey *Vitellina* angeführt.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 415. *Chrysomela* nigro-purpurea, punctis excavatis striatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 264.*) *Chrysom.* 17. La *Chrysomele bleue du Saule.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 318. No. 24. t. 9. f. 24. a. b. *Chrysomele ronde bleue du Saule.*

Chrysomela (*coerulea Salicis*) subglobosa viridi-coerulea nitida obscura, punctis excavatis sparsis.

Scop. Ent. carn. No. 221. *Coccionella* Betulae.

11. *Haemoptera*, der *Rothflügel.*

Müller l. c. p. 168. No. 11.

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 127. das *Krausemünzenkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 11.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 64.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 878.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 258. *Chrys.* 5. La *Chrysomele violette.*

Tota violacea.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 312. No. 20. t. 9. f. 13. *Chrysomele violette du Millepertuis.*

Chrysomela (*Hyperici*) ovata, subglobosa violaceo-coerulea nitida seu viridiuscula, thorace amplo.

12. *Occidentalis*, das *gelbfüssige amerikanische Goldhähnchen.*

Müller l. c. p. 168. No. 12. der *Amerikaner.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 353. No. 7. t. 16. f. 14. *Chrysomele occidentale.*

Ovata viridi-aurea nitidissima, punctis excavatis, antennis pedibusque flavis.

13. *Ce-*

*) Ein Druckfehler in dem *Linneischen* Citato, da statt p. 264. 464. stehet.

13. *Cerasi*, das *Vogelkirschhähnchen.*

Müller l. c. p. 169. No. 13.
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 823. No. 20. der *längliche graue oder bleyfarbige und schwarzäugige Blattsauger.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 435. *Chrysomela* livida; oculis nigris.
Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 896.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 837. No. 4. der *blasse Mayenkäfer mit schwarzen Augen.*
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 301. No. 11. t. 9. f. 2. *Chrysomele du Bois de Ste Lucie.*
Chrysomela (Padi) ovata flavo-grisea pallida nitida, thorace magno, oculis nigris, antennis brevioribus fuscis.

14. *Padi*, das *schwarze Vogelkirschhähnchen.* *) *(Vogelbeerblattkäfer).*

Müller l. c. p. 169. No. 14. das *Flohhähnchen.*
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 823. No. 19. der *Patscherben-Blattsauger.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 434.
Chrysomela elytris fuscis pone lividis.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 837. No. 2. der *braune Mayenkäfer mit hinten ganz blassen Flügeldecken.*
Müllери Faun. Fridr. p. 7. No. 64.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 897.

15. *Minutissima*, das *kleinste Blattkäferchen.* **)

Müller l. c. pag. 169. No. 15. das *Milbenhähnchen* (viermal kleiner als ein Floh).

16. *Ar-*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

16. *Armoraciae*, das *Merrettichhähnchen.**)

Müller l. c. p. 169. No. 16. der *Merrettichmager.*
Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 50.
Mülleri Faun. Fridr. p. 7. No. 67.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 887.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 322. No. 25. *Chrysomele ronde violette du Plantain.*

Chrysomela (*Plantaginis*) subglobosa supra violacea nitida subtus nigra, punctis excavatis striatis.

17. *Cerealis*, der *Saatblattkäfer (gelber Blattkäfer).*

Müller l. c. p. 170. No. 17. der *Kornfresser.*
Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 128.
Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 33.
Schaeff. Icon. I. t. 3.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 262. *Chrysom.* 14.**) *L'Arlequin doré.*

Aurea, fasciis coeruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis.

18. *Fastuosa*, der *Blaustrich.*

Müller l. c. p. 170. No. 18.
Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 129. der *Blaustrich.*
Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 36.
Scop. Ent. carn. No. 232. *Coccinella* fastuosa. †)

19. *Speciosa*, der *Goldstrich.* ††)

Müller l. c. p. 170. No. 19.

Fabric.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Ein Druckfehler im *Linné*, wo No. 15. stehet.

†) Unter den *neuen Coccinellen* No. 39.
Nirgends abgebildet.

††) *Nirgends abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 37.
Scop. Entom. carn. No. 231. *Coccinella* speciosissima.*)

20. *Halensis*, das *hallische Blattkäferchen.***)
Müller l. c. p. 170. No. 20. der *Halor.*

21. *Hypochaeridis*, das *Habichts-* oder *Saukrauthähnchen.*†) *(Lungenblumenkäfer).*
Müller l. c. p. 171. No. 21.
Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 130.
Scop. Entom. carn. No. 193. *Bupreſtis* Syngenesiae.

22. *Vulgatissima*, die *gemeinste Chrysomele.*††)
Müller l. c. p. 171. No. 22. der *Blauflügel.*
Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 131. der *gemeinste Blattkäfer.*
Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 56.
Scop. Entom. carn. No. 222. *Coccinella* vulgatissima.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 317. No. 23. *Chrysomele allongée bleue du Bouleau.*
Chrysomela *(coerulea Betulae)* oblongo-ovata supra coeruleo-violacea subtus virescens, punctis excavatis striatis, thorace amplo, *antennis longioribus.*

23. *Vitellinae*, die *kupferfarbige Sahlweiden-Chrysomele.*
Müller l. c. p. 171. No. 23. der *Eyerdotter.*

*) Unter den *neuen Coccinellen* No. 38.
**) *Nicht abgebildet.* †) *Nirgends abgebildet.*
††) *Nirgends abgebildet.*

Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 134. der *Weidenblattkäfer.**)

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 684. No. 9. 757. No. 86. der *gelbe eyrunde Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 55.

Oblonga, viridi aenea.

Scop. Entom. carn. No. 224. *Coccinella* vitellinae.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 84.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 888.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 836. No. 4. der *kupferfarbigte Mayenkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 323. No. 27. *Chrysomele bronzée du Saule.*

Chrysomela oblonga-ovata aenea nitida, abdomine supra nigro apice flavescente, elytris punctis striatis.

24. *Polygoni*, das *Queckengrashähnchen.***) *(Wegetrittblattkäfer).*

Müller l. c. p. 172. No. 24.

Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 135.

Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 32.

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 69.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 894.

Reaum. Ins. Tom. 3. P. I. p. 299. t. 17. f. 14. 15. Le *Scarabé de la teigne de l'avoine et de l'orge.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 47. No. 2. *Altelabus* subrotundus etc. der *blaulicht grüne Mayenkäfer.*

— — — et pag. 844. No. 4. der *grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen gleichen Brust, und hinten neben einander stehenden Flügeldecken.*†)

Acta

*) Hierbey stehet eben das *Röselsche* Citatum als bey N. 10. *Betulae. Nirgends abgebildet*, wenn solches zu No. 10. gehöret.

**) Das andere Geschlecht siehe unter den *neuen* No. 22. *Obtusa.*

†) Die Varietät zu *Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 580. B. S. *hinten die Neuen*, 11te Kl. No. 7.

Acta Upsal. 1736. pag. 19. *Altelabus* subrotundus coeruleo nigricans, collari testaceo.

Reaum. Inf. Tom. 3. P. 1. Mém. I. p. 43. t. 2. f. 18. Le *Scarabé d'un Ver mineur en grand des feuilles de Mauve.*

Geoffr. Inf. Tom. 1. p. 242. *Crioceris* 4. Le *Crioc ere bleu à corcelet rouge.*

Coeruleo-viridis, thorace femoribusque rufis.*)

Raj. Inf. pag. 100. *Scarabaeus* antennis clavatis *quartus.*

Schaeff. Icon. t. 51. f. 5. t. 161. f. 4. a. b. t. 173. f. 4.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 322. No. 26. *Chrysomele de la Renouée.*

Chrysomela ovata violacea, seu viridis nitida, thorace lato pedibusque rufo-flavis.

25. *Pallida*, das *blafsgelbe Weidenhähnchen.***)

Müller l. c. p. 172. No. 25.
Füefslins schweiz. Inf. S. 8. No. 136.
Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 26.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 840. No. 3. der *blafsgraue Weidenmayenkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 243. *Crioceris* 6. Le *Crioc ere aux yeux noirs.*

Crioceris pallida, oculis nigris.

26. *Staphylaea*, der *braune länglichte Blattkäfer.*

Müller l. c. S. 172. No. 26. das *Pimpernüfschen.*
Füefslins schweiz. Inf. S. 8. No. 137.

*) Nach *Fabric.* l. c. ist es des *Geoffroi Chrysom. verte à corcelet ronge.* T. I. pag. 263. No. 16. Das *Linnéische* Citatum des *Geoffroi* I. 242. 4. hat der Herr von *Geer* zu No. 105. *Melan.* gesetzt.

**) *Nirgends abgebildet.*

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 4. B. S. 270.

Fabric. S. E. p. 97. *Chrysom.* 14.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 840. No. 2. der *muschelfarbigte Mayenkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 294. No. 3. t. 8. f. 24. *Chrysomele couleur de cuivre.*

Chrysomela *(cuprea)* ovata rubro-cuprea nitida, oculis nigris.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 263. No. 15. La *Chrysomele briquetée.*

Chrysomela supra rubro-cuprea, infra nigra nitens.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 881.

— — Faun. Fridr. p. 8. No. 68.

27. *Polita*, der *Spiegelrücken.*

Müller l. c. p. 172. No. 27.

Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 138.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 684. No. 10. der *eyrunde Blattkäfer mit röthlichen Flügeldecken, und einem grünlichen ins Goldfarbene spielenden Bruststücke.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 70.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 882.

Fabric. S. E. p. 97. *Chrysom.* 16.

Scop. Entom. carn. No. 229. *Coccinella* polita.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 844. No. 1. der *grüne kupferglänzende Mayenkäfer mit röthlichen Flügeldecken.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 257. *Chrysom.* 2. La *Chrysomele rouge à corcelet doré.*

Chrysomela viridi-aenea, elytris rubicundis, punctis sparsis.

de *Geer*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 294. No. 2. t. 8. f. 23. *Chrysomele polie.*

Chrysomela ovata viridi-aurata nitida, elytris flavo-rubris.

Schaeff. Icon. t. 65. f. 9.

28. *Lurida*, der *Braunflügel.**)

Müller l. c. p. 173. No. 28.

Füeſslins ſchweiz. Inſ. S. 8. No. 139.

Fabric. S. E. p. 97. *Chryſom.* 17.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 258. *Chryſom.* 3. La *Chryſomele rouge à corcelet noir.*

Chryſomela nigra, elytris rubris ſtriatis, ſtriis punctatis.

29. *Clavicornis*, das *Keulhörnchen.***)

Müller l. c. p. 173. No. 29.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 351. No. 4. t. 16. f. 11. *Chryſomele à antennes à bouton.*

30. *Populi*, das *Pappelnhähnchen.*

Müller l. c. p. 173. No. 30. der *Pappelnfreſſer.*

Füeſslins ſchweiz. Inſ. S. 8. No. 140. der *Pappelblattkäfer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 685. No. 11. der *eyrunde Blattkäfer mit dem blaulichten Bruſtſtück und rothen ſchwarzſpitzigen Flügeldecken.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 428.

Chryſomela nigro-coerulea, elytris rubris apice nigris.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Vielleicht *Fabricii* Chr. *craſſi-cornis* No. 27. S. E. p. 99. In Nova Hollandia.

It. Oeland. p. 38. *Chrysomela* thorace viridi coeruleo, elytris rubris, apice nigris.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 838. No. 4. der *schwarzblaue Mayenkäfer mit rothen am Ende schwarzen Flügeldecken.*

Schaeff. Icon. t. 47. f. 4. 5. t. 21. f. 9.

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 13.

Scop. Entom. carn. No. 228. *Coccinella* populi.

Lister Scarab. Anglic. p. 381. No. 6. *Scarabaeus* viridis, alarum thecis miniatis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 256. *Chrys.* 1. La *grande Chrysomele rouge à corcelet bleu.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 290. No. 1. t. 8. f. 16. *Chrysomele du Tremble.*

Chrysomela ovata, obscure coerulea nitida, elytris flavo-rubris, puncto terminali nigro.

Müller Zool. Dan. p. 82. No. 899.

31. *Viminalis*, der *Weidenbinder.**)

Müller l. c. p. 174. No. 31.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 758. N. 90. der *schwarze rothgeflügelte eyförmige Weidenblattkäfer.*

Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 141.

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 22.

Ovata nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis.

Scop. Entom. carn. No. 233. *Coccinella* Signata.**)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 842. No. 1. der *Mayenkäfer mit der rothen Brust und Flügeldecken.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 265. *Chrysom.* 18. La *Chrysomele à future noire.*

Chryso-

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Unter den *neuen Coccinellen* No. 40.

Chrysomela rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum sutura nigra.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 297. No. 6.*)

32. *10-punctata*, der *Zehnpunkt.*

Müller l. c. p. 174. No. 32. das *Punkthähnchen.*

Füesslins schweiz. Ins. S. 8. No. 142. der *Zehnpunkt.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 685. No. 12. der *eyrunde schwarzgetüpfelte Blattkäfer mit rothen Flügeldecken, und einem oberwärts rothen, unterwärts schwarzen Bruststücke.*

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 841. No. 2. der *dunkelrothe Mayenkäfer mit schwarzen Flecken.*

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 25.

Schaeff. Icon. t. 21. f. 13.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 295. No. 4. t. 8. f. 25. *Chrysomele rousse à pattes rousses.*

Chrysomela *(rufipes)* ovata, supra rufa, subtus nigra, elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis.

B. *Nigripes*, der *Schwarzfuss.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 258. *Chrys.* 4. La *Chrysomele rouge à points noirs.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 296. No. 5. *Chrysomele rousse à pattes noires.*

Ovata, supra rubra, subtus nigra, thorace macula magna nigra, elytris punctis subquinis, *pedibusque nigris.*

Schaeff. Icon. t. 21. f. 11.

*) Das andere Geschlecht von No. 6. *Haemorrhoidalis.*

33. *Varioloſa*, das *Blatterhähnchen.**)

Müller l. c. p. 175. No. 33.
Fabric. S. E. p. 99. *Chryſom.* 28.

34. *Lapponica*, der *Lappländer.*

Müller l. c. p. 175. No. 34.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 843. No. 1. der *Mayenkäfer mit grüner Bruſt, und rothen Flügeldecken mit einem blauen Kreuz.*
Schaeff. Icon. t. 44. f. 2.
Acta Vpſal. 1736. p. 17. No. 4. *Chryſomela* viridi-aurea, rubro variegata.
Fabric. S. E. p. 99. *Chryſom.* 29.
de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 302. No. 12. t. 9. f. 3. *Chryſomele à rayes courbes.*
Chryſomela *(curvilinea)* ovata viridi-aenea nitida, elytris faſciis curvis teſtaceis.

35. *Vndulata*, der *Javaner mit ſchwarzblauen wellenförmigen Bändern.***)

Müller l. c. p. 175. No. 35. der *Javaner.*
Fabric. S. E. p. 100. *Chryſom.* 30.

36. *Boleti*, das *Schwammhähnchen.*

Müller l. c. p. 175. No. 36.
Füeſslins ſchweiz. Inſ. S. 8. No. 143. der *Herzkäfer.*
Sulzers Geſch. S. 33. t. 3. f. 9. der *Herzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 97. *Chryſom.* 18.
Scop. Entom. carn. No. 247. *Coccinella* faſciata.
Vddm. Diſſ. 4. f. 3. *Dermeſtes* ater nitens, elytris nigris, faſciis duabus flavis vndulatis.

Schaeff.

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nirgends abgebildet.*

Schaeff. Elem. t. 58. *Diaperis, Herzkäfer.*
— — Icon. t. 77. f. 6.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 337. *Diaperis* 1. t. 6. f. 3.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 49. *Tenebr.* 9. t. 3. f. 3. *Tenebrion de l'agaric.*

TENEBRIO *(Boleti)* alatus ovatus gibbus niger nitidus, elytris fasciis tribus transversis fulvis vndatis.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 791. *Diaperis.*

37. *Collaris*, der *Kragenträger.**)

Müller l. c. p. 176. No. 37.
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 758. No. 89. der *eyrunde violette Blattkäfer mit einem am Rande gelb. punktirten Bruststück.*
Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 21.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 417.
Chrysomela nigro-purpurea, thorace vtrimque luteo, puncto nigro.
Acta Vpsal. 1736. p. 17. No. 5. *Chrysomela* violaceo-nigra, collari margine rubro.
Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 839. No. 3. der *Weidenmayenkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 52. f. 11. 12.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 879.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 302. No. 13. *Chrysomele à corcelet bordé.*
Chrysomela ovata violacea, seu viridi-aenea nitida, thorace marginibus rubro, puncto nigro.

38. *Sanguinolenta*, das *Bluthähnchen.*
Müller l. c. p. 176. t. 4. f. 7. No. 38.
Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 144.
Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 40.

Scop.

*) Das andere Geschlecht. S. unter den *neuen* No. 48. *Similis.*

Scop. Ent. carn. No. 203. *Buprestis* sanguinolenta.
Geoffr. Inf. Tom. 1. p. 259. No. 8. t. 4. f. 7. La *Chrysomele noire à bordure rouge.*

Nigro-coerulea, *elytris* atris punctatis, margine exteriore *rubro.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 298. No. 7. t. 8. f. 26. *Chrysomele noire à bordure rouge.*

Rubro-marginata, ovata supra nigra subtus violacea nitida, elytris scabris rubro marginatis.

Schaeff. Icon. t. 21. f. 15.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 883.
— — Faun. Fridr. p. 8. No. 72.

39. *Marginata*, der *Saumflügel.**)

Müller l. c. p. 176. No. 39.
Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 8. No. 145. der *Gesäumte.*
Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 10. der *Saumflügel.*
Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft. 3. B. S. 350.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 886.
— — Faun. Fridr. p. 18. No. 182. *Buprestis* marginata.
Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 41.
Schaeff. Icon. t. 21. f. 19.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 303. No. 14. *Chrysomele à etuis bordés.*

Ovata, supra viridi-aenea, obscura nitida, subtus nigra, elytris margine *luteo-rubris.*

40. *Marginella*, der *Gelbrand.***)

Müller l. c. p. 177. No. 40.

Schriften

*) Im *Linné* bey *Faun. Suec.* 529. ist ein Druckfehler, muss heissen 530.

**) *Nirgends abgebildet.*

Schriften der Dronth. und Norw. Gesellsch. 3. B. S. 351.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 841. No. 1. der *schwarz-kupferfarbigte Mayenkäfer mit einem gelben Rand an den Flügeldecken.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 902.

Raj. Inf. 99. *Scarabaeus* antennis clavatis tertius.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 437.

Chrysomela supra nigro-aenea, margine coleoptrorum luteo.

— — — ed. 2. No. 531.*)

Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 42.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 304. No. 15. *Chrysomele à bordure jaune de la Renoncule.*

Marginella Ranunculi, oblongo-ovata, viridi-aenea, obscura nitida, thorace elytrisque *margine* luteis.

41. *Castanea*, der *surinamische Braunrand.***)

Müller l. c. p. 177. No. 41.

Linn. Amoen. acad. Vol. 6. p. 394. No. 15.

42. *Analis*, der *Rothafter.*†)

Müller l. c. p. 177. No. 42.

Fabric. S. E. p. 104. *Chrysom.* 58.

43. *Coccinea*, der *Rothrücken.*††)

Müller l. c. p. 177. No. 43.

Fabric. S. E. p. 105. *Chrysom.* 59.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 301. No. 10. t. 9. f. 1. *Chrysomele rouge à quatre taches noires.*

4-macu-

*) Im *Linné* stehet durch einen Druckfehler 331.

**) *Nirgends abgebildet.* †) *Nirgends abgebildet.*

††) Vielleicht nur eine Verschiedenheit von No. 38. *Sanguinolenta.*

4-maculata, ovata, thorace quadrato rufo macula nigra, elytris rubris maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris.

44. *Philadelphica*, der *grüne philadelphische Blattkäfer mit gelben grüngefleckten Flügeldecken.*

Müller l. c. p. 178. No. 44.
Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 49.
Ovata, viridis, elytris flavis, viridi-maculatis, antennis pedibusque ferrugineis.
Petiv. Gazophyl. t. 26. f. 11.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 353. No. 6. t. 16. f. 13. *Chrysomele de Philadelphie.*
Ovata, viridi-aenea obscura, *elytris* flavis, *punctis* virescenti-aeneis oblongiusculis, *antennis* pedibusque rufis.

45. *3-maculata*, der *amerikanische dreygefleckte Blattkäfer.**)

Müller l. c. p. 178. No. 45. der *Gelbflügel.*
Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 6.
Cyanea, coleoptris flavis, fascia maculisque duabus nigris.

46. *Americana*, der *amerikanische Rothstrich.*

Müller l. c. p. 178. No. 46.
Sulzers Kennzeichen. S. 7. No. 7. t. 3. f. 16.**)
Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 34.

47. *Li-*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Die Verfälscher der Cochenille mischen von dieser die Flügel und Beine darunter.

47. *Lineola*, die *amerikanische Tintenlinie.**)

Müller l. c. p. 179. No. 47.
Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 45.

48. *Aestuans*, der *amerikanische Blattkäfer mit acht gelben Flecken.***)

Müller l. c. p. 179. No. 48. das *Sonnenhähnchen.*
de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 352. No. 5. t. 16. f. 12. *Chrysomele à huit taches rouges.*
8-guttata, ovata ferruginea, thorace lato, *elytris* singulis maculis quatuor magnis flavis.

49. *Sacra*, der *rothe Blattkäfer aus dem gelobten Lande, mit zwey schwarzen Punkten, auch einer schwarzen Nath auf den Flügeldecken.*†)

Müller l. c. p. 179. No. 49. der *Türk.*
Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 46.

50. *Minuta*, das *Zwerghähnchen.*

Müller l. c. p. 180. No. 50.
Fabric. S. E. p. 118. *Cistela* 13.
Nigra, elytris pedibusque griseis.
— — — p. 229. *Hydrophilus* 8.
Ovatus niger, elytris, pedibus, thoracisque lateribus griseis.
Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 85. No. 27. Le *Scarabé nageur.*
Scarabaeus totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Mülleri

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Als etwas besonders hat der *Ritter* dabey angemerkt, dass in jedem *Auge* drey der *Länge* nach gesetzte *schwarze Pupillen* durchscheinen.

†) *Nirgends abgebildet.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 660.
HYDROPHILVS *chrysomelinus*, niger, *thorace* vtrinque; pedibus; *elytris* striatis, lividis.

II. *Springhähnchen mit dicken Hinterbeinen, (Erdflöhe, Hüpfkäfer).*

Geoffr. Inf. I. p. 244-251. *Alticae, Sauteurs, mordelles.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. *Altica.*
Fabric. S. E. p. 112-116. *Altica.*
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 290. 343-348. *Altise; Scarabée-puce; Chrysomeles sauteuses:* schwed. *Loppmask.*
Neuer Schauplatz der Natur, 2. B. S. 665. *Erdflöhe.*

51. *Oleracea*, der *Gartenhüpfer.**)
Müller l. c. p. 180. No. 51. t. 4. f. 8.**)
Füesslins schweiz. Inf. S. 8. No. 146. der *Erdfloh.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 202. (eigentlich 204) No. 18. *Jordloppe, Erdfloh.*
Naturforscher 6. St. S. 69. *Erdflöhe.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 75.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 921. *Altica; Jord-Loppe.*
Fabric.

*) Dies sind die eigentlichen *Erdflöhe*, wie sie der gemeine Mann, und die Gärtner nennen, welche an den jungen Kohlpflanzen, und andern niedrigen Erdgewächsen so grosen Schaden thun.

**) Es ist unrichtig, wenn Herr *Müller* sagt: dies Exemplar nenne *Geoffroi* l'Altise *bedaude.* Dieses ist des *Geoffr.* Altica 3. schwarz, mit rothem Brustschilde, und kömmt gar nicht mit der Linneischen Beschreibung der Oleracea überein. *Fabric.* und von *Geer* haben richtig des *Geoffr.* Altica 1. l'Altise bleue angeführt, und dies ist es auch. S. 2te Kl. der *neuen* Chrysom. No. 7. *Bicolor.*

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 3.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 245. No. 1. L'*Altise bleue.**)
Altica viridi-coerulea.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 344. No. 49. *Chrysomele sauteuse potagére.*
Saltatoria ovata tota *viridi-coerulea*, antennis nigris.

52. *Bicolor*, der *amerikanische zweyfarbige Blattkäfer.*

Müller l. c. p. 181. No. 52. das *zweyfärbige Hähnchen.*
Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 1.
Rufa, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Gigas* in hoc genere.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 357. No. 12. t. 16. f. 20. *Chrysomele à deux couleurs.*
Saltatoria *rubra*, elytris coeruleis nitidissimis.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 919. *Altica.*

53. *Chrysocephala*, der *Goldkopf.***)
Müller l. c. p. 181. No. 53. das *Gelbköpfchen.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 76.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 920. *Altica.*
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 337. No. 41. *Chrysomele cylindrique à tête jaune.*
Cylindrica *coeruleo-nigra*, capite antice pedibusque quatuor anterioribus rufo-flavis.

54. *Hyo-*

*) *Geoffr.* hat dabey des *Ritters* Faun. Suec. ed. 1. No. 539. angeführt, die ich aber in der ed. 2. bey No. 540. Chrys. *Helxines* citirt finde. *Linné* aber hält diese Altise bleue mit seinem *Curculio Salicis* p. 611. No. 43. für einerley.
**) *Nirgends abgebildet.*

54. *Hyoscyami*, der *Bilsenfresser.**)

Müller l. c. p. 181. No. 54.

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 5.

Viridis, nitida, *pedibus* testaceis, femoribus posticis violaceis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 77.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 927. *Altica.*

Onomatol. hist. nat. P. 5. p. 247. No. 3.

Raj. Ins. pag. 98. No. 9. *Capricornus* exiguus saltatrix.

Acta Upsal. 1736. p. 18. No. 5. *Gyrinus* coeruleus nitidus.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 540. *Mortella* etc.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 248. *Altica* 11. L'*Altise du choux.*

Coerulea, elytris striatis, tibiis ferrugineis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 345. No. 51. *Chrysomele Jautense de la Jusquiame.*

Saltatoria ovata, viridi-coerulescente aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus posticis viridi-aeneis.

55. *Atricilla*, das *Schwarzköpfchen.***)

Müller l. c. p. 182. No. 55.

Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 11.

Nigra, *thorace elytrisque* cinereis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 251. *Altica.* 19. La *Paillette.*†)

Elytris pallide-flavis, *capite nigro.*

56. *Ery-*

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

†) Dieses Citatum hat der Herr von *Geer* bey einer neuen Art *Melanocephala* angeführt Tom. 5. p. 348. No. 57. S. die *neuen* 2te Kl. No. 16.

56. *Erythrocephala*, das *Rothköpfchen.**)

Müller l. c. p. 182. No. 56.
Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 8. N. *147.* der *Rothkopf.*
Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 10.
Atro-coerulea, capite geniculisque pedum rufis.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 246. No. 4. *L'Altiſe noire dorée.*
Nigro-aenea, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.

57. *Modeeri*, der *Gelbfuſs.***)

Müller l. c. p. 182. No. 57.
Füeſslins Verzeich. ſchweiz. Inſ. S. 8. No. 148. *Modeers-Blattkäfer.*

58. *Helxines*, das *Buchweizenhähnchen.*

Müller l. c. p. 182. No. 58.
Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 8. No. 149.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 539.†)
Mordella ſubrotunda atro-aenea.
— — — ed. 2. No. 540.
Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 8.
Viridi-aenea, antennis fuſcis, pedibus teſtaceis.
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 248. No. 3. *Mordella* etc.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 929. *Altica.*
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 249. *Altica* 14. Le *Plutus.*
Aurea, pedibus flavis.
de *Geer* Inſ. Tom. 5. pag. 345. No. 52. *Chryſomele ſauteuſe verte dorée.*
Viridi-aurata, ſaltatoria, ovata, nitidiſſima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis.

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nirgends abgebildet.*
†) Dieſes Citatum hat *Geoffr.* zu *Oleracia* No. 51. geſetzt.

59. *Exsoleta*, das *Ochsenzungenhähnchen.**)

Müller l. c. p. 182. No. 59.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 8. No. 150. der *Distelblattkäfer.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 535.

Mordella flava.

— — — ed. 2. No. 541.

Mülleri Zool. Dan. p. 85. No. 930. *Altica.*

Onomatol. hist. nat. P. 5. p. 246. No. 1. *Mordella* etc.

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 17.

Ferruginea, elytris striatis.**)

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 250. *Altica* 16. L'*Altise fauve à stries.*

Oblonga, ferruginea, elytris striatis.

— — — — *Altica* 18. *flava.* L'*Altise jaune.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 338. No. 42. *Chrysomele cylindrique jaune à ventre noir.*†)

Cylindrica flavo-testacea, abdomine nigro, elytris punctatis.

60. *Nitidula*, der *Glanzrücken.*

Müller l. c. p. 183. No. 60.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 8. No. 151.

Gleditsch

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Fabricius* hat hierbey *Geoffr.* Altica 16 und 18. angeführt, weil sie beyde ein Insekt bezeichnen, und nichts als eine Varietät zu seyn scheinen. Es muss aber bey dem *Fabric.* 18. statt 4. heissen.

†) Nach des Herrn von *Geer* Urtheil hat sie einen cylindrischen Körper, und ist die kleinste unter dieser Art von Chrysomelen. Sie kann auch nicht *springen*, und hat keine dicke Hinterfüsse. *Linné* hat sie also unrichtig in diese Klasse gesetzt.

Gleditsch. Einl. in die Forstwiss. 2. Th. S. 795. N. 36. der *goldfarbige Springkäfer mit blauen Flügeldecken und rothen Füssen.*

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 7.

Viridis, *nitens*, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis.

Schaeff. Icon. t. 87. f. 5.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 249. *Altica* 13. L'*Altise rubis.*

Nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 346. No. 54. *Chrysomele sauteuse à corcelet doré.*

Saltatoria ovata, elytris coeruleis seu viridibus, thorace aureo, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis nigris.

61. *Trifasciata*, der *weisslichte Blattkäfer mit drey braunen Strichen.**)

Müller l. c. p. 183. No. 61. der *Braunstrich.*

Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 9.

Supra albida, *fasciis tribus fuscis.*

62. *Nemorum*, das *Waldhähnchen.*

Müller l. c. p. 183. No. 62.

Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 8. No. 152. der *Waldblattkäfer.***)

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 11. der *Gestreifte.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 543.

Mordella etc.

— — — ed. 2. No. 543.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) Was *Füeßlin* l. c. mit vide t. 3. f. 10. anzeigen will, kann ich nicht sagen.

List. mut. t. 31. f. 29.

Acta Upsal. 1736. pag. 18. No. 6. *Gyrinus* niger, vtrinque albus.

Müllerі Faun. Fridr. p. 8. No. 78.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 922. *Altica.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 247. No. 1.

Mordella oblonga etc.

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 20.

Atra, elytris flavis, margine omni nigro.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 247. *Altica* 9. L'*Altise à bandes jaunes.*

Atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 347. No. 55. *Chrysomele sauteuse à bandes jaunes.*

Fasciata saltatoria ovata nigra nitida, elytris fascia flava longitudinali.

63. *Rustica*, das *Baurenhähnchen.**)

Müller l. c. p. 183. No. 63.

64. *Pulicaria*, das *Flohhähnchen.***)

Müller l. c. p. 184. No. 64.

65. *Rufipes*, der *Rothfuss.*

Müller l. c. p. 184. No. 65.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 153.

Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 14.

Coerulea, capite, thorace, pedibus, antennarumque basi rufis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 8. No. 79.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 931. *Altica.*

Scop.

*) *Nirgends abgebildet.*

**) *Nirgends abgebildet.*

Scop. Entom. carn. No. 214. *)
Schaeff. Icon. t. 166. f. 5. a. b.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 245. *Altica* 2. L'*Altise de la mauve.*
Nigra, elytris coeruleis, thorace pedibusque rubris.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 343. No. 47. t. 10. f. 11. *Chrysomele sauteuse à pattes rousses.*
Saltatoria ovata coerulea, capite, thorace pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque, elytris laevibus.

66. *Fuscicornis*, das *Braunhorn.* **)
Müller l. c. p. 184. No. 66.

67. *Holsatica*, der *Holsteinische an den Spitzen der Flügeldecken roth punktirte Blattkäfer.* †)
Müller l. c. p. 184. No. 67. der *Holsteiner.*
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 795. No. 35. der *schwarze glänzende Springkäfer mit rothen Flügeldeckenspitzen.*
Füesslins Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 154. der *Rothpunkt.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 544. *Mordella* nigra, elytris apice rubris.
— — — ed. 2. No. 544.
Acta Upsal. 1736. No. 8. *Gyrinus* niger nitidus, elytrorum apice rubro.
Onomatol. hist. nat. P. 5. p. 246. No. 5. *Mordella* nigra etc.
Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 18.
Nigra nitida, elytris apice puncto rubro.

*) Bey des Scop. Citato im *Linné* ein Druckfehler: 212 statt 214.
**) *Nirgends abgebildet.*
†) *Nirgends abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 250. *Altica* 15. L'*Altise à points rouges.**)

Nigra, coleoptris punctis quatuor rubris.

68. *Haemisphaerica*, der *halbkuglichte Blattkäfer.***)

Müller l. c. p. 185. No. 68. die *Halbkugel.*

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 22.

Suborbiculata, depressa, nigra.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 348. No. 56. *Chrysomele sauteuse brune.*

Chrysomela saltatoria subglobosa obscure fusca nitida.

69. *Surinamensis*, der *gelbliche Surinamische Blattkäfer mit rothgesäumten Flügeldecken.*

Müller l. c. p. 185. No. 69. der *Surinamer.*

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 23.

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 355. No. 10. t. 16. f. 17. *Chrysomele sauteuse de Surinam.*

Saltatoria, thorace rubro pallido, elytris rufis, fascia transversali coccinea, antennis pedibusque griseis.

70. *S. Litera*, der *blafsfarbige auf den Flügeldecken gleichsam mit einem lateinischen S. bezeichnete Blattkäfer.*

Müller l. c. p. 185. No. 70. das *lateinische S.*

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 24.

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 357. No. 13. t. 16. f. 21. *Chrysomele à la lettre S.*

Saltatoria griseo-flava, elytris fuscis; fascia longitudinali flexuosa albida.

71. *Aequi-*

*) Vielleicht eine blofse *Varietät* der Linnéischen.

**) *Nirgends abgebildet.*

71. *Aequinoctialis*, der *Violetflügel.*

Müller l. c. p. 185. No. 71.

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 3.

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 356. No. 11. t. 16. f. 19. *Chrysomele équinoctiale.*

Saltatoria, thorace carneo, elytris violaceis nitidis, singulo maculis quatuor albis.

III. *Mit cylindrisch-rundem Körper.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 195-197. *Melolontha.* pag. 231-237. *Cryptocephalus, Gribouri.*

Fabric. S. E. p. 105-112. *Cryptocephalus.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 329-338. *Chrysomeles à corps cylindrique et à tête enfoncée dans le corcelet bossü.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. *Cryptocephalus*, 57. *Melolontha.*

72. *Cyanea*, der *amerikanische Bläuling.*

Müller l. c. p. 186. No. 72. der *Bläuling.*

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 12. der *Bläuling.*

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 20.

Cyaneus, thorace pedibusque rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 197. *Melol.* 4. *La melolonte bleuette.*

Coerulea, thorace pedibusque ferrugineis.

73. *Tridentata*, der *dreyzähnige Blattkäfer auf den Hundskirschen.*

Müller l. c. p. 186. No. 73. der *Dreyzahn.*

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 940. No. 6. der *walzenförmige blaue Blattsauger.*

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoc.* 5.

Coeruleus, elytris testaceis.

Schaeff. Icon. t. 77. f. 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 196. *Melol.* 3. La *Melolonte liſette.*

Nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 333. No. 36. t. 10. f. 10. *Chryſomele bleue verdâtre à etuis jaunes.*

Cylindrica viridi-coerulea nitida, elytris teſtaceis, thorace angulato gibbo.

74. *Gorteriae, Gorters Blattkäfer vom Vorgebürge der guten Hoffnung.**)

Müller l. c. p. 186. No. 74. der *Schwärzling.*

Fabric. S. E. p. 107. *Cryptoc.* 7.

75. *Aurita,* der *gelböhrichte Blattkäfer.***)

Müller l. c. p. 187. No. 75. das *Gelbohr.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 9. No. 155.

Fabric. S. E. p. 107. *Cryptoc.* 8.

Ater, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flavis.

76. *4-punctata,* der *vierfache Schwarzpunkt.*†)

Müller l. c. pag. 187. No. 76. der *Schwarzpunkt.* (t. 4. f. 9.)

Füeſslins Verzeich. ſchweiz. Inſ. S. 9. No. 156. der *Vierpunkt.*

Schriften der Dronth. und Norweg. Geſellſchaft. 4. Th. S. 270.

Scop. Entom. carn. No. 206. *Bupreſtis* quadripunctata.

Onomatol. hiſt. nat. P. 2. p. 840 No. 1. der *ablange ſchwarze Mayenkäfer mit rothen Flüzeldecken, und vier ſchwarzen Flecken.*

Müllerі

*) *Nirgends abgebildet.* **) *Nirgends abgebildet.*

†) Einer der *größten* Blattkäfer.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. pag. 57. No. 510. *Melolontha.*

Schaeff. Elem. t. 83. f. 1. *Melolontha*, *Sägenblattkäfer.*

— — Icon. t. 6. f. 1. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoc.* 2.

Niger, elytris rubris, *punctis duobus nigris*, antennis brevibus *serratis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 195. *Melol.* 1. t. 3. f. 4. La *Melolonte quadrille à corcelet noir.*

Coleoptris rubris, *maculis quatuor nigris*, thorace nigro.

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 329. No. 32. t. 10. f. 7. *Chrysomele cylindrique à 4 points noirs.*

Cylindrica 4-punctata, thorace nigro, elytris rubris, maculis duabus nigris, antennis *serratis.*

77. *4-maculata*, der *gelbliche Blattkäfer mit vier blauen Flecken.*

Müller l. c. p. 188. No. 77. der *Blaufleck.*

Füeßlins Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 157. der *Vierfleck.*

Schaeff. Icon. t. 6. f. 6. 7.

Pontopp. N. G. v. D. S. 204. No. 29. t. 16.

Fabric. S. E. p. 107. *Cryptoc.* 10.

Mülleri Zool. Dan. p. 83. No. 912. *Luperus.*

Pontopp. Atl. Dan. I. t. 29.

78. *2-punctata*, das *Langhorn.**)

Müller l. c. p. 188. No. 78.

Füeßlins Verzeich. schweiz. Inf. S. 9. No. 158. der *Zweypunkt.*

Mülleri

*) Eine *Nebenart* statt der Punkte mit *länglichten Flecken.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 9. No. 80.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 524. *Cryptoc.*
Petiv. Gazoph. t. 31. f. 4.
Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoc.* 12.
Niger, nitidus, elytris rubris, *punctis duobus nigris*, antennis longitudine corporis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 234. *Cryptoc.* 6. t. 4. f. 3. Le *Gribouri rouge strié à points noirs.*
Niger, elytris rubris striatis, *maculis quatuor* limboque nigris.
de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 332. No. 35. *Chrysomele cylindrique à deux grandes taches noires.*
Cylindrica, thorace nigro nitidissimo, elytris rubris, *maculis duabus* margineque nigris.

79. *8-guttata*, der *Blattkäfer mit acht gelben Tropfen.**)

Müller l. c. p. 188. No. 79. der *Spanier.*

80. *4-pustulata*, der *schwarze Blattkäfer mit vier rothen blatterförmigen Flecken.***)

Müller l. c. p. 189. No. 80. die *Rothblatter.*
Fabric. S. E. p. 111. *Cryptoc.* 28.

81. *Scopoliana*, *Skopolis Blattkäfer.*†)

Müller l. c. p. 189. No. 81. das *Bänderhähnchen.*
Fabric. S. E. p. 111. *Cryptoc.* 30.
Niger, thorace rufo, elytris rufis, *fasciis duabus cyaneis.*

82. *Moraei*, *Moräi Blattkäfer.*

Müller l. c. p. 189. No. 82. der *Randfleck.*

Füess-

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 159. *Moräi Blattkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 202. *Buprestis* Moraei.

Gadd. diss. 28. *Cassida* nigra etc.

Schaeff. Icon. t. 30. f. 5.

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoc.* 25.

Ater, elytris *maculis duabus flavis marginalibus.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 234. *Cryptoc.* 5. Le *Gribouri à deux taches jaunes.*

Niger, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe *macula duplici flava.*

83. *Bilineata*, der *kleine schwarze Blattkäfer mit zwo gelben Linien.**)

Müller l. c. p. 190. No. 83. das *Lilienhähnchen.*

Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft. 4. Th. S. 270.

84. *Nitens*, der *blauglänzende Blattkäfer.***)

Müller l. c. p. 190. No. 84. das *Glanzhähnchen.*†)

Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 160.

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoc.* 22.

Viridis, nitens, ore pedibusque testaceis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 334. No. 38. *Chrysomele cylindrique bleue à pattes jaunes.*

Cylindrica *coeruleo-violacea*, seu viridi-aurata nitida, capite antice pedibusque flavis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 522. *Cryptoc.*

85. *Bar-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

†) Herr *Müller* sagt zwar mit dem Ritter: es sey des *Geoffr. Melolonte* bleuette Tom. I. p. 197. No. 4. Da aber dieses Citatum vom *Fabric.* zu Chrys. cyanea No. 72. gesetzt ist, auch von *Geer* bey der gegenwärtigen den *Geoffr.* nicht angeführt hat; so zweifle ich, ob es die la bleuette sey.

85. *Barbareae*, der *Hederichfresser.**)

Müller l. c. p. 190. No. 85. der *Senffresser.*

86. *Sericea*, das *Seidenhähnchen.***)

Müller l. c. p. 190. No. 86.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 757. No. 87. der *walzenförmige ins seidenhafte spielende Weidenblattkäfer.*

Füesslins Verz. schweiz. Ins. p. 9. No. 161.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 845. No. 1. der *grüne glänzende Weidenmayenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 21.

Viridi-coeruleus, antennis nigris.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 518. *Cryptoc.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 233. *Cryptoc.* 3. Le *Velours vert.*

Viridi-auratus *fericeus.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 334. No. 37. *Chrysomele cylindrique verte dorée.*

Cylindrica *viridi-aurata*, thorace gibbo, antennis longis nigris, elytris scabris dehiscentibus.

87. *Labiata*, der *Blattkäfer mit der gelben Lippe.*†)

Müller l. c. p. 191. No. 87. das *Lippenhähnchen.*

Fabric. S. E. p. 112. *Cryptoc.* 33.

Ater, *nitidus*, ore pedibus basique antennarum lutescentibus.

88. *Coryli*, das *Haselhähnchen.*††)

Müller l. c. p. 191. No. 88.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 162. der *Haselblattkäfer.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 16.
Niger, thorace elytrisque testaceis, immaculatis.
Müllери Zool. Dan. p. 58. No. 523. *Cryptoc.*

89. *Pini*, der *Fichtenblattkäfer.**)
Müller l. c. p. 191. No. 89. der *Fichtensauger.*
Fabric. S. E. p. 112. *Cryptoc.* 32.
Testaceus, elytris pallidis, antennis fuscis.

90. *Bothnica*, der *westbothnische Blattkäfer mit rothgerändeltem Brustschild.***)
Müller l. c. p. 192. No. 90. der *Bothnier.*
Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoc.* 14.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 335. No. 39. *Chrysomele cylindrique noire à pattes jaunes.*
Cylindrica nigra, pedibus testaceis, thorace linea longitudinali capiteque macula irregulari flavis.

91. *Cordigera*, der *Herzträger.*
Müller l. c. p. 192. No. 91.
Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoc.* 13.
Thorace variegato, elytris rubris, punctis duobus nigris.
Schaeff. Icon. t. 30. f. 1.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 235. *Cryptoc.* 7. Le *gribouri rouge sans stries à points noirs.*
Niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 330. No. 33. *Chrysomele cylindrique à corcelet tachété.*
Cylindrica, thorace nigro maculis flavis, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis filiformibus flavis nigrisque.

92. *6-pun-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

92. *6-punctata*, der *sechspunktirte Blattkäfer.*

Müller l. c. p. 192. No. 92. der *Gelenkpunkt.*

Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 163. der *Sechspunkt.*

Sulzers Kennz. t. 3. f. 18. der *schwarz dupfirte rothe Blattkäfer.*

Schaeff. Icon. t. 30. f. 1. 3.

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoc.* 18.

Scop. Entom. carn. No. 208. *Bupreſtis* sexpunctata.

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 331. No. 34. t. 10. f. 9. *Chrysomele cylindrique à 6 taches noires.*

Cylindrica rubra, elytris maculis tribus nigris, thorace maculis magnis binis nigris rubro cinctis.

Müllerі Zool. Dan. p. 58. No. 521. *Cryptoc.*

93. *10-maculata*, der *Zehnfleck.*

Müller l. c. p. 192. No. 93. der *Schwarzschild.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 560.*)

Chrysom. *decem punctata* cylindrica, thorace variegato, elytris flavis, punctis quinque nigris.

Schaeff. Icon. t. 86. f. 7.

94. *14-punctata*, der *Vierzehnpunkt.***)

Müller l. c. p. 193. No. 94. die *Rothbrust.*

95. *Longimana*, der *Langfuss.*†

Müller l. c. p. 193. No. 95.

Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 164. der *Langarm.*

Fabric. S. E. p. 107. *Cryptoc.* 11.

Obscure aeneus, elytris testaceis.

96. Ob-

*) In *Linné* ein Druckfehler 561 statt 560.

**) *Nicht abgebildet.* †) *Nicht abgebildet.*

96. *Obscura*, der *dunkelschwarze Blattkäfer.**)

Müller l. c. p. 193. No. 96. der *Hökerflügel.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 81.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 525. *Cryptoc.*

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 48.

Ovata, nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 336. No. 40. *Chrysomele noire quarrée.*

Nigro-quadrata, subcylindrica nigra, abdomine subquadrato, thorace globoso, antennis longis.

IV. *Mit länglichem Körper und schmalem Bruststück.*

Fabric. S. E. p. 118-122. *Crioceris.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 237-243. *Crioceris.* p. 251-255. *Galerupe.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 338-342. *Chrysomeles à corps allongé, et à corcelet étroit presque cylindrique.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. *Crioceris.* p. 83. *Luperus.*

97. *Merdigera*, das *Lilienhähnchen.*

Müller l. c. p. 194. No. 97.

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 195. der *Lilienblattkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 34. t. 3. f. 14. der *Lilienkäfer.*

Blankart Schauplatz der Raupen etc. Uebers. durch Rodochs. 8. Leipz. 1690. p. 70. 29. Hauptst. *von dem Lilienwurm* und seinen Veränderungen. t. XI. f. G. H. I.

Onoma-

*) *Nicht abgebildet.*

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 840. No. 4. der *rothe Mayenkäfer mit einer runden und auf beyden Seiten eingebogenen Brust.*

Scop. Entom. carn. No. 112. *Altelabus* Lilii.

I. Bauch hist. plant. 2. p. 696. *insecta rubella.*

Muralto Anatom. *Scarab. liliacei* v. Misc. N. C. Ann. 1682. p. 156.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 82.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 935. *Crioceris.*

Schaeff. Elem. t. 52. f. 1. *Crioceris, Lilienkäfer.*

— — Icon. t. 4. f. 4.

Reaum. Mém. des Ins. Tom. III. P. I. Mém. 7. p. 282. t. 17. f. 1. 2. *Scarabé des Lis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 239. *Crioceris* 1. Le *Crioicere rouge du Lys.*

Crioceris rubra.

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 338. No. 43. *Chrysomele rouge du Lis.*

Rubra Liliorum, thorace tereti, capite antennis pedibus abdomineque subtus nigris.

98. *Stercoraria*, das *Runzelhähnchen.**)

Müller l. c. p. 195. No. 98.

99. *Nymphaeae*, der *Seeblumenblattkäfer.*

Müller l. c. p. 195. No. 99. der *Faulenzer.*

Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 166. der *Faulenzer.*

Onoma-

*) *Nicht abgebildet.*

Beyde führen eigentlich davon den Namen, weil der Wurm seinen eigenen Koth mit sich herumführt. *Reaum.* Tom. 3. t. 17. f. 4.

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 836. No. 7. der *braune Mayenkäfer mit einem blafsgelben Rande an den Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 118. *Crioceris* 1.

Fusca, elytris margine prominulo flavescente.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 254. *Galeruque* 4. La *Galeruque aquatique.*

Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris vnicoloribus pallidis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 907. *Galeruca.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 326. No. 31. t. 20. f. 1. 2. *Chrysomele brune du Nénufar.*

Ovata nigro-fusca, thorace angusto maculis duabus nigris, elytris margine flavis, antennis fuscis.

100. *Capreae*, das *bockförmige Weidenhähnchen.**)

Müller l. c. p. 196. No. 100. das *Bockhähnchen.*

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 757. No. 88. der *schmale graue Werftblattkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 48. No. 1. *Altelabus* subrotundus griseus, der *schwarze Lilienmayenkäfer.*

— — — — p. 838. No. 2.

Chrysomela nigra etc.

Acta Vpsal. 1736. pag. 19. No. 6. *Altelabus* subrotundus griseus.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 909. *Galeruca.*

Fabric. S. E. p. 118. *Crioceris* 2.

Thorace nigro-maculato, elytrisque griseis, antennis nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 254. *Galeruque* 5. La *Galeruque grisette.*

Nigra, thorace elytrisque luteo-lividis.

 de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.* Im *Linné* ein Druckfehler Cupraea, statt *Caprene.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 325. No. 30. *Chrysomele grise de l'Aune.*

Chr. *(grisea Alni)* ovata grisea opaca, thorace angusto puncto nigro, elytris pallide flavo marginatis, basi puncto nigro, antennis variegatis.

101. *Calmariensis*, der *rostfarbige Blattkäfer am Colmarsund in Schweden.**)

Müller l. c. p. 196. No. 101. der *Schwede.*

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 4.

Ovata cinerea, elytris vitta lineolaque baseos nigris.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 253. *Galeruque* 3. La *Galeruque à bandes de l'orme.*

Pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris.

102. *Tenella*, ein *zartes gelbliches Blattkäferchen.***)

Müller l. c. p. 196. No. 102. der *Zärtling.*

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 6.

Ferruginea, elytris margine thoraceque flavis.

103. *4-maculata*, der *Weitfleck.*†)

Müller l. c. p. 197. No. 103.

Schaeff. Icon. t. 36. f. 14.

104. *Cyanella*, der *blaugrünliche Blattkäfer.*††)

Müller l. c. p. 197. No. 104. die *Blaunase.*

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 16.

Coerulea, thorace cylindrico, lateribus gibbis.

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

†) Zum Unterschiede von No. 77.

††) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 243. *Crioceris* 5. Le *Criocère tout bleu.*

Tota *coeruleo-viridis.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. pag. 340. No. 44. *Chrysomele bleue à corcelet etroit.*

Coeruleo-violacea, thorace tereti, lateribus gibbis.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 934. *Crioceris.*

105. *Melanopa*, der *Schwarzfuſs.*

Müller l. c. p. 197. No. 105.

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inf. S. 9. No. 167.

Müllerі Faun. Fridr. p. 9. No. 87.

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 17.

Oblonga coerulea, thorace pedibusque rufis.

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 342. No. 46. *Chrysomele bleue à corcelet etroit rouge.**)

Oblonga, viridi-coerulea nitida, thorace tereti, pedibusque flavo-rufis.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 936. *Crioc.*

106. *Flavipes*, der *Gelbſchenkel.***)

Müller l. c. p. 197. No. 106.

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inf. S. 9. 168.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 939. *Crioc.*

107. *Tomentoſa*, der *amerikaniſche blaue Blattkäfer mit ſchwarzen wolligen Flügeldecken.*†)

Müller l. c. p. 198. No. 107. der *Staubſchild.*

Fabric. S. E. p. 122. *Crioceris* 22.

Oblonga,

*) Hierbey hat der Herr von *Geer* eben das Citatum des *Geoffroi* angeführt, welches *Linné* zu No. 24. Chryſ. *Polygoni* geſetzt hat: Tom. I. p. 242. No. 4. Le *Criocere bleu à corcelet rouge.*

**) *Nicht abgebildet.* †) *Nicht abgebildet.*

Oblonga, thorace pallido, punctis tribus nigris, elytris nigris vittis duabus albis.

108. *Punctatissima*, der *surinamische kupfergrüne, ganz punktirte Blattkäfer.**)

Müller l. c. p. 198. No. 108. das *Griesshähnchen.*

109. *8-punctata*, der *surinamische Blattkäfer mit vier gelben Punkten auf den schwarzen Flügeldecken.***)

Müller l. c. p. 198. No. 109. der *Ausländer.*

110. *12-punctata*, der *rothe Blattkäfer mit zwölf Punkten.*

Müller l. c. p. 199. No. 110. der *Inländer.*

Füesslins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 9. No. 169. der *Zwölfpunkt.*

Frisch Ins. 13. Th. S. 29. t. 28. die *Spargelraupe und deren Käfer.*

Scopol. Entom. carn. No. 115. *Altelabus* 12-punctatus.

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris* 11.

Thorace cylindrico, rubra, elytris *punctis sex nigris.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 932. *Crioceris.*

— — Faun. Fridr. p. 9. No. 85.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 240. *Crioceris* 2. t. 4. f. 5.

Le *Criocere rouge à points noirs.*

Rubra, punctis tredecim nigris.

Schaeff. Icon. t. 4. f. 5.

111. *Phellandrii*, der *Schierlingfresser.*

Müller l. c. p. 199. No. 111.

Füessl.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Füesslins Verz. schweiz. Ins. S. 9. No. 170.
Schriften der Dronth. und Norweg. Gesellschaft. 4. Th. S. 271.
Müllerі Faun. Fridr. p. 9. No. 86.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 900.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 838. No. 2. der *schwarze kupferglänzende Mayenkäfer mit gelben Linien auf den Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 122. *Crioceris* 20.
Oblonga, nigra, thorace elytrisque lineis duabus flavis.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 266. *Chrys.* 20. La *Chrysomele à bandes jaunes.*
Oblonga nigra, elytrorum *lineis duabus* longitudinalibus luteis.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 324. No. 28. t. 9. f. 34. *Chrysomele de la Philandrie.*
Oblonga nigro-aenea obscura nitida, thorace marginibus flavis, elytris fasciis duabus longitudinalibus flavis.

112. *Asparagi*, das *Spargelhähnchen.*
Müller l. c. p. 199. No. 112. t. 4. f. 10.
Füesslins Verzeich. schweiz. Ins. S. 9. No. 171. der *Spargelblattkäfer.*
Frisch Ins. I. S. 27. t. 6. der *Kreuzkäfer.*
Neue berlin. Mannigf. 3. Jahrg. S. 100.
Rösels Insektenbel. 2. B. Erdk. 3. Kl. S. 11. t. 4. das *buntgefleckte Spargelkäferlein.*
Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 842. No. 3. der *Mayenkäfer mit rother runder Brust, und gelben Flügeldecken mit einem schwarzen Kreuz: der Spargenmayenkäfer.*
Müllerі Faun. Fridr. p. 9. No. 83.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 933. *Crioceris.*
Scop. Entom. carn. No. 113. *Altelabus* Asparagi. *Fabric.*

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 19.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 241. *Crioceris* 3. Le *Crioceere porte-croix de l'asperge.*

Thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, *cruce coeruleo-nigra.*

Schaeff. Icon. t. 52. f. 9. 10.

113. *Campestris*, das *Feldhähnchen.**)

Müller l. c. p. 200. No. 113.

V. *Langgedehnte Goldhähnchen.*

114. *Sulphurea*, das *Schwefelhähnchen.***)

Müller l. c. p. 200. No. 114.

Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 5.

Flava, elytris *sulphureis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 351. *Tenebrio* 11. lutea. Le *Tenebrion jaune.*

Mülleri Zool. Dan. p. 83. No. 904.

115. *Cervina*, das *Hirschhähnchen.*

Müller l. c. p. 200. No. 115.

Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 1. †)

Livida, pedibus fuscis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 116. t. 1. f. 8. *Cistela* 1. La *Cistele satinée.*

Subvillosa virideſcens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis.

116. *Ca-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

†) Bey dieser Cervina hat *Fabric.* des *Geoffroi* Cist. satinée frageweise angeführt, die ich unter den neuen Cistelis aufgestellt habe: No. 2. fasciata.

116. *Caraboïdes*, der *erdkäferförmige Blattkäfer.**)

Müller l. c. p. 201. No. 116. das *Käferhähnchen.*

117. *Ceramboïdes*, der *Blattkäfer mit bockförmigen Fühlhörnern.***)

Müller l. c. p. 201. No. 117. das *Bockhorn.*
Fabric. S. E. p. 116. *Cistela* 3.
Atra, elytris striatis, testaceis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 354. *Mordella* 3. La *Mordelle à etuis jaunes striés.*
Nigra, elytris fulvis striatis.

118. *Murina*, das *Mausehähnchen.*†)

Müller l. c. p. 201. No. 118.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 512. *Anaspis.*
Fabric. S. E. p. 117. *Cistela* 7.
Nigra, elytris pedibusque testaceis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 355. *Mordella* 4. La *Mordelle à etuis jaunes sans stries.*
Nigra, elytris fulvis laevibus.

119. *Hirta*, das *Rauhhähnchen.*

Müller l. c. p. 201. No. 119.
Füesslins Verz. schweiz. Inf. S. 9. No. 172. *haarichter Blattkäfer.*
Müllerі Faun. Fridr. p. 9. No. 88.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 937. *Crioc.*
Fabric. S. E. p. 125. *Lagria* 8.
Villosa, nigra, thorace tereti, elytris testaceis.
de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 44. *Tenebrio* 6. t. 2. f. 23. 24. *Tenebrion velu.*

*) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*

Alatus *villosus* niger, elytris *villosis* fulvis, thorace teretiusculo.

120. *Pubescens*, das *Wollenhähnchen.**)

Müller l. c. p. 201. No. 120.

Fabric. S. E. p. 125. *Lagria* 7.

Nigra, thorace marginato villoso, elytris glabris, testaceis.

121. *Inda*, der *indianische Stelzenläufer.***)

Müller l. c. p. 202. No. 121.

122. *Elongata*, der *Schmalrücken.*

Müller l. c. p. 202. No. 122.

Pontopp. Nat. Gesch. v. D. S. 204. t. 16.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 30. der *schmal- und langleibige schwarze Blattkäfer mit dem rothen zottigen Brustschild.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 938. *Crioceris.*

Unabgebildete Linnéische Chrysomelen.

1. No. 6. *Haemorrhoidalis* s. *Viminalis* N. 31.
2. No. 7. *Graminis.*
3. No. 14. *Padi.*
4. No. 15. *Minutissima.*
5. No. 16. *Armoraciae.*
6. No. 18. *Fastuosa.*
7. No. 19. *Speciosa.*
8. No. 20. *Halensis.*
9. No. 21. *Hypochaeridis.*
10. No. 22. *Vulgatissima.*
11. No. 23. *Vitellinae.*

12. No.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

12. No. 25. *Pallida.*
13. No. 28. *Lurida.*
14. No. 31. *Viminalis* s. No. 6.
15. No. 33. *Varioloſa.*
16. No. 35. *Vndulata.*
17. No. 40. *Marginella.*
18. No. 41. *Caſtanea.*
19. No. 42. *Analis.*
20. No. 45. *3-maculata.*
21. No. 47. *Lineola.*
22. No. 49. *Sacra.*
23. No. 53. *Chryſocephala.*
24. No. 54. *Hyoſciami.*
25. No. 55. *Atricilla.*
26. No. 56. *Erythrocephala.*
27. No. 57. *Modeeri.*
28. No. 59. *Exſoleta.*
29. No. 61. *Trifaſciata.*
30. No. 63. *Ruſtica.*
31. No. 64. *Pulicaria.*
32. No. 66. *Fuſcicornis.*
33. No. 67. *Holſatica.*
34. No. 68. *Haemiſphaerica.*
35. No. 74. *Gorteriae.*
36. No. 75. *Aurita.*
37. No. 79. *8-guttata.*
38. No. 80. *4-puſtulata.*
39. No. 81. *Scopolina.*
40. No. 83. *Bilineata.*
41. No. 84. *Nitens.*
42. No. 85. *Barbareae.*
43. No. 86. *Sericea.*
44. No. 87. *Labiata.*
45. No. 88. *Coryli.*
46. No. 89. *Pini.*

47. No. 90. *Bothnica.*
48. No. 94. *14-punctata.*
49. No. 95. *Longimana.*
50. No. 96. *Obscura.*
51. No. 98. *Stercoria.*
52. No. 100. *Capreae.*
53. No. 101. *Calmariensis.*
54. No. 102. *Tenella.*
55. No. 104. *Cyanella.*
56. No. 106. *Flavipes.*
57. No. 107. *Tomentosa.*
58. No. 108. *Punctatissima.*
59. No. 109. *8-punctata.*
60. No. 113. *Campestris.*
61. No. 114. *Sulphurea.*
62. No. 116. *Carabοides.*
63. No. 117. *Cerambοides.*
64. No. 118. *Murina.*
65. No. 120. *Pubescens.*
66. No. 121. *Inda.*

Neue Chrysomelenarten.

I. *Mit eyrundem Körper.*

1. *Bimaculata*, der *Zweyfleck.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 73.
Ovata testacea, elytris basi ferrugineis.

2. *Fridrichsdalensis*, der *Fridrichsdalische Blattkäfer mit blutrothen Flügeldecken.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 8. No. 74.
Ovata, *thorace* macula nigra; *elytris* sanguineis immaculatis, abdomine nigro.

Mülleri

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 885.

Ovata, nigra, supra sanguinea, *thorace* vnica; *elytris* octo maculis nigris, vel immaculatis.

Schaeff. Icon. t. 194. f. 4.

3. *Violacea*, der *Blauschild.**)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 259. *Chrys.* 6. La *Chrysomele bleue à corcelet violet.*

Coerulea, *thorace violaceo.*

4. *Atra*, der *ganz schwarze Blattkäfer mit rothen Flügeln.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 259. *Chrys.* 7. La *Chrysomele noire à ailes rouges.*

Tota nigra.

5. *10-striata*, der *galonirte Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 261. *Chrys.* 13. La *Chrysomele à galons.*

Viridis nitida, *striis decem cupreis*, punctorum duplici serie divisis.

6. *Ruficaudis*, der *Rothschwanz.*

de *Geer* Inf. Tom. 5. p. 305. No. 17. *Chrysomele bronzée à ventre bordé de rouge.*

Ovata, viridi-aenea, obscura, nitida, abdominis lateribus ano alarumque *margine rubris.*

7. *Viridula*, der *Grünling.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 520. B.

— — — ed. 1. No. 421.

Chryso-

*) Hiervon giebt es noch eine Varietät thorace *nigro-violaceo.*

Chrysomela viridis nitida, thorace antice aequali, elytris pone contiguis.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 844. No. 4. der *grüne glänzende Mayenkäfer mit einer vornen gleichen Brust, und hinten neben einander stehenden Flügeln.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 261. *Chrys.* 11. La *Chrysomele dorée.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 311. No. 19. *Chrysomele verte à corps noir.*

Ovato-oblonga viridis aurata nitida, thorace antice aequali, abdomine supra toto nigro.

Goedart Ins. Tom. I. t. 45.

8. *Coeruleo-violacea*, der *violetblaue Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 316. No. 22. *Chrysomele bleue violette ovale.*

Ovata, supra *coeruleo-violacea*, subtus *violaceo-viridis*, punctis excavatis sparsis, thorace amplo, antennis brevioribus nigris.

9. *Griseo-nitida*, der *graueglänzende Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 325. No. 29. t. 9. f. 35. *Chrysomele grise luisante à corcelet étroit.*

Oblonga, thorace teretiusculo, supra *griseo-fusca* nitida subtus nigra, capite nigro, antennis longis.

10. *Vndata*, der *surinamische gewässerte Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 350. No. 2. t. 16. f. 9. *Chrysomele ondée.*

Ovata nigra, elytris glabris, fasciis transversalibus *vndulatis*, maculisque rubris.

11. *Rubro-*

11. *Rubro-punctata*, der *surinamische Rothpunkt.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. pag. 350. No. 3. t. 16. f. 10. *Chrysomele à points rouges.*

Ovata, capite thoraceque viridi-aeneis obscuris, elytris nigris, *maculis plurimis rubris* punctisque excavatis.

12. *Obscura*, der *dunkelbraune surinamische Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 354. No. 8. t. 16. f. 15. *Chrysomele sombre.*

Ovata fusca depressa, thorace elytrisque griseofuscis, antennis nigris.

13. *Tenebricosa*, der *dunkelschwärzliche Blattkäfer.**)

Fabric. S. E. p. 94. *Chrysomela* 1.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 265. No. 19. La *Chrysomele à un seul étui.*

14. *Bicolor*, der *orientalische zweyfarbige Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 3.
Ovata, viridi-aenea, subtus violacea.

D. *Forskähl.*

15. *Bankii*, *Banks Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 4.
Ovata, supra aenea, subtus testacea.

Mus. D. *Banks.*

16. *Sutu-*

*) Dies ist nach dem *Geoffr.* des *Linnei Tenebrio caraboïdes* ed. 12. p. 677. No. 25. aber nach dem *Fabric.* No. 29. *laevigatus.*

16. *Suturalis*, die *amerikanische Kupfernath.*

Fabric. S. E. p. 95. *Chrysom.* 7.
Aenea, elytris flavis, *sutura* vittaque aeneis.

17. *Surinamensis*, der *surinamische Braunfuss.*

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 8.
Cyanea, glaberrima, antennis plantisque fuscis.
Mus. Dom. *Banks.*

18. *Cuprea*, das *deutsche Kupferhähnchen.*

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 10.
Ovata, capite thoraceque aeneis elytris *cupreis*, corpore atro.
D. de *Hottorf.*

19. *Semistriata*, der *brasilianische halbgestreifte Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 96. *Chrysom.* 12.
Ovata nigra, elytris flavis, fascia media nigra, antice posticeque nigro-striatis.

20. *Fervida*, der *muschelfarbige javanische Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 97. *Chrysom.* 15.
Ovata, testacea, elytris aeneis margine testaceo.

21. *Stolida*, der *amerikanische Scheckflügel.*

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 19.
Ovata, ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris *variegatis.*

22. *Nigricornis*, das *neuholländische Schwarzhorn.*

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 20.

Ovata,

Ovata, nigro-aenea, capite, thoracisque lateribus elytrorumque macula duplici, baseos ferrugineis.

Mus. Dom. *Banks.*

23. *Cyanipes*, der *neuholländische Blaufuss.*

Fabric. S. E. p. 98. *Chrysom.* 23.
Ovata, rufa, elytris punctis posticeque cyaneis.

Mus. Dom. *Banks.*

24. *Cyanicornis*, das *neuholländische Blauhorn.*

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 24.
Ovata, rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis.

Mus. Dom. *Banks.*

25. *Crassicornis*, das *neuholländische Dickhorn.*

Fabric. S. E. p. 99. *Chrysom.* 27.
Ovata, flavescens, elytris maculis duabus nigris.

Mus. Dom. *Banks.*

26. *18-guttata*, der *neuholländische Blattkäfer mit achtzehn Tropfen.*

Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 31.
Ovata, elytris fuscis, punctis octo pallidis, quibusdam connexis.

Mus. Dom. *Banks.*

27. *Festiva*, der *amerikanische Prachtblattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 100. *Chrysom.* 35.
Nigro-aenea, lineis tribus futuraque antica flavis.

Mus. *Brit.*

28. *Aurata*, der *pensylvanische Blattkäfer mit goldnen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 38.

Ovata, thorace rotundato cyaneo, *elytris aureis*, margine cyaneo.

Mus. *Brit.*

29. *Limbata*, der *englische Rothsaum.*

Fabric. S. E. p. 101. *Chrysom.* 39.

Ovata, atra, coleoptrorum *limbo* sanguineo.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 260. *Chrys.* 9. La *Chrysomele bleue à bordure rouge.*

Nigro-coerulea, elytris lucidis punctatis, margine exteriore et anteriore rubris.

30. *Hannoveriana*, die *hannoverische Roststreife.*

Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 43.

Ovata, cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque *ferrugineis.*

D. de *Hattorf.*

31. *Litura*, die *englische Schwarznath.*

Fabric. S. E. p. 102. *Chrysom.* 44.

Ovata, rufescens, elytris *sutura* lineaque longitudinali nigris.

32. *Adonidis*, das *Adonishähnchen.*

Pallas Reisen I. Th. App. No. 29. Ausz. I. pag. 11. No. 29. Magnit. *collaris* L. No. 37.

Müllers Supplem. B. S. 226. No. 129.

33. *Asiatica*, das *asiatische Hähnchen.*

Pallas Reisen I. Th. App. No. 30. Ausz. I. pag. 11. No. 30. Magnit. *Scarab. solstit.* L.

Müllers Supplem. B. S. 226. No. 30.

34. *Ascle-*

34. *Asclepiada*, das *Aeskulaphähnchen.*

Pallas Reisen II. Th. App. No. 69. Magnitud. Chr. *Polyg.* L. No. 24.

Müllers Supplem. B. S. 225. No. 127.

35. *Absinthii*, das *Wermuthhähnchen.*

Pallas Reisen II. Th. App. No. 70.

Aequat. Chr. *Tanaceti* No. 5.

Müllers Supplem. B. S. 225. No. 128.

36. *Sapphirica*, der *sapphirne Blattkäfer.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 19. No. 19.

Ovata, tota *Sapphirica*, nitida, ore oculisque rubris, antennis nigris.

37. *Hyperici*, der *Johanniskraut-Blattkäfer.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 20. No. 20.

Ovata, atro-coerulea, elytris nigro-aeneis, striato-punctatis, alis rubris.

38. *Rhoi*, der *amerikanische Sumach-Blattkäfer.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 21. No. 21.

Ovata, ferruginea, capite thorace et striis aliquot elytrorum pallidis.

39. *Lineato-punctata*, die *amerikanische Punktlinie.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 22. No. 22.

Ovata, thorace rufo, disco punctis nigris, elytris rufis, sutura, punctis *lineolisque* nigris.

40. *Olivacea*, der *englische olivenfarbige Blattkäfer.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 23. No. 23.

Ovata, nigra, capite, thorace, elytris pedibusque *olivaceis*, elytris stria longitudinali et sutura nigra.

41. *Frontalis*, die *amerikanische Roststirn.*

Forsteri Nov. sp. Ins. Cent. I. p. 24. No. 24.

Ovata, nigra, capite, antennarum basi, elytrorum margine, et pedibus *ferrugineis.*

42. *Viridi-coerulea*, der *alexandrinische grünblaulichte Blattkäfer.*

Forskähl descr. Animal. etc. p. 77. No. 2.

Ovata, elytris striis quinque.

43. *Sisymbrii*, der *russische Wellsaamenblattkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 10. t. 4. f. 16. ein unbeschriebener *Sonnenkäfer*, zum Geschlecht der *Blattkäfer* auf dem Wellsaamen.

Chrysomela atro capite, marginibus thoracis atque elytrorum vndique sanguineis.

Berlin. Samml. 8. B. p. 580. f. 9.

44. *Polygoni frutescentis*, der *russische Blattkäfer auf dem stautigten Wegetritt.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 311. t. 20. f. 3.

Corpore atro, thorace atque elytris rubicundis, incisuris abdominalibus albis.

45. *4-punctata*, der *Blattkäfer mit vier Punkten.*

Lepechins Tageb. II. Th. S. 208. t. 11. f. 20.

Ovata, thorace nigro, rubro-marginato, elytris sanguineis, *maculis 4 nigris.*

46. *Cyaneo-fasciata*, der *blaubandirte russische Blattkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 29. t. 4. f. 7.

Thorace et elytris rubris, capite *fasciisque* duabus elytrorum coeruleis.

47. *Ob-*

47. *Obscuro-viridis*, der *russische dunkelgrüne Blattkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 312. t. 20. f. 6.
Corpore viridi, thorace atque elytris marginatis.

48. *Similis*, der *schwarzblauliche Blattkäfer.**)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 880.
Ovata, nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque basi rubris.

49. *Oricalcia*, der *messingfarbige Blattkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 889.
Nigra, supra *aenea*, elytris punctis striatis.

50. *Grossa*, der *schwarze dicke Blattkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 81. No. 875.
Ovata, atra, subtus violacea, tarsis spongiosis, subtus fuscis.
Schaeff. Icon. t. 126. f. 1.

51. *Affinis*, der *Rothafter.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 890.
Ovata, violacea, elytris punctato-striatis, ano *rubro.*

52. *Obtusa*, der *abgestumpfte Blattkäfer.***)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 895.
Ovata, violacea, thorace pedibusque rufis.

*) Vielleicht das zweyte Geschlecht von C. *Collaris* L. No. 37.
**) Vielleicht nur das andere Geschlecht von Linn. No. 24. *Polygoni.*

53. *Thoracica*, der *breitgeschilderte Blattkäfer.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 82. No. 898.
Ovata, violacea, *thoracis* margine laterali *dilatato*, elytris punctato-striatis.

54. *Bilineata*, die *Zweylinie.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 904.
Viridi-aurea, thorace antice excavato; elytrorum *linea duplici* coerulea.
Act. Nidr. IV. p. 8. t. 16. f. 5.

55. *Serotina*, der *späte Blattkäfer.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 905.
Ovata, nitida, rufa, oculis nigris, tibiis posticis arcuatis.

56. *Menthae*, *Wassermünzblattkäfer.*
P. *Schrank* Beytr. zur N. G. S. 63. §. 5.
Ovata, nigro-aenea, nitida.

57. *Pruni*, *Elexenblattkäfer.*
P. *Schrank* Beytr. zur N. G. S. 63. §. 6.
Ovata, nigra; capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis.

II. *Springhähnchen.*

1. *Iuliana*, des *Herrn Julians neuentdeckter Blattkäfer der Cocosbäume.*
Beckmanns physik. oekon. Bibl. 3. B. S. 75.
Ein *Mittelinsekt* zwischen *Chrysomela*, *Necydalis* und *Silpha.*

2. *Fim-*

2. *Fimbriata*, der *amerikanische gesäumte Blattkäfer.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 25. No. 25.
Saltatoria oblonga, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide testaceis, *linea nigra cinctis*, femoribus rufis.

3. a. *Hudsonias*, der *schwarze Hudsonische Blattkäfer.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 26. No. 26.
Saltatoria, atra, oblongiuscula, antennarum basi ferruginea.

3. b. *4-guttata*, der *dänische Viertropf.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 204. t. 16.
Caput et thorax nigra, basis antennarum flavescens, elytra nigra *maculis* testaceis.

4. *Ferruginea*, das *Rosthähnchen.*

Scop. Entom. carn. No. 216.
Tota *ferruginea*, oculis nigris.

5. *Truncata*, die *abgestumpfte Flügeldecke.*

Scop. Ent. carn. No. 218.
Nigra, *elytris truncatis*, apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis.

6. *Lurida*, der *braunrothe Blattkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 219.
Fusco-rufa, abdomine oculisque nigris.

7. *Bicolor*, der *kupferschwärzliche Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 245. *Altica* 3. t. 4. f. 4. L'*Altise bedaude.**)

Nigra, elytris *nigro-aeneis* striatis, thorace rubro, pedibus nigris.

8. *Nigra ovalis*, der *schwarze eyförmige Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 246. *Altica* 5. L'*Altise noire ovale.*

Nigro-aenea, ovata, pedibus nigris.

9. *Cruciferae*, das Springhähnchen auf den *Plantis cruciferis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 246. *Altica* 6. L'*Altise noire allongée des cruciferes.*

Nigro-aenea, oblonga, pedibus nigris.

10. *Flavipes*, der *Gelbfuss.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 246. *Altica* 7. L'*Altise noire à pattes fauves.*

Nigra, ovata, *pedibus rufis*, elytris non striatis.

11. *Nigro-fasciata*, der *schwarz bandirte Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 248. *Altica* 10. L'*Altise à bordure noire.*

Nigra, thorace elytrisque flavis, *oris nigris.*

12. *Non-striata*, der *blaue ungestreifte Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 249. *Altica* 12. L'*Altise bleue sans stries.*

Coerulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis.

13. *Coe-*

*) S. die 2te Anm. bey Chrys. L. *Olerac.* No. 51.

13. *Coeruleo-striata*, der *blaue gestreifte Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 343. No. 48. *Chrys. Sauteuse à etuis bleus canelés.*

(Coeruleo-striata) saltatoria ovata coerulea, capite thorace antennis pedibusque rufis, elytris *striatis.*

14. *Violaceo-punctata*, der *himmelblaue punktirte Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 344. *Chrys.* 50. *Sauteuse violette pointillée.*

Saltatoria ovata, thorace punctato virescenti coeruleo, elytris violaceis punctato-striatis, pedibus rufis.

15. *Viridi-coerulea*, der *grünblauliche Blattkäfer.*

de *Geer* Ins. T. 5. p. 346. *Chrys.* 53. *Sauteuse verte bleuâtre.*

Saltatoria, ovata, *viridi-coerulea* nitidissima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis nigris.

16. *Melanocephala*, der *Schwarzkopf.*

de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 348. *Chrys.* 57. *Sauteuse jaune à tête noire.*

Saltatoria pallide flava, capite abdomine femoribusque posticis nigris.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 251. *Altica* 19. La *paillette.**)

Altica elytris pallide flavis, capite nigro.

17. *Albicollis*, der *neuholländische Weisshals.*

Fabric. S. E. p. 112. *Altica* 4.

*) Dieses Citatum hat *Fabricius* S. E. p. 114. zu Linn. *Atricilla* No. 55. gesetzt.

Thorace pallido, elytris aeneis. maculis duabus fasciaque aureis.
Mus. Dom. *Banks.*

18. *Nigripes*, der *englische Schwarzfuss.*
Fabric. S. E. p. 113. *Altica* 6.
Viridi-aenea, pedibus *nigris.*
Mus. Dom. *Hunter.*

19. *Anglica*, der *englische schwarze Blattkäfer mit blassen Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 12.
Atra, elytris tibiisque pallidis.
Mus. Dom. *Hunter.*

20. *4-pustulata*, die *rothe Vierblatter.*
Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 13.
Nigra, coleoptris *punctis quatuor rufis.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 250. *Altica* 15. *L'Altise à points rouges.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 928.
Altica *quadriguttata* ovata, nigra, antennis, pedibus elytrorumque *punctis quatuor luteis.*
Pontopp. Atlas Dan. I. t. 29.

21. *Fuscipes*, der *englische Braunfuss.*
Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 15.
Violacea, capite thoraceque *rufis*, pedibus nigris.

22. *Testacea*, das *muschelbraune englische Springhähnchen.*
Fabric. S. E. p. 114. *Altica* 16.
Testacea, gibba, elytris laevissimis.

Geoffr.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 250. *Altica* 17. L'*Altise fauve sans stries.*

Ovata, *ferruginea*, elytris punctis sparsis.

23. *Tabida*, das *englische blasse Springhähnchen.*

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 19.

Pallida, oculis nigris.

Musf. Dom. *Banks.*

24. *Atra*, das *pechschwarze Springhähnchen.*

Fabric. S. E. p. 115. *Altica* 21.

Atra, nitida, antennarum basi plantisque *piceis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 247. *Altica* 8. L'*Altise noire à jambes jaunes.*

Nigra subrotunda, tibiis ferrugineis.

25. *Pusilla*, das *ganz kleine Springhähnchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 923.

Altica *(pusilla)* ovata, nigra, antennis pedibusque pallidis.

26. *Luteola*, das *gelbbräunliche Springhähnchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 924.

Ovata *lutea*, oculis pectore antennarumque apice nigris.

27. *Flaveola*, das *blafsgelbe Springhähnchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 925.

Ovata, nigra, thorace capiteque *rufo*, elytris antennis pedibusque *luteis.*

28. *Latiuscula*, das *breite Springhähnchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 926.

Nigro-fusca, tibiis tarsisque *subluteis.*

29. *8-gut-*

29. *8-guttata*, der *amerikanische Achttropf.*

Fabric. App. S. E. p. 821.

Thorace ferrugineo; *elytris* atris; maculis quatuor flavis.

30. *Thoracica*, der *amerikanische Blattkäfer mit schwarzpunktirtem Brustschilde.*

Fabric. App. S. E. p. 821.

Oblonga, flava; *thorace* nigro punctato, *elytris* violaceis.

31. *Biguttata*, der *amerikanische Zweytropf.*

Fabric. App. S. E. p. 821.

Ferruginea; *thorace* elytrorumque maculis duabus albis.

32. *Marginata*, der *amerikanische Blasrand.*

Fabric. App. S. E. p. 822.

Flavescens; *elytris* viridibus, *margine pallido.*

III. *Mit cylindrischrundem Körper.*

1. *Paracenthesis*, das *Cylinderhähnchen.*

Linn. Addend. p. 1066. No. 1.
Fabric. S. E. p. 111. *Cryptoceph.* 31.
Müllers Supplementb. S. 223.

2. *Laticlavia*, der *mitternächtlichamerikanische Blattkäfer mit breiten schwarzen Linien auf den Flügeldecken.*

Forsteri nov. spec. Ins. Cent. I. p. 27. No. 27. *Cylindrica* nigra; capite thorace elytrisque rufis; sutura et margine elytrorum nigro; antennis serratis.

3. *Ob-*

3. *Obscure-viridis*, der *russische dunkelgrüne Blattkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 312. t. 20. f. 6.
Corpore *viridi;* thorace atque elytris marginatis.

4. *8-punctata*, der *russische Achtpunkt.*

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 207. t. 11. f. 19.
Cylindrica; thorace elytrisque flavis; thoracis 4-*puncta;* elytrorum 4 paria punctorum nigrorum.

5. *6-punctata*, der *russische Sechspunkt.*

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 207. t. 10. f. 14.
Cylindrica; thorace nigro, rufo marginato, elytris itidem ovatis, *punctis duobus, maculisque 4 nigris.*

6. *Longipes*, der *dresdensche Langfuss.*

Fabric. S. E. p. 105. *Cryptoceph.* 1.
Niger, obscurus; *elytris* pallidis; maculis tribus nigris; pedibus anticis *elongatis.*

7. *10-maculata*, der *kapensische Zehnfleck.*

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 3.
Niger; *thorace elytrisque rubris;* punctis *quatuor* nigris.

8. *Obsita*, der *amerikanische Schwarzrand.*

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 4.
Testaceus; antennis elytrorumque *margine nigris.*

9 *Lineata*, die *brasilianische Schwarzlinie.*

Fabric. S. E. p. 106. *Cryptoceph.* 6.
Rufescens; thorace maculis; elytris *lineis duabus nigris.*

10. *Di-*

10. *Didyma*, der *neuholländische Zwilling-Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 107. *Cryptoceph.* 9.
Rufus, elytris maculis tribus nigris anteriore postice *didyma.*

11. *Ruficollis*, der *Rothhals von der Insel Helena.*

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoceph.* 17.
Niger; *thorace* rufo; *elytris* testaceis.

12. *Calcarata*, der *afrikanische Spornträger.*

Fabric. S. E. p. 109. *Cryptoceph.* 19.
Violaceus; capite thorace *femoribusque dentatis* rufis.

13. *Glabrata*, der *brasilianische Blattkäfer mit glattem Brustschild.*

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 23.
Violaceus; *thorace elytrisque* viridi-aeneis; *antennis* fuscis.

14. *Vittata*, der *bandirte Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 24.
Niger; *elytris margine striaque* abbreviata flavis.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 233. *Cryptoc.* 4. Le *Gribouri à deux bandes jaunes.*
Coeruleo-violaceus, *punctis per strias* digestis.

15. *15-guttata*, der *brasilianische Funfzehntropf.*

Fabric. S. E. p. 110. *Cryptoceph.* 26.
Rufus; *thorace* maculis tribus; *elytris* sex flavis.

16. *Koenigii*, *Königs tranquebarischer Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 111. *Cryptoceph.* 29.
Rufus, *elytris* punctis duobus coerulescentibus.

17. *Lon-*

17. *Longimana*, der *russische Langarm.*

Pallas Reisen 2. Th. Anh. No. 67.

Capite, pectore, abdomine, scutelloque nigra; *pedibus* testaceis; *articulis* nigris; *tarsis* fuscis, primoribus longissimis.

Müllers Supplem. B. S. 224.

18. *Atraphraxidis*, das *Strauchmeldenhähnchen.*

Pallas Reis. 2. Th. Anh. No. 68.

*Corpore, capite, femoribus*que nigris. *Tibiis, tarsis*que nigris; *thorace* coccineo.

Müllers Supplem. B. S. 224.

19. *Bimaculata*, der *Müllersche Zweyfleck.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 511.

Melolontha nigra, villosa; *elytris* punctis duobus rubris.

20. *Bipustulata*, die *schweizerische Zweyblatter.*

Fabric. App. S. E. p. 821.

Cryptocephalus ater, *elytris* macula apicis rufa.

21. *Quadrimaculata*, der *Vierfleck.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 196. *Melolontha* 2. La *Melolonte quadrille à corcelet rouge.*

Coleoptris rubris; maculis 4 nigris; *thorace* rubro nigra macula.

22. *Musciformis*, der *fliegenartige Blattkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 197. *Melol.* 5. La *Melolonte mouche.*

Viridi-coerulea; *thorace* rubro coerulea macula; *tibiis* ferrugineis.

23. *Vitis*,

24. *Vitis*, der *Weinblatthäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 233. *Criptoc.* 2. Le *Gribouri de la vigne.*

Niger, *elytris* rubris.

Fabric. S. E. p. 108. *Cryptoceph.* 15.

Niger, glaber, *elytris rufis.*

24. *Rubro-striata*, der *rothgestreifte Blatthäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 234. *Crytoceph.* 6. t. 4. f. 3. Le *Gribouri rouge strié à points noirs.*

Niger, *elytris* rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris.

25. *Nigro-coerulea*, der *schwarzblaulichte Blatthäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 235. *Cryptoc.* 8. Le *Gribouri bleu strié.*

Coeruleo-violaceus, punctis per *strias digestis.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 58. No. 519.

CRYPTOC. *parvulus* coeruleus, antennarum basi maculaque oris pallida.

26. *Punctata*, der *punktirte Blatthäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. *Cryptoc.* 9. Le *Gribouri bleu à points.*

Coeruleus, punctis sparsis; *tibiis* anticis ferrugineis.

27. *Nigro-striata*, der *schwarzgestreifte Blatthäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. *Cryptoc.* 10. Le *Gribouri noir strié.*

Niger, striatus; *pedibus* rufis.

28. *Rufi-*

28. *Rufipes*, der *Rothfuss.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 236. *Cryptoc.* 11. Le *Gribouri noir à corcelet rouge.*

Niger striatus; *thorace pedibusque rufis.*

29. *Fulva*, der *braungelbe Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 237. *Cryptoc.* 12. Le *Gribouri fauve.*

Capite; thoraceque *fulvo;* elytris pallidis.

30. *Ferrugata*, der *brandfleckichte Blattkäfer.*

P. *Schrank* Beytr. zur N. G. S. 64. §. 7.

Cylindrica, nigra, nitida; *elytris* apice macula lutea; antennis thorace duplo longioribus.

Poda Muf. graecenf. p. 38. Sp. 9.

IV. *Mit länglichtem Körper und schmalem Bruststück.*

1. *Riparia; Füesslins* Verz. S. 8. No. 132.

2. *Erratica; Füesslin* No. 133.*)

3. Chryf. *Luperus*, der *Fadenblattkäfer.*

Füesslins Verz. S. 9. No. 173.
Sulzers Gefch. S. 35. t. 3. f. 15. e. der *Fadenkäfer.*
Schaeff. Elem. t. 80.

4. *Luperus* niger, der *schwarze Fadenkäfer mit rothem Brustschild.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 231. No. 1. t. 4. f. 2. Le *Lupere noir à corcelet et pattes rouges.*

5. *Lupe-*

*) Diese beyden *Skopolischen Coccinellen* hat *Füeßlin* unter die *Chrysomelen* gesetzt. S. unter den *neuen* Coccinellen No. 40. 41.

5. *Luperus rufipes*, der *rothfüſsichte Fadenkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 231. No. 2. Le *Lupere noir à pattes rouges.*

6. *Luperus aeruginoſus*, der *roſtfarbige Fadenkäfer.*

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 913.

Pallidus, capite pectoreque nigris, *elytris* viridibus, politis.

7. *Luſitanica*, das *Ziegelhähnchen.*

Linn. Add. p. 1066. No. 2.

Müllers Supplem. B. S. 223.

8. *Crataegi*, der *Hagedornblattkäfer.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 28. No. 28.

Oblonga, rubra, *elytris* linea longitudinali punctisque nigris.

9. *Trifurcata*, die *Dreygabel.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 29. No. 29.

Oblonga, nigra; *thorace elytrisque* pallidis; *elytris* margine et ſutura, furca tridente, punctisque octo nigris notatis.

10. *Longipes*, der *ruſſiſche Langfuſs.*

Lepechins Tageb. 1. Th. S. 312. t. 16. f. 10.

Corpore viridi; *elytris* flavis; *pedibus anticis longioribus.*

11. *Cichorii*, der *Zichorienblattkäfer.*

Haſselquiſts Reiſe nach Paläſt. S. 449. No. 101.

Os porrectum; Roſtrum (pars capitis infra oculos) longiuſculum, oblongum, parum depreſſum; mandibulae articulato-clavatae, vtrinque duae.

Inſectum

Insectum medium inter *Dermestem*, *Curculionem* et *Cantharidem*.

12. *Cincta*, der *tranquebarische Gürtelblattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 119. *Cryoceris* 3.
Pallida; *elytrorum* margine omni atro.

13. *Sanguinea*, der *hallische blutrothe Blattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 5.
Ovata, rufa; *antennis oculisque* nigris.

14. *Sanguinea*, der *surinamische blutrothe Blattkäfer*.

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 355. No. 9. t. 16. f. 16. *Chrysomele sanguine*.
Oblonga rubra; *thorace elytrisque* teretibus, antennis nigris basi rufis.

15. *Nigricornis*, das *Schwarzhorn*.

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 7.
Ferruginea; *elytris* violaceis, *antennis* nigris.

16. *Melanocephala*, der *neuholländische Schwarzkopf*.

Fabric. S. E. p. 119. *Crioceris* 8.
Rufa, capite nigro; *elytris* violaceis.

17. *Cantharoïdes*, der *englische cantharisförmige Blattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris* 9.
Violacea, *capite thorace*, *pedibusque* rufis.

18. *Bifasciata*, der *neuholländische zweygestreifte Blattkäfer*.

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris* 12.
Thorace cylindrico; rufa, elytris *fasciis duabus atris.*

19. *Unifasciata*, der *neuholländische eingestreifte Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris* 13.
Thorace cylindrico; rufa, elytris *fascia* atra.

20. *Nigripes*, der *neuholländische Schwarzfuss.*

Fabric. S. E. p. 120. *Crioceris* 14.
Thorace cylindrico, flava, *antennis pectore pedibusque* nigris.

21. *Oculatata*, der *neuholländische geäugelte Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 15.
Thorace cylindrico, flava, *elytris* basi nigris, puncto flavo.

22. *Cyanocephala*, der *neuholländische Blaukopf.*

Fabric. S. E. p. 121. *Crioceris* 18.
Cyanea, *thorace* rufo; antennis pedibusque fuscis.

23. *Caroliniana*, der *gelbliche karolinische Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 122. *Crioceris* 21.
Oblonga, flava; *thorace* punctis duobus, coleoptrisque *vittis* quinque nigris.

24. *Vittata*, der *schwarzbandirte karolinische Blattkäfer.*

Fabric. S. E. p. 122. *Crioceris* 23.
Oblonga; *thorace* rufo, elytris flavis, *vitta nigra.*

25. *12-pun-*

25. *12-punctata*, der *Zwölfpunkt.*

Fabric. S. E. p. 103. *Chrysom.* 52.

Oblonga; *thorace* flavescente; *elytris* viridibus; punctis sex nigris.

26. *10-maculata*, der *amerikanische Zehnfleck.*

Fabric. S. E. p. 105. *Chrysom.* 60.

Oblonga, nigra, *coleoptris rubris, punctis decem nigris*, duobus communibus.

27. *10-punctata*, der *englische Zehnpunkt.*

Fabric. S. E. p. 105. *Chrysom.* 65.

Oblonga, viridi-aenea; *thoracis* marginibus albis; *elytris* albis, maculis *decem* aeneis.

28. *Aquatica*, der *Wasserblattkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 908.

Galeruca nigra; *thorace* maculato; *elytrorum* margine futuraque lata, pedibusque flavis.

29. *Veris*, der *Frühlingsblattkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 83. No. 910.

Galeruca nigra; *thorace* cupreo; *elytris* viridibus, pedibus rufis.

30. *Striata*, der *gestreifte Blattkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 940.

Crioceris atra; *capite* supra; *elytris* abdomineque apice albis.

Schaeff. Icon. t. 89. f. 6.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 307. *Anthribus* 3. t. 5. f. 2.

L'*Antribe noir strié.*

Ater, *elytris* apice cinerascentibus.

31. *Bimaculata*, der *amerikanische Zweyfleck.*

Fabric. S. E. App. p. 820.
Oblonga, atra, *elytris* testaceis, *macula* atra.

32. *Fasciata*, der *amerikanische Blattkäfer mit drey gelben Streifen.*

Fabric. S. E. App. p. 820.
Oblonga, atra; *elytris fasciis tribus flavis.*

33. *Ruficollis*, der *englische Rothhals.*

Fabric. S. E. App. p. 820.
Oblonga, viridi-aenea; *thorace* pedibusque rufis.

34. *Sanguineo-rubra*, der *blutröthliche Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 253. *Galeruca* 2. La *Galeruque sanguine.*

35. *Nigro-violacea*, der *schwarzblaulichte Blattkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 254. *Galeruca* 6. La *Galeruque violette.*

V. *Langgedehnte Blattkäfer.**)

1. *Striata*, der *Schwarzstrich.*

Sulzers Gesch. S. 35. t. 3. f. 16.
Tota rubescens, abdomine nigro; *fronte* duabus; *thorace* tribus, *elytrisque* quatuor fasciis seu striis nigris.

200. GE-

*) Die *Chrysom.* elongatas Linn. hat *Fabricius* unter ein eigenes Geschlecht *Lagria* gebracht S. E. p. 124. wo auch noch einige ausländische angeführt sind, denen er aber besondere Kennzeichen beygeleget hat.

200. GESCHLECHT. Hispa. *Dorn- Stachel- Igelkäfer.*

Müllers Linn. Naturſyſt. 5. Th. 1. B. S. 203. *Dornkäfer.*

Füeſslins Verz. S. 9. *Stachelkäfer.*

Börners Samml. 1. Th. S. 468.*)

Sulzers Geſch. S. 35. *Igelkäfer.*

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 367. *Dornkäfer.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 4. p. 250.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 48.**)

Fabric. S. E. p. 70.

1. *Atra*, der *ſchwarze Stachelkäfer.*†)

Müller l. c. S. 203. No. 1. der *Schwärzling.*

Füeſslins Verz. S. 9. No. 174. *Schwarzer.*

Neuer Schauplatz der Natur 2. B. S. 367. *Schwärzling.*

Onomat. hiſt. nat. P. 4. p. 250.

Fabric. S. E. p. 71. No. 7. Thorace elytrisque *ſpinoſis;* corpore atro.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 243. *Crioceris* 7. La *Chateigne noire.*††)

Tota atra, *ſpinis horrida.*

*) Ein ſehr *rares* Geſchlecht, das nur in den *ſüdlichen Theilen von Europa* wohnen ſoll.

**) Vielleicht hätte der Ritter nicht Urſache gehabt, ein *beſonderes Geſchlecht* daraus zu machen, da *Geoffr.* eine Art davon unter ſeinem *Crioceris* Inſ. Tom. I. p. 243. No. 7. und de *Geer* l. c. unter *Tenebrio* aufgeſtellet hat.

†) *Nicht abgebildet.*

††) Wie das *Gehäuſe einer Kaſtanie.*
Sulzers Geſch. S. 35.

2. *Testacea*, der *muschelbraune Stachelkäfer.**)

Müller l. c. S. 204. No. 2. der *Röthling.*
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 251.
Fabric. S. E. p. 71. No. 8.

3. *Bihamata*, der *Doppelhaaken.**)

Müller l. c. S. 204. No. 3.
Onomat. hist. nat. P. 4. p. 251.

4. *Muticus*, das *Fadenhorn.*

Müller l. c. S. 205. No. 4.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 602. *Dermestes clavicornis*, der *haarichte Hautfresser.*
— — — P. 4. p. 252.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 47. t. 3. f. 1. *Tenebrion à antennes velues.*
Tenebrio *(hirticornis)* alatus niger, capite depresso; *antennis pilosis;* thorace bicarinato; elytris punctato-striatis.
Fabric. S. E. p. 71. No. 6.
Inermis, nigra, *antennis pilosis*, elytris striatis.

Unabgebildete.

1. No. 1. *Atra.*
2. No. 2. *Testacea.*
3. No. 3. *Bihamata.*

Neue Arten dieses Geschlechts:

1. *Mystucina*, der *neuholländische gröste Stachelkäfer.*

Fabric. S. E. pag. 70. No. 1. *Antennis pectinatis;* elytris testaceis albo-punctatis.

2. *Fla-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

2. *Flabellicornis*, das *Fliegenwedel-Fächtelhorn.*

Fabric. S. E. pag. 70. No. 2. *Antennis* pectinatis; *elytris laevibus.*

3. *Coerulea*, der *deutsche himmelblaue Stachelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 70. No. 5. *Antennis subserratis*, coerulea, hirta.

4. *Sanguinicollis*, der *amerikanische Bluthals.*

Linn. Mantiss. p. 530.

Fabric. S. E. p. 71. No. 9. Nigra, *thorace elytrorumque* basi rufis, *elytris* serratis.

Müllers Supplem. B. S. 228. der *Bluthals.*

201. GESCHLECHT. Bruchus. *Saamenkäfer; Muffelkäfer.*

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 206. *Saamenkäfer.*

Füesslins Verz. S. 9. *Muffelkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 36. *Müffelkäfer;* la *Bruche.*

Börners Samml. 1. Th. S. 469. *Braachkäfer.*

Catholicon B. p. 399. der *Erbsen-* und *Saamenzerstöhrer.*

Schaeff. Elem. t. 86. f. 8. *Fühlspitzenkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 266. *Mylabris.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. prael. XI. No. 65. Tom. V. p. 277. des *Bruches.*

Fabric. S. E. p. 64. *Bruchus.**)

*) Bey dem *Fabric.* p. 261. ist *Mylabris* des *Linn.* Meloe.

In der *Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 302. wird durch *Bruchus* eine gewisse Art von *Cimicibus* verstanden.

1. *Pisi*, der *Erbsenfresser.*

Müller l. c. S. 206. No. 1. t. 3. f. 6.
Füesslins Verz. S. 9. N. 175. *Erbsenfresser.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 607. der *amerikanische Erbsenfresser; Dermestes* Pisorum.
Scop. Entom. carn. No. 63. LARIA *Salicis. Caput* deflexum; *thorax* elytris concolor; albo puncto in medio marginis postici; *elytra* striata, fusco-grisea; abdomine breviora, punctis posticis albis contiguis ad instar fasciae transversae.
Fabric. S. E. p. 64. No. 2.
Ledermüller Microscop. pag. 195. t. 99. f. 2. t. 100. *Erbsenkäfer; Kreuzkäfer.*
Bomar. Dict. P. VII. p. 299.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 267. *Mylabris* 1. t. 4. f. 9. Le *Mylabre à croix blanche.*
Fusca; cinereo-nebulosa, abdominis apice *cruce alba.*
Baekner Noxa Inf. p. 15.
Linn. Amoen. acad. Tom. 3. p. 347. *Curculio* Pisorum.
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 278. No. 1. t. 16. f. 3. 4. *Bruche des Pois.*
Nigro-fuscus, maculis villosis sparsis albescentibus; *abdominis* apice albo maculis binis nigris.

2. *Theobromae*, der *ostindianische Cacaofresser.**)

Müller l. c. S. 208. No. 2.
Fabric. S. E. p. 65. No. 5.

3. *Gleditsiae*, das *amerikanische Muffelkäferchen auf den Gleditsienkräutern.***)

Müller

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Müller l. c. S. 208. No. 3.
Linn. Amoen. acad. Tom. 6. p. 392. No. 5. *Dermestes* Gleditsiae.

4. *Bactris*, das *amerikanische Muffelkäferchen auf der Palmfrucht.**)

Müller l. c. S. 208. No. 4. der *Kernbeisser.*
Linn. Amoen. acad. Tom. 6. p. 392. No. 6. *Dermestes* Bactris.

5. *Granarius*, der *Kornfresser.***)

Müller l. c. S. 209. No. 5.
Füesslins Verz. S. 10. No. 177. *Kornfresser.*
Fabric. S. E. p. 65. No. 6. *Elytris* nigris, atomis albis, femoribus posticis *vnidentatis.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 628. *Curculio* atomarius.

6. *Seminarius*, der *Saamennager.*†)

Müller l. c. S. 209. No. 6.
Fabric. S. E. p. 65. No. 8. Ater, antennarum *basi pedibusque* anticis testaceis; *femoribus* muticis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 268. *Mylabris* 3. Le *Mylabre satiné.*
Nigra, abdomine albo *sericeo.*

7. *Pectinicornis*, das *Kammhorn.*

Müller l. c. S. 209. No. 7.
Schaeff. Elem. t. 86. f. 1.
Fabric. S. E. p. 66. No. 11. *Antennis* pectinatis; *corpore ferrugineo* longioribus.

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 281. No. 2. *Bruche rouſſe.**) *(Rufus) rufo-fuſcus; elytris* pedibusque rufis; corpore griſeo-maculato; antennis ſerratis.

Unabgebildete.

1. No. 2. *Theobromae.*
2. No. 3. *Gleditſiae.*
3. No. 4. *Bactris.*
4. No. 5. *Granarius.*
5. No. 6. *Seminarius.*

Neue Arten dieſes Geſchlechts.

1. *Fuſcus*, der *ganz braune Muffelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 268. *Mylabris* 2. Le *Mylabre brun.* Tota *fuſca.*

2. *Gleichenii*, des Herrn von *Gleichen Muffelkäferchen im Mays oder türkiſchen Korn.*

Neueſtes im Reich der Pflanzen. Anh. S. 1. t. 1.

Elytra rufo-fuſca, reticulata; *pedes* rufi, piloſi; *antennae* decem articulatae; magnitudo *pediculi.*

Müllers Linn. Naturſ. 5. Th. 1. B. S. 207.

3. *Bipunctatus*, der *ſchweizeriſche Zweypunkt.*

Füeſslins Verz. S. 9. No. 176.

Sulzers Geſch. S. 36. t. 4. f. 2. a.

Capite deflexo; cinereus, *antennis* fuſcis; *thorace* griſeo tuberculato; *elytris* ſtriatis poſtice truncatis.

4. *Spi-*

*) Recht gewiſs iſt der Herr von *Geer* nicht, ob dieſes der nämliche *Linneiſche* ſey, weil bey ſeinem Exemplar die *Fühlhörner* nur ſo lang als der Kopf und der Bruſtſchild ſind.

4. *Spinosus*, der *jamaische gedörnte Muffelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 64. No. 1. *Antennis* filiformibus; thorace elytrisque *spinosis.*

5. *Scabrosus*, der *englische Muffelkäfer mit hökrichten Streifen auf den Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 64. No. 3. Niger, *elytris* rufis elevato-striatis *scabris*, punctis nigris sparsis.

6. *Cacao*, der *gefleckte Kakao-Muffelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 64. No. 4. *Corpore* fusco, griseo, *maculato.*

7. *Cisti*, der *Heidenyssop-Muffelkäfer.*

Fabric. S. E. pag. 65. No. 7. Ater, immaculatus, *femoribus* muticis.

8. *Maculatus*, der *amerikanische schwarzgefleckte Muffelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 65. No. 9. *Elytris* punctatis, testaceis, *nigro-maculatis*, podice griseo punctis binis nigris.

9. *Serraticornis*, der *orientalische Muffelkäfer mit sägeförmigen Fühlhörnern.*

Fabric. S. E. p. 65. No. 10. *Antennis* valde *serratis*, corpore longioribus, corpore griseo, fusco, maculato.

202. GESCHLECHT. *Curculio;**) *Rüſſelkäfer; Kornwurm; Getraidewurm.* Scarabaeus proboſcidarius; Scarabé à trompe; Rhinomacer; Charanſon; Calandre; Becmare. *Holl.* Olyphant - Torretjes, *Elephantenkäfer;* Varkens - Torretjes, *Schnauzen-Schweinkäfer.*

Müllers Linn. Naturſyſt. 5. Th. 1. B. S. 210. *Rüſſelkäfer.*

Füeſslins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 10. *Rüſſelkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 57. *Rüſſelkäfer; Kornwurm.*

— — Geſch. S. 36. *Rüſſelkäfer;* le Charanſon.

Börners Samml. 1. Th. S. 469. *Rüſſelkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. S. 92. *Rüſſelkäfer.*

Eberhards Thiergeſch. S. 201. *Rüſſelkäfer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 2. Th. S. 1509. *Rüſſelkäfer.*

Pontoppid. Nat. Geſch. von D. S. 204. *Rüſſelkäfer.*

Leſſers Theol. der Inſ. S. 253. *Schweinsrüſſel.* S. 70. *Kornwürmer,* Curculiones. S. 403. 442.

Berlin. Samml. 4. B. S. 341. ff.

Schröters Abhandlungen über verſchiedene Gegenſt. der Naturgeſch. 1. Th. S. 228.

Lehmann im 2. B. der phyſikal. Beluſt. 17. St. No. 4. S. 522.

Swammerd. B. der N. S. 294. 295. von einigen Thiergen, die zwiſchen der erſten und zweyten Haut der Weidenblätter leben, und zu Käfern werden. t. 44. f. 8-13.

Wochenblatt für Kinder. VI. Th. S. 15.

Bresl. Samml. 1722. Novemb. Cl. 4. Art. 7. §. 5. *Wipfelbeiſſer.*

Catho-

*) Einige Schriftſteller, als *Skopoli*, *Fabricius* und *Müller* (Otto Fridr.) haben verſchiedene Linneiſche *Curcul.* zu den *Attelabis, Afterrüßelkäfern* gerechnet.

Catholicon C. p. 801. *Rüſſelkäfer; Kornkäfer.* p. 26. *Charanſon.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 3. p. 509. *Curculio; Rüſſelkäfer.*

Aldrovand. Lib. 7. c. 14. f. 134. *Microronchoteri; Scarabaei proboſcidarii.*

Ionſt. hiſt. nat. Inſ. p. 169. Art. 4. de *Curculione.*

Stroen. Act. Nidr. III. p. 351.

Hiſtoire des Charanſons avec les moyens de les detruire. Avignon 1768.

Rozier Samml. brauchbarer Abhandl. 2. Th. S. 54.

Commentar. Lipſ. Dec. I. Vol. V. p. 606. I. p. 430. X. pag. 4.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 174.

Scop. Entom. carn. p. 23.

Fabric. S. E. p. 127.

Mülleri Faun. Fridr. p. 9.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 85. *Curculio.* p. 90. *Rhinomacer.*

Forſteri nov. ſpec. Inſ. Cent. I. p. 31.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 269. *Rhinomacer; Becmare.* p. 274-301. *Curculio; Charanſons.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. prélim. XI. No. 64. Tom. V. p. 199. des *Charançons.*

I. LANGRÜSSEL *mit dünnen Schenkeln.*

1. *Palmarum,* der *Palmenrüſſelkäfer; Palmbaumwurm.*

Müller l. c. S. 211. No. 1. *Palmbohrer.*

Sulzers Geſch. S. 37. der *groſse Palmbohrer.*

Allgemeines Magaz. der Nat. etc. 8. Th. S. 217. *Saguicampas; Saguholzwürmer; Coſſi Saguarii,* S. 229. f. E. F. G. H.

Bankrofts N. G. von Guinea S. 148. der *Palmbaumwurm.*

Fermins Beschr. der Kolon. Surinam. 1. Th. S. 150. *Würmer des Palmkohls; Kabisch-Worm.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 517. der *Rüsselkäfer auf den Palmen.**)

Bomar. Dict. XII. p. 100. *Ver du Palmiste.*

Plin. hist. nat. lib. 17. c. 24.

Fabric. S. E. p. 128. No. 2.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 89. No. 40.

Maximus, niger, *rostro longo; elytris* striatis; capitula *antennarum* magna, compressa, truncata.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 269. No. 4. t. 15. f. 26. *Charanson du Palmier.*

Curc. *longirostris;* antennis fractis clava truncata; *femoribus* muticis, *corpore* nigro depresso; *thorace* ovato planiusculo; *elytris* abbreviatis striatis.

2. *Indus,* der *indianische Rüsselkäfer mit zwey Lappen am Rüssel.*

Müller l. c. S. 213. t. 4. f. 11. der *Elephantenrüssel.*

Houltin hist. nat. de *gepluinde Tor.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der *indianische Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 128. No. 4.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 265. No. 1. t. 15. f. 22. *Charanson des Indes.*

Curc. *longirostris; antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* nigro depresso; *thoracis* lateribus tuberculo villoso; *elytris rugoso-sulcatis.*

3. *Hemi-*

*) Hierzu gehört noch des *Gronov.* No. 577. in der *Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 516. der *einen furchicht erhöheten Schnabel besitzende Rüßelkäfer auf den zeylonischen Palmen.*

3. *Hemipterus*, der *indianische Halbflügel.*

Müller l. c. S. 215. No. 3.
Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 5. der *Kurzflüglichte.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der *mit halb harten Flügeldecken versehene Rüßelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 128. No. 5.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 271. No. 5. t. 15. f. 25. *Charanson roux rayé.*
Curculio *(rufo-fasciatus)* longirostris, antennis fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo rufo; *thorace* magno; *fasciis* longitudinalibus nigris.

4. *Alliariae*, der *Knoblauchrüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 215. No. 4. der *Stengelbohrer.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 178. *Rüßelkäfer des Knoblauchkrauts.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 512. der *Rüßelkäfer des Knoblauchkrauts.*
Fabric. S. E. p. 132. No. 27.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 995.
de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 251. No. 39. *Charanson bleu velu.*
Curc. *(coeruleus)* longirostris, antennis rectis; corpore obtuso villoso, coeruleo-violacco nitido.
Frisch Ins. P. IX. p. 35. t. 18. der *blaue Rüßelkäfer aus der kleinen Art Feldrüben.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 271. *Rhinomacer* 5. Le *Betmare bleu à poil.* *)
Subvillosus *coeruleus.*

5. *Cya-*

*) Dieses vom Herrn von *Geer* bey C. Alliar. angeführte *Geoffroische* Citatum hat *Fabricius* S. E. pag. 141. zu *Violaceus* L. No. 63. gesetzt.

5. *Cyaneus*, der *Weidenbohrer.**)

Müller l. c. S. 215. No. 5.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 760. No. 97. der *langschnäblichte schwarze Rüßelkäfer mit blauen Flügeldecken, und dem weissen Schildchen.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 514. der *blaue Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 132. No. 128.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 987. Niger, *elytris* striatis, coeruleis.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 252. No. 41. *Charanson noir violet.*

Longirostris, antennis rectis, corpore oblongo nigro; *elytris* nigro-coeruleis nitidis.

6. *Craccae*, der *Wickenrüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 215. No. 6.

Fabric. S. E. p. 132. No. 29. CVRCVLIO *globosus*, longirostris, gibbus, supra ater, subtus cinereus.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 253. No. 43. t. 6. f. 31. 32. *Charanson de la Vesse.*

Curc. *(Viciae)* longirostris; *antennis* rectis; *corpore* oblongo villoso cinereo-nigro; *elytris* sulcatis.

7. *Campanulae*, der *Rüßelkäfer auf den Glockenblumen.* **)

Müller l. c. S. 216. der *Glockenblumensauger.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1013. *Rhinomacer* Campan. niger ovatus; *elytris* subsulcatis.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 236. No. 23. *Charanson de la Campanule.*

Longi-

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Longirostris; *antennis* fractis fuscis; *femoribus* muticis; *corpore* subgloboso cinereo nigro; *elytris* lineis griseis.

8. *Badensis*, der *schwarze Rüßelkäfer des Badener Gebiets mit rostfarbigschwarzen Füßen.**)

Müller l. c. S. 216. No. 8.

9. *Aequatus*, der *Schreberſche Schwarzrüßel.***)

Müller l. c. S. 216. No. 9. der *Schwarzrüßel.*

10. *Aterrimus*, der *allerschwärzeste Rüßelkäfer.*†)

Müller l. c. S. 217. No. 10. der *Köhler.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 513. der *allerschwärzeste Rüßelkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 10. No. 90.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 991.

Fabric. S. E. p. 141. No. 74.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 299. *Curc.* 48. Le *Charançon noir à corcelet armé.*

Niger, *thorace* vtrinque dentato.

11. *Cerasi*, der *Kirschrüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 217. No. 11. *Kirschkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 179. *Kirschrüßelkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 791. No. 25. der *schwarze langschnäblichte Rüßelkäfer mit länglichen dunkeln Flügeldecken.*

Frisch Inſ. XI. Th. p. 31. t. 23. f. 1. 3 Pl. der *Rüßelkäfer in den sauren Kirschen.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 514. der *Rüßelkäfer der Kirschen.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 91.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 992.
Fabric. S. E. p. 141. No. 75.

12. *Pruni*, der *Pflaumenrüßelkäfer.**)

Müller l. c. S. 217. No. 12. das *Zwetschenmännchen.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 977.
Ater, *thorace* maculato; tibiis ferrugineis.

13. *Acridulus*, der *Rüßelkäfer auf den kreuzförmigen Pflanzen.***)

Müller l. c. S. 217. No. 13. der *Laugenfresser.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 180.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 512. der *scharfe Rüßelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 133. No. 32.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 92.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 993.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 291. No. 32. Le *Charanson pyriforme.*
Pyriformis, nigro-coeruleſcens, abdomine ovato.
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 235. No. 22. *Charanson acridule.*
Longirostris *arcuatus;* antennis fractis fuscis, *femoribus* muticis, *corpore* ovato nigro-fusco, *tibiis* pallidis.

14. *Purpureus*, der *purpurfarbige Rüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 218. No. 14. der *Langschnabel.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 181. der *Purpurfarbige.*

Poda

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Poda Mus. graecens. p. 29.
List. loqu. p. 394. *Scarabaeus* ex toto coccineus.
Müllleri Faun. Fridr. p. 11. No. 93.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 986. *)
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 250. No. 38. *Charanson cramoisi.*

Rostro longissimo; *antennis* rectis; *corpore* villoso subquadrato *purpureo-aurato* nitidissimo.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 270. *Rhinom.* 4. Le *Becmare doré à étuis rouges.* **)

Niger; *elytris* rubris; capite, thoraceque *aureis*; proboscide longitudine fere corporis.

15. *Frumentarius*, der *rothe Kornwurm.*

Müller l. c. S. 218. No. 15. *holl.* Kalander.
Füeßlins Verz. S. 10. No. 182. *Getraidreuter.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der *Frucht-Rüßelkäfer.*
Catholicon C. p. 226. †)
Fabric. S. E. p. 133. No. 34.
Müllleri Faun. Fridr. p. 10. No. 94.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1011.

*) Der Staatsrath *Müller* hat aus dem *Skopolischen* Curc. *purpureus* No. 86. den *Linné* hier bey seinem purp. angeführt hat, l. c. einen *neuen* gemacht, und mit einem Sternchen bezeichnet: Purpureus *ruber*, oculis abdomineque nigris. *Scop.* Ins. 86.

**) Dieses Citatum hat *Fabric.* p. 130. No. 15. zu *Linn. Bacchus* No. 38. gesetzt.

†) Bey verschiedenen Schriftstellern ist *Calandre* und *Charanson* einerley; andere aber verstehen durch Calandre blos den Curc. Linn. *frument.* und *granar.* durch Charanson hingegen den Curc. L. *segetis.* Die beyden erstern Arten heissen *Glander*, *Reiter* und *Wippel.*

Rhinomacer sanguineus, elytris striato-punctatis: *Kornorm; Snude Bille.*

Acta Nidr. III. p. 391.

Journ. des Savans 1774. Mars p. 194. *Calandre.*

de *Geer* Ins. Tom. V, p. 251. No. 40. *Charanson rouge.* *)

Sanguineus, longirostris, antennis rectis, *corpore* oblongo sanguineo.

16. *Granarius*, der *schwarze Kornwurm.*

Müller l. c. S. 219. No. 16.

Füeßlins Verz. S. 10. No. 183. der *Kornreuter.*

Berlin. Samml. 4. B. S. 342.

Schröters Abhandl. 1. B. S. 228. ff.

Rozier Samml. brauchbarer Abhandl. 2. B. S. 55. ff. t. 2. f. 2. *Calandre; Calande; Loffon; Loffan;* Gon und *Chatepeleuse.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 204. No. 5. t. 16. *Kornkreke; Klanner; Klander;* Calandre; *Glander; Wippel; schwarze Kornwurm; Reiter.*

Altes hamburg. Magaz. 1. B. S. 301. der *schwarze Wurm* oder *Glander.* 4. B. S. 562. *Kornwurm.*

Selecta phys. oecon. 2. St. S. 97.

Schwenkfeld. Theriotr. Silef. p. 527. *Cis; Curculio; Gurgulio; Pediculus frumenti; Kornwurm; Kornkäfer; Kalander; Triticiarius.*

Loewenhoek Arcan. Nat. detecta. pag. 252. *Klander,* p. 480. f. 1. 2. Segreijn-leer. **)

Joblot

*) Der Herr von *Geer* hat das vom *Linné* zu diesem frumentar. gesetzte *Loewenhökfche* Citatum bey dem folgenden granar. angeführt.

**) Dies *Loewenhoekfche* Citatum hat *Linné* zu Curcul. *frument.* gesetzt.

Joblot obs. microscop. 1754. P. I. pag. 15. chap. 4. t. 7. f. 1. La *Licorne; Scarabé* à tête en forme de trompe.*)

Fabric. S. E. p. 134. No. 39.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der *Haberrüßelkäfer.*

Catholicon C. p. 226. der *Korn-* oder *Haberrüßelkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 95.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 88. No. 976. Dan. *Korn-Krae; Glander.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 285. *Charanson* 18. Le *Charanson brun du bled.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 239. No. 25.

Longirostris, *antennis* fractis, *femoribus* muticis; *corpore* oblongo fusco-castaneo; *thorace* longitudine elytrorum.

17. *Dorsalis,* der *Rüßelkäfer auf dem Scharbockskraut mit der schwarzen Rückennath.* **)

Müller l. c. S. 219. No. 17. der *Schwarzstriem.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 514. der *Rückenrüßelkäfer.*

Act. Upsal. 1736. p. 16. No. 6.

Fabric. S. E. p. 133. No. 35.

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 96.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 972.

*) *Joblot* sagt daselbst noch: Le *Charanson*, qui fait tant de tort dans les greniers, où l'on conserve des grains, est une espece de ce genre.

Von beyden Arten siehe noch *Kolbens* Beschr. des Vorgebirges der *guten Hoffn.* Ausz. 4. S. 358.

**) *Nicht abgebildet.*

18. *Melanocardius*, der *Rüßelkäfer mit dem schwarzen Herzflecke.*

Müller l. c. S. 219. No. 18. der *Herzfleck.*

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. 11. *Cordiger*, der *Herzfleck.*

Füeßlins Verz. S. 11. No. 218. *Herzfleck.*

Fabric. S. E. p. 129. No. 7. *Longirostris*, cinereus; coleoptris macula communi *cordata* fusca.

19. *Pini*, der *Fichtenrüßelkäfer.* *)

Müller l. c. S. 220. No. 19. der *Fichtenkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 184. *Fichtenrüßelkäfer.*

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 505. No. 12. der *Rüsselkäfer des Nadelholzes; Harzrüßelkäfer.*

Frisch Ins. XI. Th. S. 30. No. 29. 3. Pl. t. 23. f. 5. der *Rüßelkäfer der dritten Größe an den schmalen Blättern oder Spitzen der Kienbäume.*

Schaeff. Icon. t. 25. f. 7.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der *Rüßelkäfer des Fichtenbaums.*

Fabric. S. E. p. 129. No. 10.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 990.

Piceus; *thorace* maculis; *elytris* fasciis duabus fulvis.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 222. No. 15. *Charanson du Pin.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo testaceo; *maculis* lineisque transversis flavis; *elytris* gibbosis.

20. *La-*

*) Diesen, und *Abietis* No. 57. hat *Linné* in der Begattung angetroffen; also ist entweder dieser oder jener das zweyte Geschlecht.

20. *Lapadi*, der *Sauerampferrüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 220. No. 20. das *Sauermaul.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 185. *Sauerampferrüßelkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 515. der *Rüßelkäfer des Sauerampfs.*

Fabric. S. E. p. 138. No. 61.

Longirostris, *femoribus* bidentatis, albo nigroque varius; *thorace* elytrisque muricatis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 988. Niger, *thorace* vtrinque; *elytris* gibbosis vtrinque et postice albis.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 223. No. 16. t. 7. f. 1. 2. *Charanson noir à derriere blanc.*

Curculio *(albicaudis)* longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* ovato nigro; fasciculis pilosis; *elytris* postice albis.

21. *Cupreus*, der *kupferfarbige Rüßelkäfer.**)

Müller l. c. S. 220. No. 21. der *Kupferkäfer.*

Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 514. der *kupferfarbene Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 20.

22. *Scaber*, der *Rüßelkäfer mit hökrichten Flügeldecken.***)

Müller l. c. S. 221. No. 22. der *Puderkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 947. Fuscus, setosus, antennis pedibusque rufis.

Faun. Fridr. p. 12. No. 117.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

23. *T-album*, der *Rüßelkäfer mit dem weissen T.**)

Müller l. c. S. 221. No. 23. das *weisse T.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 515. der *schwarze und milchfarbne Rüßelkäfer.*

24. *Ruficollis*, der *Rothhals.***)

Müller l. c. S. 221. No. 24.

25. *Quercus*, der *Eichenrüßelkäfer.****)

Müller l. c. S. 222. No. 25.

Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 658. No. 49. der *kleine bloßgelbe und langschnäblichte Rüßelkäfer mit schwarzen Augen.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 519. der *Rüßelkäfer des Eichbaumes.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 38. No. 981. Cinereus; *elytris* pallide flavis; *fascia* obliqua alba; antennis pedibusque rufis.

26. *Polygoni*, der *Rüßelkäfer auf dem Wegetritt.*†)

Müller l. c. S. 222. No. 26. der *Wegetrittkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 38. No. 980. Griseus, *thorace* terlineato; *elytris* striis abruptis, nigris.

27. *Viscariae*, der *Mistelrüßelkäfer.*††)

Müller l. c. S. 222. No. 27. der *Mistelkäfer.*

28. *2-punctatus*, der *zweypunktirte Rüßelkäfer.*†††)

Müller l. c. S. 222. No. 28. der *Schwarzfleck.*

Onomat.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

†††) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 513. der *zweyfachgedüppelte Rüſſelkäfer.*

29. *4-maculatus*, der *Rüſſelkäfer mit vier weiſſen Flecken.**)

Müller l. c. S. 223. No. 29. der *Weiſsfleck.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 518. der *vierfachgefleckte Rüſſelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 999. Griſeus, *elytris* nigris *maculis quatuor albis;* tibiis rufis.

Fabric. S. E. p. 133. No. 31.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 287. *Curc.* 22. Le *Charanſon quadrille à longue trompe.*

Cinereus; *elytrorum* puncto *quadruplici* albo; proboſcide thorace longiori.

30. *5-maculatus*, der *Fünffleck.***)

Müller l. c. S. 223. No. 30. der *Greis.*

31. *Pericarpius*, der *Rüſſelkäfer in den Kernbehältern.*†)

Müller l. c. S. 223. No. 31. der *Kernwächter.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 186. der *Kernwächter.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 517. der *Rüſſelkäfer des Feigwarzenkrauts.*††)

Fabric. S. E. p. 132. No. 26. Longiroſtris, ſubgloboſus, nebuloſus, *elytrorum* ſutura baſi alba.

Act. Vpſal. 1736. p. 16. No. 7. *Curculio minimus* cinereus ſubrotundus obtuſus.

Mülleri

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) In der *Onomat.* hist. nat. p. 519. der *Rüſſelkäfer des Wollkrauts* Linn. Syſt. N. ed. 10. pag. 380. No. 27. Subgloboſus etc. mit *dieſem einerley.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 10. No. 98.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 994.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 298. *Curc.* 46. Le *Charanson porte-coeur de la Scrofulaire.*

32. *Sprengleri*, *Sprenglers amerikanischer Rüsselkäfer.**)

Müller l. c. S. 223. No. 32. der *Sprenglerkäfer.*
Fabric. S. E. p. 151. No. 125. *Breviroſtris;* elytris flavis, lineis atris, glaberrimis, abbreviatis.

33. *Vittatus*, der *amerikanische Streifrücken.***)

Müller l. c. S. 224. No. 33.
Fabric. S. E. p. 150. No. 124. *Breviroſtris*, ater, *elytris* ſtriis albis rubrisque abbreviatis.

34. *Paraplecticus*, der *Lähmer.*

Müller l. c. S. 224. No. 34. der *Lähmer; holl.* bonte Olyphantjes.
Börners Samml. 1. Th. 136.
Schrebers Samml. XI. Th. S. 336. t. 4.
Pontopp. N. G. v. D. S. 204. No. 14. t. 16.
— — Atlas Dan. I. t. 1.
Lepechins Tageb. I. Th. S. 207.
Berlin. Samml. 8. B. S. 35.
Füeßlins Verz. S. 10. No. 187. der *Lähmer.*
Sulzers Geſch. S. 39. t. 4. f. 7. der *Lähmende.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 517. der *lähmende Rüsselkäfer.*
Acta Vpſal. 1736. p. 16. No. 1. *Curculio* acuminatus, longus, fuſcus.
Fabric. S. E. p. 135. No. 44.

Müllleri

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 100.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 971.
Schaeff. Inf. t. 44. f. 1.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 279. *Curc.* 4. Le *Charanſon à ſuture noire.**)

Oblongus, *elytris* villoſo-cinereis ſutura nigra.
de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 224. No. 18. t. 7. f. 8. *Charanſon de la Philandrie.*

Curculio *(Phellandrii)* longiroſtris, *antennis* fractis, *femoribus* muticis; *corpore* oblongo cylindrico griſeo-viridi-flaveſcente; *elytris* acuminatis remotis.

35. *Anguinus*, der *Schlangenkäfer.***)
Müller l. c. S. 224. No. 35.
Füeßlins Verz. S. 10. No. 188. die *Schlange.*

36. *Aſcanii*, der *Aſcanius-Rüſſelkäfer.*†)
Müller l. c. S. 225. No. 36. der *Aſcaniuskäfer.*
Martini allgem. Geſch. der Natur 3. B. 1ſte Abth. S. 356.
Fabric. S. E. p. 135. No. 47.

37. *Algirus*, der *algieriſche punktirte Rüſſelkäfer.*††)
Müller l. c. p. 225. No. 37. der *Algierer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3 p. 512. der *Rüſſelkäfer von Algier.*

38. *Bacchus*, der *Bacchusrüſſelkäfer.*
Müller l. c. S. 226. No. 38.

Füeßlins

*) Nach *Fabricio* iſt dieſer *Geoffroiſche* der Paraplecticus, nach *Mülleri* Zool. Dan. aber Curc. *Similis* p. 89. No. 998. S. unter den neuen der dritten Klaſſe No. 8.
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 189. der *Bacchus.*
Beckmanns phyſ. oek. Bibl. 6. B. S. 249.
Sulzers Geſch. S. 38. t. 4. f. 4. der *Bacchus.*
Schaeff. Icon. t. 37. f. 13.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 513. der *Weingott.*
du *Bois* Tableau annuel 1772. p. 118-121. *Charanſon de la Vigne;* le *Rouleur.*
Schaeff. Icon. t. 27. f. 3.
Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 90. No. 42.
Aurato-virens *ſupra*, *ſubtus* cupreo-auratum.
Fabric. S. E. p. 130. No. 15.*)

39. *Betulae*, der *Birkenrüſſelkäfer.*

Müller l. c. S. 226. No. 39. der *Birkenfelder.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 39. der *Birkenfreund.*
Sulzers Geſch. S. 38. t. 4. f. 3. der *Birkenfreund.*
Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 551. No. 12. der *grün und goldfarbige langſchnäbliche Rüſſelkäfer der Birken und Erlen.*
Friſch Inſ. XII. Th. S. 17. t. 8. 2. Platte. der *purpurroth verguldete Rüſſelkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 6. f. 4.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 513. der *Rüſſelkäfer des Birkenbaums.*
Fabric. S. E. p. 130. No. 16.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1022.
RHINOM. Alni, ſupra viridis, ſubtus aeneus, antennis tarſisque nigris.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 270. *Rhinom.* 2. Le *Becmare vert.*
Totus viridi-ſericeus.
de *Geer*

*) Bey dieſem hat *Fabricius* des *Geoffr. Rhinom.* 4. p. 270. Tom. I. angeführt, ſo der Herr von *Geer* bey Linn. *Purpur.* No. 15. geſetzt hat.

de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 248. No. 5. t. 7. f. 25. *Charanſon du Bouleau.*

Longiroſtris; *antennis* rectis nigris; *corpore* ſubquadrato viridi-aurato nitidiſſimo, *pedibus* purpureo-aeneis.

40. *Populi*, der *Pappelnrüſſelkäfer.**)

Müller l. c. S. 226. No. 40. der *Pappelnnager.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 571. No. 10. der *grüne langſchnäblichte Rüſſelkäfer mit einem meiſt ſtachlichten Bruſtſtück.*

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 518. der *Rüſſelkäfer des Pappelbaums.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 17.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1012.

RHINOMACER *Populi*, ſupra viridis, ſubtus atro-coeruleſcens.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 270. *Rhinom.* 3. Le *Becmare doré.*

Viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 249. No. 37. *Charanſon du Tremble.*

Longiroſtris; *antennis* rectis nigris; *corpore* ſubquadrato ſupra viridi-aurato, nitido, ſubtus violaceo, *pedibus* violaceis.

II. *Springende Langrüſſeln mit dicken Hinterſchenkeln.*

41. *Beccabungae*, der *ſpringende Rüſſelkäfer auf den Bachbungen.*

Müller loc. cit. S. 226. No. 41. der *Bachbungen-ſpringer.*

42. *Alni*,

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

42. *Alni*, der *Erlenhüpfer.**)

Müller l. c. S. 227. No. 42.
Füeßlins Verz. S. 10. No. 191. der *Schwarzpunkt.*
Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 559. No. 21. der *langschnäbliche springende grünlich blaue Rüsselkäfer der Erle.*
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 520. der *Rüsselkäfer der Erle.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 286. *Curc.* 20. Le *Charanson sauteur à taches noires.*
Rufus, *femoribus* posticis crassioribus; *elytris* maculis quatuor nigris.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 262. No. 49. *Charanson sautenr de l'Aune.*
Curculio *(saltator alni)* longirostris; *corpore* ovato testaceo; *elytris* maculis binis fuscis; *capite* nigro.

43. *Salicis*, der *Springkäfer auf den Sahlweiden.***)

Müller l. c. S. 227. No. 43. der *Weidentänzer.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 192. *Weidenrüsselkäfer.*
Gleditsch Forstw. 2. Th. S. 760. No. 96. der *schwarze langschnäbliche und springende Rüsselkäfer mit zwey schwarzen Binden.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 520. der *Rüsselkäfer der Weyde.*
Bom. Dict. I. p. 214.
Fabric. S. E. p. 144. No. 91.

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
Hierbey hat der Ritter des *Geoffroi* Altica 1. Tom. I. p. 245. angeführt, welches die Chrysomela L. *oleracia* No. 51. ist, wenigstens hat keiner von den übrigen genauen Entomologen bey diesem Curc. Salicis des *Geoffr.* gedacht.

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 264. No. 51. *Charanſon ſauteur du Saule.*

Longiroſtris; *corpore* ſubgloboſo atro; *elytris* faſciis duabus transverſis albis maculaque fulva.

44. *Fagi*, der *Springrüſſelkäfer auf den Buchen.**)

Müller l. c. S. 227. No. 44. der *Buchenweider.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 193. *Buchrüſſelkäfer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 601. No. 6. der *langſchnäbliche ſchwarze und ſpringende Rüſſelkäfer mit braunen Oberfüſſen.*

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 520. der *Rüſſelkäfer der Buche.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 93.

Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 101.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1009.

45. *Segetis*, der *Springrüßelkäfer auf der Kornſaat.***)

Müller l. c. S. 227. No. 45. der *Saatſpringer.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 194. *Saatrüſſelkäfer.*

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 520. der *Rüſſelkäfer auf den Ackerfeldern.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 264. No. 50. *Charanſon ſauteur des bleds.*

Longiroſtris; *corpore* ovato nigro griſeo-nebuloſo; *antennis* plantisque pallide fuſcis.

III. *Langrüſſel mit gezähnelten Schenkeln.*

46. *Pomorum*, der *Rüſſelkäfer in den Aepfeln.*

Müller l. c. S. 228. No. 46. der *Apfelſchäler.*

Füeßlins

*) *Nicht abgebildet.*

Dieſer Wurm, *Larva ſubcutanea*, iſt die Urſache, daſs die meiſten Blätter an den Büchenbäumen verdorren.

**) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins Verz. S. 10. No. 195. der *Apfelbohrer.*
Frisch Inf. I. Th. S. 32. t. 8. *von den kleinen Maden, und daraus kommenden Rüsselkäfern in der Baumblüte.*
Glaser von schädlichen Raupen S. 45-48.
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 26. der *langschnäblichte nebelgraue Rüsselkäfer mit gezackten Hüften.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der *aus der Apfelblüte entspringende Käfer.*
Fabric. S. E. p. 143. No. 84.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 103.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1002.

47. *Ovalis*, das *Marmorey.*
Müller l. c. S. 228. No. 47.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der *eyerförmige Rüsselkäfer.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 104.
Drury Inf. t. 33. f. 1. 2. *Jamaicensis.*

48. *Carbonarius*, der *Köhler.**)
Müller l. c. S. 229. No. 48. der *Schwarze.*
Füeßlins Verz. S. 10. No. 196. der *Kohler.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 521. der *Kohlenrüsselkäfer.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 105.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1004.
Corpore nigro, oblongo; *elytris* striatis.

49. *Mucoreus*, der *indianische Gelbschimmel.***)
Müller l. c. S. 229. No. 49. der *Gelbschimmel.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 524. der *schimmlichte Rüsselkäfer.*
Fabric. S. E. p. 136. No. 52.

50. *Pusio*,

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

50. *Pusio*, der *indianische Zwergrüssel.**)
Müller l. c. S. 229. No. 50. der *Zwergrüssel.*
Fabric. S. E. p. 136. No. 53.

51. *Vaginalis*, der *amerikanische Scheidenkäfer.*
Müller l. c. S. 229. No. 51. der *Scheidenkäfer.*
Lepechins Tageb. 1. Th. S. 302. der *Rüsselkäfer mit der Scheide.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der *indianische mit einem Grübchen versehene Rüsselkäfer.***)
Gronov. Gazoph. No. 581. t. 14. f. 6.
de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 266. No. 2. *Charanson à etui.* t. 15. f. 23.
Longirostris; *antennis* fractis, *femoribus* dentatis; *corpore* nigro; *elytris* sulcatis; tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis.

52. *Stigma*, der *indianische Brandfleck.*†)
Müller l. c. S. 230. No. 51.
Fabric. S. E. p. 137. No. 56.

53. *Depressus*, der *amerikanische Plattrücken.*
Müller l. c. S. 230. No. 53. der *Plattrücken.*
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521. der *unter sich gedrückte Rüsselkäfer.*
Fabric. S. E. p. 143. No. 83.
Seba Mus. IV. t. 95. f. 4.

54. *Annulatus*, der *indianische Ringelträger.*††)
Müller l. c. S. 230. No. 54. der *Ringelträger.*

*) *Nicht abgebildet.*
**) Der *amerikanische Rüßelkäfer* in der *Onom.* hist. nat. P. 3. pag. 522. wobey *Gronov.* No. 581. angeführet ist, *mit diesem einerley.*
†) *Nicht abgebildet.* ††) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521. der *ringförmige Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 137. No. 57.

Longirostris; pallidus; *femoribus* dentatis; *thorace elytrisque* striis nigris.

55. *Dispar*, der *indianische Bastard.*

Müller l. c. S. 230. No. 55. der *Bastard.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 521. der *durchsichtige Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 143. No. 87.

Longirostris, *femoribus* dentatis; elongatus, niger; *elytris* maculis quatuor rufescentibus.

Drury Ins. Tom. I. t. 42. f. 3. 7. Curculio *minutus.**)

56. *Anchorago*, die *indianische Langbrust.*

Müller l. c. S. 231. No. 56. die *Langbrust.*

Sulzers Gesch. S. 39. t. 4. f. 6. der *Langbrustkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 523. der *Rüsselkäfer mit einem sehr langen und dünnen Schnabel und Brustschild.*

Fabric. S. E. p. 143. No. 86.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 273. No. 8. t. 15. f. 28. *Charanson à long col.***)

Curculio *(longicollis)* longirostris; *antennis* rectis; *femoribus* dentatis; *corpore* longissimo nigro; *thorace* elongato cylindrico; *elytris* flavo-striatis.

57. *Abie-*

*) Nach dem *Fabricius*; nach dem *Geer* aber Tom. V. pag. 274. No. 8. ist dieser *Drurysche* des Linn. Curc. *Anchorago* No. 56.

**) Hierbey hat er die vom *Fabric.* bey dem vorigen Dispar citirten *Druryschen* Rüsselkäfer Tom. I. t. 42. f. 3. 7. angeführt. S. die *vorige Anmerkung.*

57. *Abietis*, der *Tannenrüſſelkäfer.**)

Müller l. c. S. 231. No. 57. der *Tannenkäfer.*
Füeſslins Verz. S. 10. No. 198. der *Tannenrüſſelkäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 521. der *Rüſſelkäfer des Tannenbaums.*

Schaeff. Icon. t. 25. f. 1.

Fabric. S. E. p. 138. No. 59.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 984. Niger, *elytris* piceis, *punctis* piloſis fulvis ſubfaſciatis.

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 205. No. 1. t. 6. f. 11. *Charanſon du Sapin.*

Longiroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro maculis griſeo-flavis.

58. *Germanus*, der *deutſche Gelbpunkt.*

Müller l. c. S. 231. No. 58. der *Deutſche.*
Füeſslins Verz. S. 10. No. 199. der *Gelbpunktirte.*
Sulzers Geſch. S. 39. t. 4. f. 8. der *Deutſche.*
Friſch Inſ. XIII. S. 28. t. 26. der *groſse ſchwarze Rüſſelkäfer.*

Schaeff. Icon. t. 25. f. 2.

Fabric. S. E. p. 139. No. 67. Longiroſtris; *femoribus* dentatis; ater; *thorace* vtrinque *punctis* duobus teſtaceis.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 522. der *deutſche Rüſſelkäfer.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 91. No. 44.

Maximus inter noſtros. *Elytra* nigra, *punctis* maculisque teſtaceis varia.

Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 110.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 982.

Ovatus, ater, *punctis teſtaceis* maculatus.

*) Mit Curc. *Pini* No. 19. in der Begattung angetroffen, alſo ein oder das andere Geſchlecht.

59. *Nucum*, der *Haselnussrüsselkäfer.*

Müller l. c. S. 232. No. 59. der *Nusskäfer.*
Füesslins Verz. S. 10. No. 200. der *Nussbohrer.*
Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 567. 571. No. 11. der *Haselnusskäfer;* der *graue langschnäblichte Rüsselkäfer.*
Röfels Insektenbel. 3. B. S. 385. t. 67. f. 6. 7. der *Haselnusswurm*, mit *seinem Rüsselkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 524. der *aus der Haselnuss entspringende Rüsselkäfer.*
Poda Mus. graecens. p. 29.
Schaeff. Elem. t. 55. f. 1.
— — Icon. t. 50. f. 4.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 996.
Ovatus gilvus, *rostro longissimo.*
Fabric. S. E. p. 141. No. 77.
Raj. Ins. 3. t. 67. f. 5. 6.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 295. *Curcul.* 42. La *Charanson trompette.*
Rufo-marmoratus; *scutello* cordato albo; *proboscide* subulata longissima.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 205. No. 2. t. 6. f. 14. 15. 16. *Charanson des Noisettes.*
Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis rufis, corpore oblongo nigro, pilis viridi flavis.

60. *Rumicis*, der *Sauerampferrüsselkäfer.*

Müller l. c. S. 232. No. 60. der *Ampfersauger.*
Fabric. S. E. p. 134. No. 38.
Raj. Ins. p. 85. No. 36. *Scarabaeus* parvus, corpore sublongo; totus obscure rufus seu fuscus, *punctis* nigricantibus adspersus.
Mülleri Faun. Fridr. p. 10. No. 97.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1001.

de *Geer*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 231. No. 20. t. 7. f. 10. 11. *Charanſon de la Patience.*

Longiroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo griſeo-fuſco-nebuloſo; *thorace* faſciis binis nigricantibus; *pedibus* fuſcis.

61. *Scrophulariae*, der *Braunwurzrüſſelkäfer.*

Müller l. c. S. 233. No. 61. der *Braunwurzlecker.*
Füeſslins Verz. S. 10. No. 201. der *Braunwurznager.*
Fabric. S. E. p. 140. No. 68. *Longiroſtris; femoribus* dentatis; *coleoptris* maculis duabus dorſalibus atris.
Act. Vpſal. 1736. p. 16. No. 5. *Curculio* globoſus, proboſcide reflexa.
Müllleri Faun. Fridr. p. 10. No. 99.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 997.
Subglobоſus ater; *thorace* pallido villoſo; *elytrorum* lineis elevatis; albo nigroque teſſulatis.
Reaum. Inſ. Tom. III. P. I. p. 42. t. 2. f. 12. Le *Scarabé à tête allongée en trompe;* le *Mineur* du *Bouillon-blanc.**)
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 296. *Curc.* 44. Le *Charanſon à lozange de la Scrofulaire.*
Subglobоſus niger; *punctis* duobus atris ſuturae longitudinalis coleoptrorum; *thorace* exalbido.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 208. No. 3. t. 6. f. 17. 18. 19. 20. *Charanſon de la Scrophulaire.*

*) Daſs ſich verſchiedene *Minirwürmer* in allerley Pflanzenblättern in *Rüßelkäfer* verwandeln, iſt eine wichtige Entdeckung, die wir dem groſsen *Reaumur* Inſ. Tom. III. Part. I. p. 40. ſq. zu danken haben. Die Minirwürmer verwandeln ſich in *drey* verſchiedene Arten von Inſekten: in *Nachtmotten*; in *Fliegen*, und in *Rüßelkäferchen.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* subgloboso fusco griseove; *coleoptris* maculis duabus rotundis nigris dorsalibus.

62. *Druparum*, der *Kernbohrer*.

Müller l. c. S. 233. No. 62. der *Rothschnabel.*
Füesslins Verz. S. 11. No. 203. der *Kernbohrer.*
Fabric. S. E. p. 143. No. 82.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 106.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1003.
Schaeff. Icon. t. 1. f. 11. a. b.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 296. *Curc.* 43. Le *Charançon damier.*

Flavescens; *elytris* luteo- et rufo-tessellatis.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 214. No. 7. *Charançon des bayes.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo rufo-fusco; *elytris* obsolete fasciatis.

63. *Violaceus*, der *violette Fichtenrüsselkäfer.**)

Müller l. c. S. 233. No. 63. der *Violetrüssel.*
Füesslins Verz. S. 11. No. 204. der *Kienbohrer.*
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 519. der *violette Rüsselkäfer.*
Fabric. S. E. p. 141. No. 76.**)
Mülleri Faun. Fridr. p. 9. No. 89.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 89. No. 1000. p. 91. No. 1024. RHINOM. *unispinus*, violaceus; thorace antrorsum spinoso, *antennis* nigris.
Scop. Entom. carn. No. 78.
Totus ex coeruleo-violaceus; *antennis* nigris.

Poda

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Fabric.* hat bey diesem den vom *Geer* bey Curc. L. *Alliar.* No. 4. citirten *Geoffr.* I. 271. *Rhinom.* 4. angeführt.

Poda Mus. graec. p. 28.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 213. N. 5. *Charanson noir-bleuâtre.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro-coeruleſcente nitido: *elytris* striatis.

64. *5-punctatus*, der *Fünfpunkt.**)

Müller l. c. S. 233. No. 64. die *Weissnath.*

Fabric. S. E. p. 140. No. 70. Longirostris; *femoribus* dentatis; *elytris* ſutura punctisque duobus albis.

65. *Hispidus*, der *ſtachlichte Rüſſelkäfer.***)

Müller l. c. S. 234. No. 65. der *Schuppenkäfer.*

Onomat. hist. nat. p. 3. p. 522. der *haarigte Rüſſelkäfer.*

66. *Pediculariuſ*, der *Rüſſelkäfer in der Gröſſe einer Laus.*†)

Müller l. c. S. 234. No. 66. der *Lauſer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 525. der *Lausrüſſelkäfer.*

67. *Tortrix*, der *Blattroller.*††)

Müller l. c. S. 234. No. 67.

Fabric. S. E. p. 143. No. 85.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 300. *Curc.* 51. Le *Charanſon couleur de rouille.*

Ferrugineus; *elytris* striatis, oculis nigris.

 de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Von der Art ist des Herrn von *Geer* Curc. *Vlmi*, Tom. V. p. 215. 217. No. 8. t. 6. f. 26, 27. der hinten unter den *neuen* vorkommen wird.

††) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 214. No. 6. *Charanſon fauve.*

Curculio *(fulvus)* longiroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo flavo-teſtaceo; *oculis* nigris.

IV. *Kurzrüſſel mit gezähnelten Schenkeln.*

68. *Liguſtici*, der *Liebſtöckelrüſſelkäfer.*

Müller l. c. S. 234. No. 68. der *Liebſtöckelkäfer.*
Füeſslins Verz. S. 11. No. 205. der *Kleerüſſelkäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 526. der *Rüſſelkäfer des Liebſtöckel oder Badkrauts.*
Schaeff. Icon. t. 2. f. 12.
Fabric. S. E. p. 155. No. 145.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 962. Niger; *thorace* murino; *elytris* maculis pallidis ſtriatis.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 218. No. 10. *Charanſon du Liguſticum.*

Apterus, breviroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro-fuſco; *ſquamulis* griſeis nitidis.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 292. *Curc.* 36. Le *Charanſon gris à etuis reunis et chagrinés.*

Cinereus, ſquamoſus, *alis carens*, *elytris* rugoſis.

69. *Ovatus*, der *eyerförmige Rüſſelkäfer.**)

Müller l. c. S. 235. No. 69. der *Eyerkäfer.*
Fabric. S. E. p. 156. No. 151.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 109.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 969.
Scop. Entom. carn. No. 83. *Curc. Vrticae:* an ovatus *Linn.?*

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 219. No. 11. *Charanſon de l'Eglantier.*

Curculio *(Roſae) apterus* breviroſtris; *pedibus* antennisque fractis rufis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro fuſco.

70. *Cervinus*, der *Hirſchhornrüſſelkäfer.**)

Müller l. c. S. 235. No. 70. der *Hirſchhornkäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 526. der *Hirſchrüſſelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 149. No. 114.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 970.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 220. No. 13. *Charanſon gris bronzé.*

Curculio *(griſeo-aeneus)* breviroſtris; *antennis* fractis rufis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo griſeo-aeneo nitido.

71. *Oblongus*, der *länglichte Rüſſelkäfer.***)

Müller l. c. S. 235. No. 71. der *Schmalbauch.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 526. der *länglichte Rüſſelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 156. No. 150.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 294. *Curc.* 39. Le *Charanſon à etuis fauves.*

Oblongus, niger; *elytris pedibusque* teſtaceis.

72. *Pyri*, der *Birnrüſſelkäfer.*

Müller l. c. S. 235. No. 72. der *Birnkäfer.*
Füeſslins Verz. S. 11. No. 206.
Sulzers Kennz. t. 3. f. 23. der *erztbraune Rüſſelkäfer auf den Birnbäumen.*

Gleditſch

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 791. No. 24. der *dunkelgrüne Blattkäfer des Birnbaums.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 526. der *aus den Blättern des Birnbaums entspringende Rüsselkäfer.*

Acta Upsal. 1736. p. 16. No. 2. *Curculio* acuminatus oblongiusculus aeneo-fuscus.

List. loqu. p. 394. No. 31. *Scarabaeus* majusculus e nigro rufescens.

Fabric. S. E. p. 155. No. 147.

Müllleri Faun. Fridr. p. 11. No. 107.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 965.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 11.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. *Curc.* 12. Le *Charanson à écailles vertes et pattes fauves.*

Squamoso-viridis; *rostro thorace* breviore, pedibus rufis.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 246. No. 34. *Charanson bronzé du Poirier.*

Breviroſtris; *antennis* fractis rufis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo aeneo-nitido; pedibus rufis.

73. *Argentatus*, der *Silberrüsselkäfer.*

Müller l. c. S. 236. No. 73. der *Silberkäfer.*

Füesslins Verz. S. 11. No. 207. *Silberrüsselkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. 9. d. c.*) *Fühlspitzenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 155. No. 148.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 526. der *silberfarbene Rüsselkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 108.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 966.

Viride-auratus; *antennis pedibusque* rufis.

Geoffr.

*) *Mylabris* Schaefferi. Unter Scopoli *calcaratos.*
Hat die *prächtigsten Schuppen* auf den Flügeldecken.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 293. *Curc.* 38. Le *Charanſon à écailles vertes.*

Squamoſus, viridi-auratus.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 219. No. 12. *Charanſon verd-doré de l'Ortie.*

Curculio *(Vrticae)* breviroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo viridi-nitido; *pedibus* viridibus.

V. *Kurzrüſſel mit ungezähnelten Schenkeln.*

74. *Argyreus*, der *indianiſche Silberrüſſel.**)

Müller l. c. S. 236. No. 74. der *Silberrüſſel.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 94.

75. *Regalis*, der *peruaniſche Goldrüſſel.***)

Müller l. c. S. 236. No. 75. der *Goldrüſſel.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 95.

76. *Viridis*, der *Grünrüſſel.*

Müller l. c. S. 236. No. 76.

Füeſslins Verz. S. 11. No. 209. der *Grünling.*

Schaeff. Elem. t. 108. *Rhinomacer.*

— — Icon. t. 53. f. 6.

Fabric. S. E. p. 146. No. 102. Breviroſtris; *femoribus* muticis; vireſcens; *thorace* elytrorumque lateribus flavis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 111.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 958.

Corpore viridi, ſupra obſcuro; ſubtus flavidiore.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 256. No. 45. *Charanſon verd à bande jaune.*

Curcu-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Curculio *(flavo-cinctus)* breviroſtris; *antennis* rectis; *corpore* oblongo viridi; *faſcia* laterali flava.

77. *Specioſus*, der *indianiſche Rüſſelkäfer mit fünf Stacheln auf den Flügeldecken.**)

Müller l. c. S. 237. No. 77. die *Stacheldecke.*

78. *Ruficornis*, das *Rothhorn.***)

Müller l. c. S. 237. No. 78.
Fabric. S. E. p. 149. No. 115.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 115.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 959.

Corpore atro; *thorace* bituberculato; *antennis* rubris.

79. *Albinus*, der *Rüſſelkäfer mit der weiſſen Stirn.*

Müller l. c. S. 237. No. 79. die *Weiſsſtirn.*
Fabric. S. E. p. 151. No. 127.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 973.

Niger, tuberculatus; *thorace* ſubtus; *elytris* antice et poſtice *albis.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 255. No. 44. t. 8. f. 1. *Charanſon à extremités blanches.*

Breviroſtris; *antennis* longis rectis; *corpore* oblongo nigro hiſpido; *capite* elytrorumque apice albis; *roſtro* planiuſculo lato.

80. *Lineatus*, der *lineirte Rüſſelkäfer.*

Müller l. c. S. 237. No. 80. der *Bruſtſtrich.*
Füeſslins Verz. S. 11. No. 210. der *Bruſtſtrich.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. pag. 528. der *linienförmige Rüſſelkäfer.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 148. No. 111.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 953. Oblongus aurato-griseus; *thorace* terlineato; *antennis* rufescentibus.

Act. Nidr. IV. p. 14.

Schaeff. Icon. t. 103. f. 8.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 283. *Curc.* 13. Le *Charanson à corcelet rayé.*

Rostro thoracis longitudine; *thorace* tribus striis pallidioribus.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 247. No. 35. *Charanson rayé à courte trompe.*

Breviröstris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo griseo; *thorace* striis tribus pallidioribus.

81. *Incanus*, die *Stumpfdecke.**)

Müller l. c. S. 237. No. 81.

Füeßlins Verz. S. 11. No. 211. der *Stumpfdeckel.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 528. der *schwarzgraulichte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 147. No. 106. Breviröstris, fuscus, oblongus, *thoracis* dorso plano.

List. loqu. f. Scarab. anglic. 394. No. 30. *Scarabaeus* fuscus lanugine *incanus.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 11. No. 112.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 946.

Oblongus, cinereus, *hirtus.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. *Curc.* 10. Le *Charanson gris, strié et sans ailes.*

Cinereus, *squamosus*, alis carens; *elytris* striatis.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 242. No. 28. *Charanson gris non ailé.*

Curcu-

*) *Nicht abgebildet.*

Curculio *(griseo-apterus)* breviroſtris; *antennis* fractis longiſſimis rufis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo nigro-fuſco; *pilis* nitidis griſeis.

82. *Cloropus*, der *Graufuß.**)

Müller l. c. S. 238. No. 82.
Fabric. S. E. p. 149. No. 116.
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 113.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 957.

83. *Rufipes*, der *Rothfuß.***)

Müller l. c. S. 238. No. 83.
Füeßlins Verz. S. 11. No. 212. der *Rothfuß.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 529. der *Rüßelkäfer mit rothen Füßen.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 11. No. 114.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 945.

84. *Nebuloſus*, der *neblichtfarbige Rüßelkäfer.*

Müller l. c. S. 238. No. 84. die *Wolkendecke.*
Füeßlins Verz. S. 11. No. 213.
Gleditſch Forſtwiſſ. 2. Th. S. 980. No. 31. der *kurzſchnäbliche nebelgraue Rüßelkäfer mit ſchwarz und ſchräg geſtreiften Flügeldecken.*
Friſch Inſ. XI. Th. S. 32. t. 23. f. 5.
Ein Käfer mit etwas kurzem Rüſsel.
Schaeff. Icon. t. 25. f. 3.
Fabric. S. E. p. 147. No. 104.
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 529. der *Rüßelkäfer mit neblichter Farbe.*

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 278. *Curc.* 1. t. 4. f. 8. Le *Charanſon à trompe ſilonnée.**)

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 241. No. 27. *Charanſon à trompe à arrête.*

Curculio (*carinatus*) breviroſtris, *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo nigro maculis faſciisque albidis; *elytris* gibboſis.

85. *Sulciroſtris*, der *Rüßelkäfer mit gefurchtem Rüßel.*

Müller l. c. S. 238. No. 85. t. 4. f. 14. die *Rinnennaſe.*

Füeßlins Verz. S. 11. No. 214. die *Rinnennaſe.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 240. No. 26. *Charanſon à trompe ſilonnée.*

Breviroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo cinereo; *elytris* maculis faſciisque obliquis nigris.**)

86. *Ater*, der *ganz ſchwarze Rüßelkäfer.* †)

Müller l. c. S. 239. No. 86. der *Schwarzrock.*

Füeßlins Verz. S. 11. No. 215.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 954. *Thorace* punctato terque lineato; tibiis antennisque rufis.

87. *Emeritus*, der *indianiſche Rüßelkäfer mit haarichten Warzen.* ††)

Müller l. c. S. 239. No. 87. der *Spinnenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 152. No. 133.

88. *Bar-*

*) Nach dem *Linné* und *Fabricius* iſt hierbey der *Geoffroi*; von dem Herrn von *Geer* aber bey Linn. Curc. *Sulciroſtris* No. 85. angeführt.

**) Hierbey hat der Herr von *Geer* das vorige Citatum des *Geoffroi* geſetzt.

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

88. *Barbarus*, der *französische Rüßelkäfer mit ausgehöhltem Brustschild.**)

Müller l. c. S. 239. No. 88. der *Franzose.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 527. der *bartige Rüßelkäfer.***)
Fabric. S. E. p. 152. No. 134.

89. *Capensis*, der *kapensische Rüßelkäfer.****)
Müller l. c. S. 240. No. 89. der *Afrikaner.*
Fabric. S. E. p. 152. No. 130.

90. *Verrucosus*, der *kapensische Warzenträger.*
Müller l. c. S. 240. No. 90. t. 4. f. 15.
Fabric. S. E. p. 152. No. 129.
Drury Inf. Tom. I. t. 32. f. 5.

91. *Cornutus*, der *indianische Hornträger.*†)
Müller l. c. S. 241. No. 91.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 528. der *gehörnte Rüßelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 153. No. 137.

92. *16-punctatus*, der *indianische Rüßelkäfer mit sechzehn schwarzen Punkten.*††)
Müller l. c. S. 241. No. 92. der *Furchenkopf.*
Fabric. S. E. p. 146. No. 98.

93. *Gra-*

*) *Nicht abgebildet.*

**) In der *Onomat.* hat man statt Barbarus in der Barbarey, oder in Afrika; *Barbatus* gelesen, woraus die Benennung: der *bartige* entstanden.

***) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

93. *Granulatus*, die *indianische Körnerdecke.*
Müller l. c. S. 241. t. 4. f. 17. die *Körnerdecke.*

94. *Abbreviatus*, der *martinikſche Rüßelkäfer mit abgekürzten Flügeldecken.**)
Müller l. c. S. 242. No. 94. der *Kurzmantel.*
Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 527. der *abgekürzte Rüſſelkäfer.*

95. *Apterus*, der *indianiſche Ohnflügel.*
Müller l. c. S. 242. No. 95. der *Kahlflügel.*
Fabric. S. E. p. 154. No. 142. Breviroſtris; *thorace* ſpinoſo; *cruce* impreſſo; *elytris* ferrugineo punctatis.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 275. t. 16. f. 1. *Charanſon croix de chevalier.*
Curculio *(cruciatus)* apterus breviroſtris carinatus; *antennis* rectis; *corpore* ovato, atro ſubtus maculis rubris; *thorace ſpinoſo crucigero.*

Unabgebildete Linnéiſche Rüßelkäfer.

I. Der *erſten Klaſſe.*

1. No. 5. *Cyaneus.*
2. No. 7. *Campanulae.*
3. No. 8. *Badenſis.*
4. No. 9. *Aequatus.*
5. No. 10. *Aterrimus.*
6. No. 12. *Pruni.*
7. No. 17. *Dorſalis.*
8. No. 21. *Cupreus.*
9. No. 22. *Scaber.*

*) *Nicht abgebildet.*

10. No. 23. *T-album.*
11. No. 24. *Ruficollis.*
12. No. 25. *Quercus.*
13. No. 26. *Polygoni.*
14. No. 27. *Viscariae.*
15. No. 28. *2-punctatus.*
16. No. 29. *4-maculatus.*
17. No. 30. *5-maculatus.*
18. No. 31. *Pericarpius.*
19. No. 32. *Sprengleri.*
20. No. 33. *Vittatus.*
21. No. 35. *Anguinus.*
22. No. 36. *Ascanii.*
23. No. 40. *Populi.*

II. Der *zweyten Klasse.*

1. No. 41. *Betcabungae.*
2. No. 42. *Alni.*
3. No. 43. *Salicis.*
4. No. 44. *Fagi.*
5. No. 45. *Segetis.*

III. Der *dritten Klasse.*

1. No. 48. *Carbonarius.*
2. No. 49. *Mucoreus.*
3. No. 50. *Pusio.*
4. No. 52. *Stigma.*
5. No. 54. *Annulatus.*
6. No. 63. *Violaceus.*
7. No. 64. *5-punctatus.*
8. No. 65. *Hispidus.*
9. No. 67. *Tortrix.*

IV. Der

IV. Der *vierten Klasse.*

1. No. 69. *Ovatus.*
2. No. 70. *Cervinus.*
3. No. 71. *Oblongus.*

V. Der *fünften Klasse.*

1. No. 74. *Argyreus.*
2. No. 75. *Regalis.*
3. No. 77. *Speciosus.*
4. No. 78. *Ruficornis.*
5. No. 81. *Incanus.*
6. No. 82. *Cloropus.*
7. No. 83. *Rufipes.*
8. No. 86. *Ater.*
9. No. 87. *Emeritus.*
10. No. 88. *Barbarus.*
11. No. 89. *Capensis.*
12. No. 91. *Cornutus.*
13. No. 92. *16-punctatus.*

NEUE RÜSSELKAEFERARTEN.

I. *Langrüßel mit dünnen Schenkeln.*

1. *Vlicis*, der *englische Rüßelkäfer auf dem Heckfaamen.*

Forsteri nov. spec. Ins. Cent. I. p. 31. No. 31. Longirostris, *femoribus* simplicibus; cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufi.

2. *Longipes*, der *Langfuß von der S. Johannisinsel bey Madagascar.*

Drury Ins. Tom. II. t. 33. f. 3.
Longirostris, *femoribus* simplicibus, totus rufo-obscure-fuscus; pedibus anticis longissimis.

3. *4-punctatus*, der *russische Vierpunkt.*
Lepechins Tageb. 2. Th. S. 204. t. 11. f. 23.
Longirostris; *corpore* griseo; *thorace* lineis duabus atque elytrorum *punctis 4 albis.*

4. *Variegatus*, der *russische gescheckte Rüßelkäfer.*
Lepechins Tageb. 2. Th. S. 204. t. 11. f. 33.
Longirostris; albo nigroque varius, *elytris* apice acuminatis.

5. *Gibbus*, der *Buckelrüßelkäfer.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1014.
Longirostris, niger, ovatus, *elytris* violaceis sulcatis.

6. *Similis*, der *schwarze Rüßelkäfer mit eyförmigen Flügeldecken.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1015.
Longirostris, ater; *elytris* ovatis, punctato-striatis.

7. *Nemoralis*, der *Waldrüßelkäfer.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1016.
Longirostris niger; *elytris* striato-punctatis; *oculis* fuscis.

8. *Politus*, der *glatte Rüßelkäfer.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1017.
Longirostris, niger; *elytris* cyaneis, striatis, nitidis.

9. *Flavi-*

9. *Flavipes*, der *Rüßelkäfer mit gelben Hüften.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1018.
Longirostris, niger, ovatus; *femoribus* flavo-rufis.
Act. Nidr. IV. 15.

10. *Griseus*, der *aschgraue Rüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 974.
Oblongus, cinereus, *antennis* rufis.

11. *Nitidulus*, das *schwarz violet glänzende Rüßelkäferchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 975. Oblongus nigro-violaceus; thorace elytrisque nigro virentibus.

12. *Arvensis*, der *Feldrüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 978. Griseus; *thorace* terlineato, *elytris* rufis, obscure tessulatis.

13. *Tuberculatus*, der *schwarze Rüßelkäfer mit dem Hökerschild.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 979.
Niger; *thorace* rugoso; *elytris* lineis tuberculisque muricatis.

14. a. *Glaucinus*, der *blaugrüne Rüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 989.
Niger; *thorace* vtrinque linea pallida; *tibiis* rufis.

14. b. *Trifolii*, der *Kleekäfer.*

Müllers Suppl. B. S. 230.
Supra ater; *femoribus* pallidis; *ventre* niveo; *elytris* striatis.

15. *Gigas*, der *große japanische Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 127. No. 1. Longirostris, *thorace* elytrisque scabris; *antennis* apice albis.

16. *Cruentatus*, der *karolinsche Blutpunkt.*

Fabric. S. E. p. 128. No. 3. Longirostris ater; *thorace* lineis, elytrisque punctis duobus *sanguineis.*

17. *Paganus*, der *indianische Landmann.*

Fabric. S. E. p. 128. No. 6. Longirostris, griseus; *thoracis* dorso fusco; arcubus cinereis; *rostro* bisulcato.

18. *Cruciatus*, der *neuholländische Rüßelkäfer mit einem Kreuz.*

Fabric. S. E. p. 129. No. 8. Longirostris, subspinosus, niger, thorace lineis, elytris postice *cruce* albis.

19. *Striatulus*, der *gestreifte Rüßelkäfer von der Insel Terre neuve in Amerika.*

Fabric. S. E. p. 129. No. 9. Longirostris, niger; elytris holosericeo-striatis.

20. *Iaceae*, der *Rüßelkäfer der Flockenblume.*

Fabric. S. E. p. 129. No. 11. Longirostris, niger, cinereo-irroratus, *elytris* puncto baseos distincto.

21. *Biguttatus*, der *amerikanische Zweytropf.*

Fabric. S. E. p. 130. No. 13. Longirostris, niger; *elytris* puncto elevato, abdomine pedibusque posticis flavis.

22. *Equi-*

22. *Equiseti*, der *Rüßelkäfer auf dem englischen Kannenkraut.*

Fabric. S. E. p. 130. No. 14. Longirostris; *thorace* laevi; *elytris* muricatis nigris, punctis duobus apiceque albis.

23. *Bicolor*, der *amerikanische zweyfarbige Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 18. Longirostris, niger, *thorace elytrisque* rufis.

24. *Pubescens*, das *deutsche rauche Rüsselkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 19. Longirostris, violaceus, *hirtus*, rostro atro.

25. *Tragiae*, das *brasilianische kupferfarbige Rüsselkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 21. Longirostris, *aeneus*, rostro pedibusque nigris.

26. *Aeneus*, das *englische kupferfarbige Rüßelkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 22. Longirostris, niger, *elytris* aeneis.

27. *Fuscirostris*, der *deutsche Braunrüßel.*

Fabric. S. E. p. 131. No. 23. Longirostris, griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris.

28. *Nigrirostris*, der *englische Schwarzrüßel.*

Fabric. S. E. p. 132. No. 24. *Longirostris*, viridis, *rostro atro.*

29. *Rufirostris*, der *englische Rothrüßel.*

Fabric. S. E. p. 132. No. 25. Longirostris, niger, rostro dimidiato pedibusque rufis.

30. *Malvae*, der *englische Malven-Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 132. No. 30. Longirostris, griseus, *elytris* pedibusque testaceis.

31. *Suturalis*, der *deutsche Sahlweiden-Rüßelkäfer, mit der weissen Nath.*

Fabric. S. E. p. 133. No. 36. Longirostris, ovatus, fuscus; *linea longitudinali alba.*

32. *Exclamationis*, das *neuholländische Exclamationszeichen.*

Fabric. S. E. p. 133. No. 37. Longirostris, ater; *elytris* puncto lineolaque apicis albis.

33. *Orizae*, das *Reiß-Rüsselkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 134. No. 40. Longirostris, piceus; *thorace* punctato, longitudine elytrorum; *elytris* punctis duobus rufis.

Linn. Amoen. acad. Vol. VI. p. 395. No. 19.
Longirostris, oblongus, niger; *elytris* maculis quatuor ferrugineis; femoribus muticis.

34. *Barbicornis*, das *neuseeländische Barthorn.*

Fabric. S. E. p. 134. No. 41. Longirostris, cylindricus, *rostro longissimo*, subtus *barbato*; elytris elongato clavatis.

35. *Assimilis*, der *dem vorigen sehr ähnliche neuseeländische Rüßelkäfer.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 134. No. 42. Longirostris, cylindricus; rostro apice glabro, atro; *elytris* ferrugineo subfasciatis. Videtur *mas* praecedentis.

36. *Semipunctatus*, der *neuseeländische Halbpunktirte.*

Fabric. S. E. p. 135. No. 43. Longirostris, cylindricus; *thorace* lineis, *elytris* punctis albis.

37. *Barbirostris*, der *indianische Bartrüßel.*

Fabric. S. E. p. 135. No. 45. Longirostris, niger; *rostro barbato;* tibiis anticis tridentatis.

38. *Angustatus*, die *englische Punktstreife.*

Fabric. S. E. p. 135. No. 46. Longirostris, cylindricus, ater; *elytris* obtusis striato-punctatis.

39. *Lineola*, die *neuholländische Linie.*

Fabric. S. E. p. 136. No. 48. Longirostris, cylindricus, niger; *elytris* vitta testacea.

40. *Linearis*, der *straßburgische linienförmige Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 136. No. 49. Longirostris, elongatus, niger; antennis pedibusque piceis; *rostro* bali attenuato.

41. *Crassipes*, der *straßburgische Dickfuß.*

Fabric. S. E. p. 136. No. 50. Longirostris; *femoribus* anticis subclavatis, corpore atro.

42. *Elongatus*, der *Windhund.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 269. *Rhinom.* 1. Le *Becmare levrette.*

Corpore

Corpore angusto longo, niger, *thorace* fasciis quatuor albicantibus.

43. *Nigro-striatus*, der *schwarzgestreifte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 271. *Rhinom.* 6. Le *Becmare noir strié.*

Nigro-fuscus glaber, *punctato-striatus.*

44. *Oblongus*, der *länglichte gestreifte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. *Rhinom.* 7. Le *Becmare allongé.*

Nigro-virideſceus, *oblongus*, striatus.

45. *Flavipes*, der *Gelbfuss.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. *Rhin.* 8. Le *Becmare noir à pattes fauves.*

Subgloboſus niger, striatus; *femoribus* rufis.

Fabric. S. E. p. 133. No. 33. *Flavipes.* Longiroſtris ater, *femoribus luteis.*

46. *Pulex*, das *Flohrüſselkäferchen.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 272. *Rhinom.* 9. Le *Becmare-puce.*

Subgloboſus, villoſus, niger, pedibus *elytrisque* rufis.

47. *Rugoſus*, der *runzlichte Rüſselkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 278. *Curc.* 2. Le *Charanſon ridé.*

Totus fuscus *rugoſus.*

48. *Sulca-*

48. *Sulcatus*, der *gefurchte Bruſtſchild.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 278. *Curc.* 3. Le *Charanſon à corcelet ſillonné.*

Fuſco-nebuloſus; *thorace* ſulcato; *elytris* ſtriatis.

49. *Nigro-ſuturatus*, die *Schwarznath.**)

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 279. *Curc.* 4. Le *Charanſon à ſouture noire.*

Oblongus; *elytris* villoſo-cinereis, *ſutura nigra.*

50. *Carduelis*, der *Diſtelrüſſelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 281. *Curc.* 8. Le *Charanſon tacheté des têtes de chardon.*

Niger, ſtriatus, *maculis villoſo-fuſcis* nebuloſis.

51. *Pulverulentus*, der *beſtäubte Rüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 75. Totus fuſcus; *thorax* punctis prominulis ſcaber; *elytra* transverſim rugoſa.

52. *Centaureae*, der *Skopoliſche Flockenblumen-Rüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 76.

Fuſcus totus ovatus, tenui ſubrufo villo adſperſus; *roſtro* deflexo marginato; linea ad apicem elevata media.

53. *Auratus*, der *goldne Rüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 77.

Totus *viridi-auratus*; antennis roſtrique apice dilatato nigris.

54. *Ico-*

*) Nach *Fabric.* iſt es C. L. *paraplecticus* No. 34. Nach *Müllers* Zool. p. 89. No. 998. vermuthlich *Similis*, wie das *Fragzeichen* anzeiget. S. No. 8. 3. Kl.

54. *Icosandriae*, der *achtgestreifte Rüsselkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 85. Color atro-coeruleus. *Rostrum* porrectum. *Elytrum* octo-striatum.

55. *Coerulescens*, der *himmelblaue Rüsselkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 87. Color obscure coeruleus; *rostrum* deflexum; *elytrum* decem-striatum.

56. *Oleraceus*, der *Kohlrüsselkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 88. Globosus, nigricans, *elytris* puncto lineaque lunata ad apicem albi coloris.

57. *Pellucens*, der *durchsichtige Rüsselkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 90. No. 41.

Longirostris, muticus, alatus, parvus, flavicans; *oculis* et *rostri* apice nigris.

58. *Piceus*, der *pechfarbige Rüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 221. No. 14. *Charanson couleur de poix.*

Longirostris; *antennis* fractis fuscis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo nigro piceo.

59. *Nigro-gibbosus*, der *Schwarzhöker.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 224. No. 17. *Charanson noir bossu.*

Longirostris; *antennis* fractis, *femoribus* muticis; *corpore* ovato nigro; *elytris* tuberculatis postice cinereis.

60. *Castaneus*, der *kastanienbraune Rüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 231. No. 19.

Longi-

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo fusco-castaneo subtus nigro, *elytris* striato-punctatis gibbosis.

61. *Fasciatus*, der *graubandirte Rüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 234. No. 21. *Charanson rayé à longue trompe.*

Longirostris, *antennis* fractis, *femoribus* muticis; *corpore* oblongo nigro-fusco; fasciis longitudinalibus griseis.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 2274.
Cinereus; *fasciis* longitudinalibus dilutioribus.

62. *Plantaginis*, der *Wegerichrüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 237. No. 24. t. 7. f. 17. 18. *Charanson du Plantain.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* ovato griseo; *thorace* fasciis elytris macula magna punctisque fuscis.

63. *Rostratus*, der *Schnauzenrüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 252. No. 42. t. 7. f. 27. 28. *Charanson à museau.*

Longirostris; *antennis* rectis; *corpore* oblonge rufo; *capite* elytrisque viridi-coeruleis nitidis.

64. *Melanocephalus*, der *surinamische Schwarzkopf.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 272. No. 6. t. 15. f. 27. *Charanson à tête et trompe noires.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* subgloboso fusco; *capite* rostroque nigris *elytris* gibbis.

65. *Fru-*

65. *Frugilegus*, der *surinamische Kornrüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 273. No. 7. *Charanson des grains.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo castaneo; *coleoptris* maculis quatuor rufis; *thorace* longitudine elytrorum.

66. *Nomas*, der *russische Nomas.*

Pallas Reis. I. Anh. No. 31. Ausz. I. S. 11. No. 31.

Longirostris, oblongus, alatus; *femoribus* muticis; corpore subtus albo-tomentoso; *elytris* canescentibus, striis punctato-sulcatis.

Müllers Supplem. B. S. 230. No. 40.

67. *Piceus*, der *russische pechfarbige Rüsselkäfer.*

Pallas Reis. I. Anh. No. 34. Ausz. I. S. 12. No. 34.

Totus piceus; Curc. *Palmarum* egregie similis, sed quadruplo minor; *elytris* abdomen aequantibus.

Müllers Supplem. B. S. 232.

68. *Longimanus*, die *kapensische Langhand.*

Fabric. App. S. E. pag. 822. *Longirostris*; nigricans, *elytris* ferrugineis; rostro emarginato; *pedibus* anticis longioribus. Magnitudo fere *6 palmarum.*

II. *Springende Langrüssel mit dicken Hinterschenkeln.*

1. *Foliorum*, der *Blätterrüsselkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 10. No. 102.

Longirostris, pedibus saltatoriis; *corpore* femoribusque atris; *antennis* pedibusque luteis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1010.

2. *Subater*, das *schwärzliche rauche Springrüſſelkäferchen.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1005.
Tomentoſus, elytris ſtriatis; antennis tarſisque flavis.

3. *Teſtaceus*, der *muſchelbraune Springrüſſelkäfer.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1006.
Pallide flavus; *elytris* ſtriatis; *oculis abdomineque* nigris.

4. *Rufus*, der *fuchſichte Springrüſſelkäfer.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1007.
Elytris ſtriatis; *oculis* abdomineque nigris.

5. *Setoſus*, der *borſtige Springrüſſelkäfer.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 90. No. 1008.
Rufus, *oculis*, *pectore abdomineque* baſi nigris.

6. *Alni*, das *engliſche Erlen-Springrüſſelkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 144. No. 90.
Pedibus ſaltatoriis, niger; *coleoptris* teſtaceis; *maculis* duabus obſcuris.

7. *Viminalis*, das *deutſche Bindweiden-Springrüſſelkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 92.
Longiroſtris; *pedibus ſaltatoriis*; corpore teſtaceo.

8. *Vlmi*, der *Ulm- oder Rüſter-Springrüſſelkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 260. No. 48. t. 8. f. 5. *Charanſon ſauteur de l'Orme.*

Curc. *(Saltator Vlmi)* longiroſtris, corpore ovato flavo-teſtaceo, *oculis* nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 286. *Curc.* 19. Le *Charanſon ſauteur brun.*

Rufus, *femoribus* poſticis craſſioribus; *elytris* rufis.

Reaum. Inf. Tom. 3. p. 31. t. 3. f. 17. 18.

III. *Langrüſſel mit gezähnelten Schenkeln.*

1. *Colon*, der *Kolonrüſſelkäfer.*

Linn. Mantiſſ. p. 531.

Longiroſtris caneſcens; *femoribus* anticis *ſubdentatis;* thorace vtrinque linea elytrisque *puncto albo.*

Fabric. S. E. p. 130. No. 12.

Longiroſtris, griſeus; elytris *puncto albo.*

Scop. Entom. carn. No. 104. Cureulio *paluſtris.*

Proboſcis thorace longior; *thorax* linea laterali pallidiore — elytra coadunata, cineraſcentia, *albo puncto* in medio ſignata.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 280. *Curc.* 6. Le *Charanſon à deux points blancs.*

Oblongus, fuſcus; *thoracis* lateribus albidis; elytris ſtriatis, *puncto albo.*

Schaeff. Icon. t. 155. f. 2.

Müllers Supplem. B. S. 229. der *Kolonkäfer.*

2. *Arator*, der *Kornährenrüſſelkäfer.*

Linn. Mant. p. 531.

Longiroſtris, ſubovatus; *thorace* fuſco, lineis tribus pallidis; *elytrorum* ſutura nigro-dentata; pedibus fuſcis *edentulis.*

Müllers Supplem. B. S. 229. der *Pflüger.*

3. *Muricatus*, der *amerikaniſche Warzenrüſſelkäfer.*

Drury Inſ. Tom. II. t. 34. f. 4.

Totus

Totus fusco-nigricans, *elytris* verrucosis striatis; *femoribus* vnidentatis.

4. *Longimanus*, die *englische Langhand.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 32: No. 32. Longirostris; *femoribus* dentatis, *manibus longissimis.*

5. *Pollinarius*, der *englische bestäubte Rüsselkäfer.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 33. No. 33. Longirostris; *femoribus* omnibus dentatis; *elytris* depressis planis abbreviatis; ventre, elytrorum margine et pedibus *polline* adspersis.

6. *Albicans*, der *Russische Weißafter.*

Lepechins Tageb. 2. Th. S. 206. t. 10. f. 6. Longirostris; tuberculis thoracis 5; elytrorum 6; *ano albo;* tibiis dentatis.

7. *Vrticae*, der *Nesselrüsselkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 88. No. 983. Niger planiusculus; *thorace* vtrinque dentato; *elytris* striatis, postice bipunctatis.

8. *Similis*, der *dem Braunwurzrüsselkäfer ähnliche.**)

Müllerі Zool. Dan. Prodr. pag. 89. No. 998. Subglobosus rufus; *elytrorum* lineis elevatis, albo nigroque tessulatis.

*) Nach dem *Müller* ist dieses des *Geoffroi* Curc. 4. T. I. p. 279. Nach *Fabricio* aber dieser *Geoffroische* des Linn. Curc. *paraplecticus* No. 34. S. No. 49. 1. Kl.

9. *Bidens*, der *neuseeländische zweygezähnte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 136. No. 51. Longirostris; *femoribus* posticis dentatis niger; *elytris* vnispinosis.

10. *Scaber*, der *kayennische hökrichte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. pag. 137. No. 54. Longirostris; *femoribus* dentatis; *elytris* sulcatis, tuberculato spinosis.

11. *Cylindrirostris*, der *neuholländische Walzenrüssel.*

Fabric. S. E. p. 137. No. 55. Longirostris; *femoribus* dentatis; *thorace* scabro; *elytris* postice bituberculatis.

12. *Caliginosus*, der *englische schwarzdunkle Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 137. No. 58. Longirostris; *femoribus* dentatis, oblongus; *elytrorum* striis punctatis approximatis.

13. *Reticulatus*, der *trankebarische Rüsselkäfer mit netzförmigen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 138. No. 60. Longirostris; *femoribus* dentatis; oblongus, piceus; elytris *reticulatis*; fasciis obliquis pallidis; *tibiis* anticis spinosis.

14. *6-guttatus*, der *amerikanische Sechstropf.*

Fabric. S. E. p. 138. No. 62. Longirostris; *femoribus* dentatis, niger; *elytris* maculis tribus albis.

15. *Luri-*

15. *Luridus*, der *neuholländische dunkelschwarze Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 138. No. 63. Longirostris; *femoribus* dentatis, ovatus, obscure niger; *elytris* punctato-striatis.

16. *Meditabundus*, der *neuholländische ernsthafte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 139. No. 64. Longirostris; *femoribus* dentatis; *elytris* striatis, postice acuminatis.

17. *Stupidus*, der *neuholländische unansehnliche Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 139. No. 65. Longirostris; *femoribus* dentatis, niger, *thoracis* lateribus rotundatis, *elytris* subspinosis.

18. *Mangiferae*, der *Rüsselkäfer in den Kernen der Mangasfrucht.*

Fabric. S. E. p. 139. No. 66. Longirostris; *femoribus* dentatis, griseus, *thorace* linea, punctisque duobus dorsalibus albis.

19. *Gravis*, der *kapensische rostfarbig gescheckte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 140. No. 69. Longirostris; *femoribus* dentatis, niger, *elytris* ferrugineo variegatis, *femoribus* canaliculatis.

20. *Haemorrhoidalis*, der *neuholländische Rothafter.*

Fabric. S. E. p. 140. No. 71. Longirostris; *femoribus* dentatis; *thorace* fusco, lateribus cinerascentibus; *elytrorum* sutura apice ferrugineo.

21. *Trimaculatus*, der *elsassische Dreyfleck.*

Fabric. S. E. p. 141. No. 72. Longirostris; *femoribus* dentatis; *coleoptris* nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata.

22. *Litura*, der *europäische Rüsselkäfer mit der schwarzen Rückenlinie.*

Fabric. S. E. p. 141. No. 73. Longirostris; *femoribus* dentatis, albo nigroque varius, rostro atro; thoracis *linea dorsali nigra.*

23. *Proboscideus*, der *nördlichamerikanische Rüsselkäfer mit ausserordentlich langem Rüssel.*

Fabric. S. E. p. 142. No. 78. Longirostris; *femoribus* dentatis; griseus, *rostro corpore duplo longiore.*

24. *Varius*, die *kayennische Schecke.*

Fabric. S. E. p. 142. No. 79. Longirostris; *femoribus* dentatis omnibus, *griseo nigroque varius*, rostro pedibusque rufis.

25. *Cerasorum*, der *englische Kirschrüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 142. No. 80. Longirostris; *femoribus* dentatis, fuscus, scutello, elytrorumque fasciis obsoletis cinereis.

26. *Amoenus*, der *neuholländische anmuthige Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 142. No. 81. Longirostris; *femoribus* dentatis, ater, thorace punctis duobus; *coleoptris* quinque niveis.

27. 4-pu-

27. *4-pustulatus*, die *kapensische Vierblatter.*

Fabric. S. E. p. 144. No. 88. Longirostris; *femoribus* dentatis, niger, *elytris* maculis duabus ferrugineis.

28. *Elongatus*, der *jamaische lange Brustschild.*

Fabric. S. E. p. 144. No. 89. Longirostris; *femoribus* dentatis; *thorace elongato;* tibiis anticis bidentatis.

29. *Tuberculosus*, der *Rüsselkäfer mit vier Reihen Hökern auf den Deckschilden.*

Scop. Ent. carn. No. 80. Niger, *thorace* lateribus albidis; *elytro seriebus 4 tuberculorum.*

30. *Carriosus*, der *Rüsselkäfer in den faulen Birnstämmen.*

Scop. Entom. carn. No. 81. Oblongus, rostro porrecto; tereti, nitidulo, *elytris* striatis; *femoribus* anticis crassioribus et majore dente notatis.

31. *Syngenesiae*, das *hirschfarbige rauche Rüsselkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 82. *Cervinus*, brevissimis villis adspersis, rostro nigro; apice nitido.

32. *Fuscus*, der *braune Rüsselkäfer mit weissem Rückenschild.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 300. *Curc.* 50. Le *Charanson brun à ecusson blanc.*

Fuscus, *scutello* puncto albo, *elytris* macula rubescente.

33. *Fraxini*, der *Eschenrüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 212. No. 4. *Charanson du Fresne.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* subgloboso griseo; *coleoptris* macula magna fusca dorsali.

34. *Vlmi*, der *Rüsterknospen-Rüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 215. No. 8. t. 6. f. 26. 27. *Charanson des boutons de l'Orme.*

Longirostris; *antennis* fractis, *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo rufo-fusco; *elytris* macula nigricante, proboscide nigra.

35. *Pulverulentus*, der *surinamische Puderkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 268. No. 3. t. 15. f. 24. *Charanson poudré.*

Longirostris; *antennis* fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro; *elytris* cinereo maculatis.

36. *Crucifer*, der *Kreuzträger.*

Pallas Reis. I. Th. Anh. No. 35. Ausz. S. 12. No. 35.

Aequalis Curc. *Scrophulariae*, *subtus* flavo-cinereus tomento nitido; *supra* fuscus; *elytris* nota ad scutellum *cruciformi;* femora omnia dentata.

Müllers Supplem. B. S. 231. No. 67.

37. *Ireos*, der *Iris-Rüsselkäfer.*

Pallas Reis. II. Th. Anh. No. 57.

Triplo major *Scrophul. corpus* totum candidum.

Müllers Supplem. B. S. 230. No. 67. der *Schwertelkäfer.*

IV. *Kurzrüſſel mit gezähnelten Schenkeln.*

1. *Gemmatus*, der *äugigte Rüßelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 90. *Apterus*, niger; *elytris* coadunatis ſcabris maculatis; *maculis argenteo-viridibus.*

Naturforſcher 6. St. S. 97. t. 4. f. 6.

2. *Anthracinus*, der *kohlſchwarze Rüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 92. Totus niger, *elytra* punctatim ſtriata; *femora* omnia vnidentata.

3. *Triſtis*, der *Trauerrüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 93. Fuſcus, *elytra* punctis ſcabra, ſubſtriata, villoſula, coadunata.

4. *Infidus*, der *Rüſſelkäfer von betrügeriſcher Farbe.*

Scop. Ent. carn. No. 94. Nudis oculis inſpectus *obſolete cupreus;* ad lentem vero *coeruleſcentibus* nitidis proſtratis *villis* ſuperne adſperſus haeret.

5. *Pruni*, der die *Pflaumenblätter zuſammenwickelnde Rüſſelkäfer.*

Villoſulus niger; *antennis elytris pedibus*que rufis.

6. *Coeleſtinus*, der *ganz himmelblaue Rüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 96. Totus coeruleus; antennis pedibusque *ſanguineis.*

7. *Glaucus*, der *blaugraulichte Rüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 97. Fuſcus, *glauceſcente* tenui villo adſperſus, nullibi ſcaber; *elytris* punctatim ſparſis.

8. *Rufipes*, der *Skopolischе Rothfuß.*

Scop. Entom. carn. No. 98. Fuscus, villosulus, parumper nitens, *antennis pedibusque rufis.*

9. *Roeselii*, das *Röselsche Nelkenrüsselkäferchen.*

Rösels Insektenbelust. III. B. S. 391. t. 67. f. A, B, C, D.

Crassirostris; *elytris* fusco-fulvis, lineis elevatis sulcatis; *thorace* obscure-viridi, linea longitudinali ad finem proboscidis *alba.*

10. *Levistici*, der *Müllersche Liebstöckel-Rüsselkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 963. Niger, *elytris* substriatis; *oculis* rufis.

11. *Punctatus*, der *Müllersche Blaßpunkt.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 964. Ater, *elytris* subsulcatis, *pallide punctatis;* oculis rufis.

12. *Squamifer*, der *Schuppenträger.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 968. Oblongus; *elytris* griseo-nigroque striatis.

13. *Spectabilis*, der *neuholländische schöne Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 155. No. 144. Brevirostris; *femoribus* dentatis; corpore *viridi nigroque variegato.*

14. *Sulcatus*, der *sächsische gefurchte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 155. No. 146. Brevirostris; *femoribus* dentatis, ater, *elytris* striatis; ferrugineo-maculatis.

15. *Viri-*

15. *Viridarius*, der *tranquebarische Grünling.*

Fabric. S. E. p. 155. No. 149. Breviroſtris; *femoribus* dentatis, viridis; ore antennisque nigris, oculis atris.

16. *Attelaboïdes*, der *braſilianiſche attelabusförmige Rüſſelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 156. No. 152. Breviroſtris; *femoribus* dentatis; roſtro elytrisque vnituberculatis.

17. *Coronatus*, der *gekrönte Rüſſelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 291. *Curc.* 34. Le *Charanſon à corcelet couronné.*

Niger, apterus; *thorace* vtrinque puncto duplici fulvo; baſi pilis fulvis *coronata.*

18. *Tigris*, der *gefleckte Tiger.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 292. *Curc.* 35. Le *Charanſon tigrée.*

Niger, *maculis* villoſo-flavis, *elytris* ſubrugoſis.

19. *Rugoſo-ſtriatus*, der *geſtickte Rüſſelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 293. *Curc.* 37. Le *Charanſon cartiſanne.*

Fuſcus, apterus, *elytris* rugoſo-ſtriatis.

20. *Geographicus*, der *geographiſche Rüſſelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 294. *Curc.* 40. Le *Charanſon geographique.*

Subgloboſus, nigro-fuſcus, *ſquamoſus*, lineolis albis variegatus.

21. *Trans-*

21. *Transverso-vittatus*, die *Queerstreife.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 295. *Curc.* 41. Le *Charanson brun à bandes transverses de taches blanches.*

Fuscus; *elytris* striatis; macularum albarum *fascia triplici transversa.*

22. *Albo-punctatus*, der *Weißpunkt.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 299. *Curc.* 47. Le *Charanson brun à points blancs.*

Subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus; *elytrorum* maculis tribus et apice albis.

23. *Sericeus*, der *Sammetrüsselkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 300. *Curc.* 52. Le *Charanson velouté.*

Obscure rufus, *villis* cinereis adspersus; *rostro* thorace breviore.

24. *Virgo*, die *Jungfrau.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 301. *Curc.* 53. Le *Charanson vierge.*

Oblongus; villis cinereis adspersus, *rostro* thorace aequali.

25. *Griseo-punctatus*, der *Graupunkt.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 217. No. 9. *Charanson noir à points gris.*

Breviroſtris; *antennis* longis fractis; *femoribus* dentatis; *corpore* oblongo nigro; *punctis* flavescentibus sparsis.

V. *Kurzrüſſel mit ungezähnelten Schenkeln.*

1. *Scabriculus*, das *gehökerte Rüſſelkäferchen.*

Linn. Mantiſſ. p. 531. Breviroſtris, *femoribus* muticis, cinereus, *elytris* hiſpidis.

Fabric. S. E. p. 149. No. 113. Breviroſtris; *corpore* cinereo hiſpido.

Müllers Supplem. B. S. 233. No. 96. g. der *Stachelkäfer.*

2. *Singularis*, der *ſeltſame Rüſſelkäfer mit ausgehöhlten Punkten.*

Linn. Add. p. 1066. No. 3. Subbreviroſtris, cinereus; *elytris* ſtriis punctatis; *punctis* excavatis centro eminentibus.

Müllers Supplem. B. S. 232. No. 96. e. der *Warzenkäfer.*

3. *Carinatus*, der *Rüſſelkäfer mit eckigen gehökerten Flügeldecken.*

Linn. Add. p. 1066. No. 4. Subbreviroſtris, niger; *thorace* ſubcarinato, *elytris* angulatis tuberculatis.

Müllers Supplem. B. S. 233. N. 96. f. der *Kielkäfer.*

4. *Aurifer*, die *jamaiſche Goldſtreife.*

Drury Inſ. Tom. I. t. 32. f. 1.

Fabric. S. E. p. 147. No. 103.

Breviroſtris, *corpore* ferrugineo, *aureo-maculato.*

5. *Globoſus*, der *kapenſiſche küglichte Rüſſelkäfer.*

Drury Inſ. Tom. I. t. 32. f. 4.

Fabric. S. E. p. 153. No. 135.

Breviroſtris; *thorace* ſpinoſo, quinque ſulcato; *elytris* laevibus.

6. *Im-*

6. *Imperialis*, der *brasilianische majestätisch prächtige Rüsselkäfer.*

Drury Ins. Tom. II. t. 34. f. 1.

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 34. No. 34. Breviroſtris ater; *femoribus* muticis; *thoracis* linea longitudinali; *elytrorum*que punctis per ſticas diſpoſitis *viridi-inauratis.*

7. *Rufescens*, der *jamaische Fuchs.*

Drury Ins. Tom. II. t. 33. f. 4.

Cupreo-fulvus totus, breviroſtris; *femoribus* muticis; *elytris* ſubſtriatis.

8. *Similis*, der *jamaische grauschwärzlich gestreifte dem vorigen sehr ähnliche Rüsselkäfer.*

Drury Ins. Tom. II. t. 34. f. 3.

Totus griſeo-nigro-ſtriatus; *elytris* nigris, viridi-aureo-maculatis.

9. a. *Ornatus*, der *kupferfarbige große ausländische Prachtrüßelkäfer mit grauen Punktſtreifen.*

Drury Ins. Tom. II. t. 34. f. 3.

Nigro-cupreo-fuſcus; *thorace* linea lata longitudinali nigra griſeo-lunulata, *elytris* punctis griſeis ſtriatis; *femoribus* rubro-maculatis.

9. b. *Niger*, der *schwarze Rüsselkäfer von der S. Johannisinsel.*

Drury Ins. Tom. II. t. 34. f. 2.

Totus niger, *capite* brevi, rotundatoque; breviroſtris, *femoribus* muticis; *elytris* ſtriatis.

10. *Oede-*

10. *Oedematosus*, der *amerikanische Oehlbein-Rüsselkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 40. t. 4. f. 10.
Niger, glaber, politus; *elytris* rubreis.

11. *Noveboracensis*, der *neuyorkische graue schwarz und weiß punktirt gestreifte Rüsselkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 35. No. 35.
Breviroſtris, muticus, *canus; elytris* subfastigiatis; striis quinque albidis nigro-punctatis, scutello flavicante.

12. *Melanogrammus*, der *schwärzlich gezeichnete englische Rüsselkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 36. No. 36. Breviroſtris; *femoribus* muticis; *corpore* cano; sutura elytrorum antice nigra, nitida, roſtro breviſſimo.

13. *Cypri*, der *Haßelquistische Cyprische Rüsselkäfer.*

Haßelqu. Reis. S. 449. No. 100.
Mediocris, sulcus, *linea* longitudinali atra in dorso.

14. *Albicans*, der *russische graulich weisse Rüsselkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 313. t. 17. f. 7.
Breviroſtris, apterus, supra *albicans;* infra dilute *roseus;* thorace bicuspidato; *elytris* sulcatis, punctis canis adspersis.

15. *Nassiformis*, der *Rüsselkäfer mit der Reuse.*

Lepechins Tageb. II. Th. S. 203. t. 11. f. 27.
Breviroſtris; *corpore* cano; *elytris* sulcatis nigromaculatis.

16. *2-pun-*

16. *2-punctatus*, der *Rüſſelkäfer mit zween Punkten.*

Lepechins Tageb. II. Th. S. 205. t. 11. f. 25.

Brevirostris; *thorace* scabro; *elytris* nebulosis; punctis 2 prope apicem nigris nitidis.

17. *Guttatus*, der *tüpfelichte Rüſſelkäfer.*

Lepechins Tageb. II. Th. S. 205. t. 11. f. 30.

Brevirostris niger, vellere rufescente obsitus punctulis innumeris nigris in elytris transparentibus.

18. *Piger*, der *Faullenzer.*

Scop. Entom. carn. No. 65.

Rostrum striis elevatis senis, lateralibus apice conjunctis; *femora* antica clavata.

19. *Resinosus*, der *Harzpflanzenrüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 67. Niger, scaber; *abdomine* subtus; *elytrisque* apice albidis.

20. a. *Iners*, der *zehngeſtreifte punktirte Rüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 68. *Rostrum* linea vnica elevata; *elytrum* striis 10 punctatis.

20. b. *Piceus*, der *Pechrüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 69. *Thorax* et *elytra* picea; *abdomen* nigrum; subtus albidum; *femora* clavata.

21. *Erraticus*, der *Schwärmer.*

Scop. Entom. carn. No. 70. *Rostrum* apice concavum; *elytrum* villosulum; striatum; stria tertia tuberculata.

22. *Populi*,

22. *Populi*, der *Pappelnrüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 74. Color, facies, et omnia Curc. *Linn. Fagi* No. 44. ſed *femora* aequalia.

Füeßlins Verz. S. 11. No. 216.

23. *C-album*, das *Skopoliſche weiſſe C.*

Scop. Ent. carn. No. 99. Cupreo-nigroque varius; angulo externo baſeos *elytri* ſinguli linea arcuata alba, *litteram C.* referente ſignato.

24. *Senſitivus*, der *empfindliche Rüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 100. Niger; *femoribus* fulvis, apice nigris; captus valde ſe torquens.

25. *Nemoreus*, der *Skopoliſche Waldrüſſelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 101. Apterus niger, opacus; *roſtro* bifido; *capite* glabro; *thorace elytrisque* ſcabris acuminatis.

26. *Momus*, der *Skopoliſche Momus.*

Scop. Ent. carn. No. 102. *Proboſcis* ſuperne ſulcis duobus; *abdomen* inter pedes poſticos fulvo villo tomentoſum; *femora* antica craſſiora.

27. *Zoilus*, die *Skopoliſche Schècke.*

Scop. Ent. carn. No. 103. *Roſtrum* deflexum; *elytrum* ſtriatum; et punctis nigris variegatum, vno majore communi ad apicem.

Füeßlins Verz. S. 11. No. 217.

28. *Quercus*, der *Skopoliſche Eichenrüſſelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 106. Niger, *ſcutello* trilobo; lobo antico albo, *elytro* vnipunctato; puncto albo.

29. *Punctatus*, der *Skopolische punktirte Rüsselkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 107. Niger, *thorace* albido; *elytro* striis elevatis 5 nigris, albo-punctatis.

30. *Fasciatus*, der *Skopolische bandirte Rüßelkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 108. Rufus, villosulus; *elytro* fasciis duabus obscurioribus, obsoletis.

31. *Praecox*, der *frühzeitige Rüßelkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 109. Ferrugineus, *elytra* striata, villosula, sub finem *Aprilis.*

32. *Tricolor*, der *dreyfarbige Rüßelkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 91. No. 45. Breviroſtris, inermis, niger, *thorace* punctis binis albis; *elytra* punctata margine interno albo lineisque binis longitudinalibus flavis.

33. *Candidatus*, der *russische Weißbauch.*

Pallas Reis. I. Anh. No. 32. Ausz. I. S. 11. No. 32. Breviroſtris, oblongus, *subtus pedibusque albus; femoribus* muticis.

Müllers Suppl. B. S. 231. No. 96. der *Candidat.*

34. *Pictus*, der *gemahlte Rüßelkäfer.*

Pallas l. c. No. 33. Alatus, minor, pulcherrimus, albus; *breviroſtris; thorax* fasciis tribus longitudinalibus.

Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96.

35. *Inderiensis*, der *weisse Rüßelkäfer am inderischen See.*

Pallas

Pallas l. c. No. 36. Breviroſtris, *femoribus* muticis, totus albus; *thorax* ſcaberrimus, mucroneque vtrinque conico cornutus; *elytra* ſtriis profunde punctatis.

Müllers Suppl. B. S. 232. No. 96. d.

36. *Dentiroſtris*, der *Zahnrüßel.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 85. No. 941. Ovatus, niger; roſtro apice *quadridentato.*

37. *Tardus*, der *Träge.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 942. Nigricans; *thorace* elytrisque vtrinque rufis; macula apicis atra.

38. *Murinus*, der *mauſefahle Rüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 943. Ovatus, nigricans, *elytris* pallide maculatis.

— — Faun. Fridr. p. 12. No. 116.

39. *Faſciatus*, der *Müllerſche bandirte Rüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 944. Oblongus ater; *thorace* vtrinque; *elytris* faſciis duabus ſuturaque albis tomentoſis.

40. *Nodoſus*, der *knotige Rüßelkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 948. Caneſcens; elytris *nodulis* minimis ſtriatis.

Olaffs Reiſ. durch Isl. I. Th. S. 319. *Silakkepr.*

41. *Longicornis*, das *Müllerſche Langhorn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 86. No. 949. Nigricans; *thorace* hirto; *elytris* cinereis; *maculis* flavicantibus; *pedibus* antennisque rufis.

42. *Opacus*, der *dunkelgraue Rüßelkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 950. *Griseus* absque striis et punctis.

43. *Latirostris*, der *Müllersche Breitrüßel.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 951. *Griseus*, antennis pedibusque rufescentibus.

44. *Maculosus*, der *gelbgefleckte Rüßelkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 952. Ovatus, obscure flavicans; *elytris luteo-maculatis.*

45. *Carinatus*, der *gewölbte Rüßelkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 955. Cervinus, ovatus; *elytris* lineis tribus elevatis; sutura postice *carinata.*

46. *Striatus*, der *dreyfach gestreifte Brustschild.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 46. No. 956. Elongatus, cinereus; *thorace* terlineato; *antennis* nigris.

47. *Mollis*, die *weiche Flügeldecke.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 960. Brevirostris, griseo-auratus; nitens, *femoribus* muticis; *elytris mollibus.*

Act. Nidr. IV. p. 12. t. 16. f. 6.

48. *Fasciatus*, die *Rothbinde.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 87. No. 961. Brevirostris, griseo-nitens; *fasciis elytrorum* vndulatis ferrugineis.

Act. Nidr. IV. p. 13.

49. *Bispi-*

49. *Bispinus*, der *Zweydorn.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1023. *Rhinom.* coeruleus; *thorace* vtrinque *spinoso;* antennis nigris.

Schaeff. Icon. t. 6. f. 4.

50. *Inermis*, der *unbewehrte Rüßelkäfer.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1025. *Rhinom.* violaceus; *thorace* mutico; puncto vtrinque impresso; *antennis* nigris.

Schaeff. Icon. t. 56. f. 8.

51. *Marginatus*, der *amerikanische Goldrand.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 96.

Breviroſtris, fuscus; *elytrorum* futura abdominisque *marginibus aureis.*

52. *19-punctatus*, der *kayennische Neunzehnpunkt.*

Fabric. S. E. p. 145. No. 97.

Breviroſtris, canescens; *thorace* punctis nigris quatuor; coleoptris *novendecim.*

53. *Decorus*, der *brasilianische zierliche Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 146. No. 99.

Breviroſtris, supra fuscus; *thorace coleoptrisque* vittis duabus *viridi-aureis.*

54. *Nitidulus*, der *kayennische Grünglanz.*

Fabric. S. E. p. 146. No. 100.

Breviroſtris; *femoribus* muticis, viridi-tomentosus; *elytris* punctatis.

55. *Candidus*, der *kayennische Weißdorn.*

Fabric. S. E. p. 146. No. 101.

Breviroſtris; *femoribus* muticis; *elytris spinosis albis;* macula laterali fusca.

56. *Crenulatus*, der *neuholländische geriefte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 147. No. 105.

Breviroſtris, cinereus; *elytris* tribus lineis elevatis, *crenulatis*, atris.

57. *Longimanus*, die *braſilianiſche Langhand.*

Fabric. S. E. p. 147. No. 107.

Breviroſtris, fuſcus; *thorace* margine punctisque duobus ferrugineis, *pedibus anticis elongatis.*

58. *Griſeus*, der *engliſche graue Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 148. No. 108.

Breviroſtris, *ſupra* griſeo-fuſcus, *ſubtus* cinereus, roſtro canaliculato.

59. *3-guttatus*, der *engliſche Dreytropf.*

Fabric. S. E. p. 148. No. 109.

Breviroſtris, nigricans, *elytris* griſeis; maculis duabus albis; poſteriori majori communi.

60. *Coryli*, der *engliſche Haſelnußkäfer.*

Fabric. S. E. p. 148. No. 110.

Breviroſtris; cinereo-fuſcoque varius; *elytrorum* ſutura dimidiata, atra.

61. *Lunatus*, der *engliſche Schwarzmond.*

Fabric. S. E. p. 148. No. 112.

Breviroſtris; *coleoptris* elevato-ſtriatis, faſcia ſemicirculari maculaque poſtica albis; *lunula nigra.*

62. *Triſtis*, der *Trauerkäfer.*

Fabric. S. E. p. 149. No. 117.

Breviroſtris, niger, *elytris* ſtriatis cinereis.

63. *Adspersus*, der *neuholländische besprengte Rüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 149. No. 118.
Breviroſtris, ater; *elytris* poſtice albo-maculatis.

64. *Punctatus*, der *ſchwediſche Punktrüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 150. No. 119.
Breviroſtris, fuſcus; *elytris* punctis holoſericis elevatis, margineque flavo.

65. *Obſcurus*, der *ſchwediſche dunkelroſtfarbige Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 150. No. 120.
Breviroſtris, ovatus, ferrugineo-fuſcus.

66. *Niger*, der *ſchwarze deutſche Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 150. No. 121.
Breviroſtris, ovatus, *niger*, ſcaber, pedibus rufis.

67. *Varioloſus*, der *ſächſiſche Blatterkäfer.*

Fabric. S. E. p. 150. No. 122.
Breviroſtris, niger; thorace carinato *varioloſo*; elytris ſtriatis.

68. *Valgus*, der *amerikaniſche ſperrbeinige Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 150. No. 123.
Breviroſtris, ater, nitens; *elytris* punctato-ſtriatis; *femoribus* annulo cinereo.

69. *Rohrii*, der *amerikaniſche Rohriſche Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 151. No. 126.
Breviroſtris; *elytris* acuminatis griſeis; margine baſeos flaveſcente.

70. *Latirostris*, der *sächsische Breitrüßel.*

Fabric. S. E. p. 151. No. 128.

Brevirostris; rostro latissimo; explanato; *elytris* apice albis, punctis duobus nigris.

71. *Vitulus*, das *Feuerländische Kalb.*

Fabric. S. E. p. 152. No. 131.

Brevirostris, niger; *fronte* bidentato; *elytris* vnispinosis.

72. *Acuminatus*, der *neuseeländische Spitzflügel.*

Fabric. S. E. p. 152. No. 132.

Brevirostris, cylindricus, fuscus, *elytris* apice acuminatis.

73. *Cultratus*, der *neuholländische zweyhökrichte Brustschild.*

Fabric. S. E. p. 153. No. 136.

Brevirostris; *thorace* tuberculis duobus compressis; *elytris* tuberculatis, postice cinereis.

74. *Tribulus*, der *neuholländische Dornträger.*

Fabric. S. E. p. 153. No. 138.

Brevirostris, cinereus; *thorace* scabro; antice impresso; *elytris spinosis.*

75. *4-dens*, der *neuholländische Vierzahn.*

Fabric. S. E. p. 153. No. 139.

Brevirostris, cinereus; *thorace* scabro; *elytris* spinosis; *spinis* quatuor posticis longioribus.

76. *Clavus*, der *neuholländische Keulrüßel.*

Fabric. S. E. p. 154. No. 140.

Brevirostris, albicans; *thorace* canaliculato; *coleoptris* spinosis; lineolis tribus baseos rubris.

77. *No-*

77. *Noduloſus*, der *kapenſiſche knotige Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 154. No. 141.

Breviroſtris; *thorace* lineis ſex *noduloſis;* elytris ſpinoſis.

78. *Ocellatus*, der *madagaſkariſche äugigte Rüßelkäfer.*

Fabric. S. E. p. 154. No. 143.

Breviroſtris; *thorace* ſpinoſo, antice excavato; *elytris* cinereis, punctis atris ſubſpinoſis.

79. *Obeſus*, der *kapenſiſche Dickbauch.*

Fabric. App. S. E. p. 822.

Breviroſtris, ater; *thorace* ſpinoſo; inaequali, *elytris* rubris, punctis nigris confertis.

80. *Rubifer*, der *kapenſiſche Rothdorn.*

Fabric. S. E. App. p. 822.

Breviroſtris, cinereus; *thorace* ſcabro; elytris ſpinis elevatis *ſanguineis.*

81. *Globifer*, der *kapenſiſche Kugelträger.*

Fabric. S. E. App. p. 823.

Breviroſtris; *thorace* ſcabro; *elytris* ſpinoſis, poſtice acuminato.

82. *Transverſo-faſciatus*, die *Queerſtreife.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 280, *Curc.* 7. Le *Charanſon à deux bandes transverſes.*

Nigro-fuſcus; *thorace* vtrinque *faſcia* longitudinali; *elytris* duplici transverſa cinerea.

83. *Striato-punctatus*, die *Punktstreife.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 281. *Curc.* 9. Le *Charanſon brodé.*

Niger; *thorace* punctato; *elytris* alternatim ſtriatis et punctatis.

84. *Sulcatus*, der *Geoffroiſche gefurchte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 282. *Curc.* 11. Le *Charanſon noir à ſillons.*

Oblongus, totus niger; *thorace* punctato; *elytris* ſulcatis.

85. *Cupreo-ſquamoſus*, die *Kupferſchuppe.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. *Curc.* 14. Le *Charanſon ecailleux à bandes.*

Roſtro thorace breviore; *ſquamis* nitentibus; *thoracis elytrorumque* faſciis longitudinalibus.

86. *Griſeus*, der *Geoffroiſche graulichte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. *Curc.* 15. Le *Charanſon griſette.*

Rufus, ſubvilloſus; *capite* nigricante; *roſtro* thorace breviore.

87. *Viridi-ſericeus*, der *grünſammetne Rüſſelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 284. *Curc.* 16. Le *Charanſon ſatin-vert.*

Coeruleo-viridis nitens; *thorace* punctato; *elytris* ſtriatis.

Petiv. Gazoph. p. 77. No. 6.

88. *Dolo-*

88. *Doloroſus*, der *Trauermantel.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 285. *Curc.* 17. La *Pleureuſe.*
Oblongus, niger, *abdomine* ſquamoſo, lateribus albis.

89. *Quadratus*, der *Vierfleck.**)

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 287. *Curc.* 21. Le *Charanſon quadrille à courte trompe.*
Cinereus, elytrorum *puncto quadruplici* nigricante; *proboſcide* thorace breviore.

90. *Griſeo-ſericeus*, das *grauſammetne Rüßelkäferchen.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 288. *Curc.* 23. Le *Charanſon ſatin-gris.*
Niger, ovatus, ſtriatus, totus villoſo-cinereus; *thorace* inermi.

91. *Thorace-ſpinoſus*, der *Dornſchild.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 288. *Curc.* 24. Le *Charanſon à corcelet épineux.*
Ovatus, nigro-cinereus; *thorace* vtrinque denticulato.

92. *Albo-faſciatus*, der *weißgeſtreifte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 288. *Curc.* 25. Le *Charanſon à bandes blanches.*
Subrotundus, niger, *ſquamoſus*, *elytris* ſtriatis; *thorace* vtrinque aculeato, lateribus lineaque media albis.

93. *Nigro-*

*) v. *Linn.* Curc. 4-macul. No. 29.

93. *Nigro-striatus*, der *schwarzgestreifte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. *Curc.* 26. Le *Charanson noir strié.*

Subglobosus, cinereo-ater, striatus; *proboscide* thoracis longitudine.

94. *Transverse-albo-fasciatus*, die *weisse Queerstreife.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. *Curc.* 27. Le *Charanson roux à bande transversale blanche.*

Globosus rufus; *elytris* striatis; fascia transversa alba.

95. *Niger, transverse-albo-striatus*, der *schwarze Rüßelkäfer mit der weissen Queerstreife.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 289. *Curc.* 28. Le *Charanson noir à bande transversale blanche.*

Globosus niger; *elytris* striatis, fascia transversa alba.

96. *Muricatus*, das *Geoffroische Mause-Rüßelkäferchen.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. *Curc.* 29. Le *Charanson souris.*

Subvillose-murinus; *scutello* albicante.

97. *Spinosus*, der *Geoffroische Dornträger.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 290. *Curc.* 30. Le *Charanson à côtes épineuses.*

Totus fuscus *spinosus*; elytris striis elevatis villoso-spinosis.

98. *Striato-denticulatus*, der *Rüßelkäfer mit gezähnelten Streifen.*

Geoffr.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 290. *Curc.* 31. Le *Charanſon noir à côtes.*

Niger; *ſcutello* albicante; *elytrorum* ſtriis vtrinque *denticulatis.*

99. *Marmoratus*, der *marmorirte Rüßelkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 291. *Curc.* 33. Le *Charanſon marbré à bandes.*

Lividus; *coleoptris* faſciis plurimis obſcuris.

100. *Atro-apterus*, der *ſchwarze ungeflügelte Rüſſelkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 243. No. 29. t. 7. f. 22. *Charanſon non-ailé noir.*

Breviroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo nigro nitido laevi.

101. *Griſeo-punctatus*, der *Graupunkt.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 244. No. 30. *Charanſon brun tacheté de gris.*

Breviroſtris; *antennis* fractis; *femoribus* muticis; *corpore* ſubgloboſo rufo-fuſco, punctis flavo-griſeis; *elytris* carinatis.

102. *Flavipes*, der *Geeriſche Gelbfuß.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 245. No. 31. *Charanſon verd à pattes jaunes.*

Breviroſtris; *antennis* flavis fractis; *femoribus* muticis; *corpore* oblongo viridi nitido; *pedibus* flavis.

103. *Capitatus*, der *Breitkopf.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 245. No. 32. *Charanſon gris à large tête.*

Brevi-

Breviroſtris; *antennis* fractis fuſcis; *femoribus* muticis; *capite* lato; *corpore* ſubgloboſo griſeo-cinereo; *pedibus* fuſcis.

104. *Tereticollis*, der *Rundhals.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 246. No. 33. *Charanſon gris à tête cylindrique.*

Breviroſtris; *antennis* fractis, *pedibusque* rufis; *femoribus* muticis; *capite* cylindrico; *corpore* oblongo griſeo-cinereo.

105. *Faſciculatus*, der *ſurinamiſche Bürſten-Rüßelkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. pag. 276. No. 10. t. 16. f. 2. *Charanſon à broſſes.*

Breviroſtris; *antennis* longis rectis; *corpore* ovato fuſco; *faſciculis* piloſis griſeis.

203. GESCHLECHT. *Attelabus; Afterrüßelkäfer.**)

Müllers Linn. Naturſ. 5. B. 1. Th. S. 243. *Baſtardrüßelkäfer. Holl.* Baſtard-Olyphantjes.

Börners Samml. 1. Th. S. 470. *Bienenkäfer.*

Eberhards Thiergeſch. S. 195. *Schildkrötenkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der Nat. H. S. 92. *Afterrüßelkäfer.*

Füeßlins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 11. *Afterrüſſelkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 60. *Afterrüßelkäfer; Bienengaſt.*

— — Geſch. S. 40. *Afterrüßelkäfer.* Le *Becmare.*

Catholicon A. p. 596. *Afterrüßelkäfer.*

Onomat. hiſt. nat. P. II. p. 44-48.**)

Bom.

*) Des *Geoffr.* Attelabus iſt Linn. *Hiſter*, aber des Linn. *Attelabi* ſind einige vom *Rhinom.* und *Clerus* des Geoffroi.

**) In dieſem *Artikel* herrſcht noch daſelbſt groſse Verwirrung, die

Bom. Dict. des Anim. X. p. 290.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* 10. 11. p. 303. *Clerus;* le *Clairon.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. prélim. P. I. 39. *Colliuris;* *Colliure.* VIII. 50. L'*Attelabe;* *Attelabus.* X. 61. le *Clairon;* Tom. IV. p. 79. des *Colliures.* p. 347. des *Attelabes.* Tom. V. p. 156. des *Clairons.**)

Fabric. S. E. pag. 156. *Attelabus.* pag. 157. *Clerus.* p. 158. *Notoxus.* p. 159. *Spondylis.*

Scop. Entom. carn. p. 35. *Attelabus.*

Müllerí Faun. Fridr. p. 12.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. 95.

Pontopp. N. G. v. D. p. 205.

Gleditsch Forstwiss. II. Th. pag. 1509. N. 4. *Afterrüßelkäfer.*

1. *Coryli,* der *Afterrüßelkäfer auf den Haseln.*

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 243. No. 1. t. 4. f. 18. der *Rollendreher.*

Füeßlins Verz. S. 11. No. 219. der *Rollenwickler.*

Sulzers Kennz. S. 10. t. 4. f. 25. der *Afterrüßelkäfer in den Haselnußblättern.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 205. No. 1. t. 16.

Linn. Reis. durch Oel. Uebers. S. 168.

Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 571. No. 12. der *schwarze Afterrüßelkäfer mit rothen Flügeldecken und langem Hinterkopfe.*

Catho-

die ich bey den Chrysomelen einigermaßen habe in Ordnung zu bringen gesucht.

Bey den Alten hieß das wahre herumwandelnde Puppchen der *Heuschrecke Attelabus.* S. *Swammerd.* B. der N. S. 91. *Jonston* Hist. Nat. Inf. p. 191.

*) Der Herr von *Geer* hat einige *Tenebriones* Linn. unter seine Attelabos gerechnet.

Catholicon A. p. 596. der *schwarze Afterrüßelkäfer der Haselstaude mit rothen Flügeldecken.*

Müllеri Faun. Fridr. p. 12. No. 119.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1019.

RHINOMACER *Coryli;* thorace elytrisque rubris.

Pontopp. Atl. Dan. I. t. 1.

Schaeff. Icon. t. 75. f. 8.

Acta Upsal. 1736. p. 19. No. 4. *Necydalis* rubra; *capite* minimo nigro.

Scop. Ent. carn. No. 71. CVRCVLIO *collaris.**)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* 11. La *tête ecorchée.*

Niger; *thorace*, *elytrisque* rubris; *capite* pone elongato.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 257. No. 46. t. 8. f. 3. *Charanson tête ecorchée rouge.***)

CVRCVLIO (*excoriato-ruber*) breviroſtris; *antennis* rectis; *corpore* brevi ſubquadrato nigro; *elytris* rubris; *capite* ovato poſtice attenuato.

Fabric. S. E. p. 156. No. 1. Niger, *elytris* rufis, reticulatis.

2. *Avellanae*, der *Nußbeiſser.*

Müller l. c. S. 244. No. 2.

Füeſslins Verz. S. 11. No. 220. der *Nuſsbeiſser.*

Catholicon A. p. 596. der *ſchwarze Afterrüſſelkäfer der Haſelnuſsſtaude mit rothen Flügeldecken, Bruſtſchild und Füſsen.*

Fabric.

*) Dieſes Citatum hat *Fabric.* zu dem folgenden Art. *Avellanae* geſetzt, den er für eine bloſse Varietät des *Coryli* hält, wie auch dieſen *Geoffroiſchen Rhinomacer.*

**) Das Schaefferſche Citatum des *Geers* Icon. t. 56. f. 5. 6. gehört nach des *Müllers* Zool. No. 1020. zu dem Artel. *Avellanae.*

Fabric. S. E. p. 157. B.*)
Müller Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1020. Niger, *thorace; elytris femoribusque* rubris.
Schaeff. Icon. t. 56. f. 5. 6.

3. *Curculionoïdes*, der *kleine Nußbeißer.*
Müller l. c. S. 244. No. 3. der *Zwergbaſtard.*
Füeßlins Verz. S. 11. No. 221. der *Zwergbaſtard.*
Sulzers Geſch. S. 41. t. 4. f. 12. der *kleine Nußbeißer.*
Catholicon A. p. 596. der *dem Rüſſelkäfer gleichende Afterrüſſelkäfer.*
Fabric. S. E. p. 157. No. 2. Niger, *elytris* ſtriatis *thoraceque* rubris.
Scop. Ent. carn. No. 72. CVRC. *nitens.*
Schaeff. Icon. t. 75. f. 8.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 273. *Rhinom.* 10. Le *Becmare laque.*
Niger, *thorace elytrisque* rubris *proboſcide* longitudine capitis.

4. *Surinamenſis*, der *ſurinamiſche Afterrüſſelkäfer mit gezähnelten Flügeldecken.*
Müller l. c. S. 244. No. 4. der *Zahnflügel.*
Catholicon A. p. 596. der *ſurinamiſche A. R. K. mit braungeſtreiften zweymal gezackten Flügeldecken.*
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 80. t. 17. f. 16. *Colliure de Surinam.***)
COLLIVRIS (*Surinamenſis*) fuſca, *thorace* ſubulato longiſſimo arcuato; *elytris* ſtriatis apice bidentatis; *pedibus* ferrugineis.

5. *Pen-*

*) S. die Anmerkungen bey No. 1.
**) Er gleicht der *Raphidia* vollkommen, nur hat er harte Flügeldecken.

5. *Pensylvanicus*, der *pensylvanische Afterrüsselkäfer mit rothen breit-schwarzgestreiften Flügeldecken.**)

Müller l. c. S. 245. No. 5. der *Pensylvanier.*
Catholicon A. p. 596.

6. *Melanurus*, der *Schwarzschwanz.***)

Müller l. c. S. 245. No. 6.
Catholicon A. p. 596. der *schwarzgeschwänzte Afterrüsselkäfer.*

7. *Betulae*, der *Birkenafterrüsselkäfer.*†)

Müller l. c. S. 245. No. 7. der *Blattkräusler.*
Gleditsch Forstw. I. Th. S. 552. No. 13. der *schwarze springende Afterrüsselkäfer der Birke.*
Catholicon A. p. 596. der *Afterrüsselkäfer der Birke mit Springfüssen.*
Fabric. S. E. p. 157. No. 3. Ater, *pedibus* saltatoriis.
Mülleri Faun. Fridr. p. 12. No. 120.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. N. 1021. Totus niger.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 259. No. 47. *Charanson tête ecorchée noir.*
CURCULIO (*excoriato-niger*) breviroſtris; *antennis* rectis; *corpore* brevi subquadrato nigro nitido; *capite* ovato postice attenuato; *femoribus* posticis maximis.

8. *Formicarius*, der *ameisenförmige Speckkäfer-Jäger.*

Müller l. c. S. 246. No. 8. der *Jäger.*

Füeßlins

*) Nicht abgebildet.
**) Nicht abgebildet.
†) Nicht abgebildet.

Füeßlins Verz. S. 11! No. 223. der *Jäger.*

Jonston hist. nat. Ins. t. 15. *Scarabaeus* minor 69. (vltimus.)

Raj. Ins. p. 103. No. 29. *Cantharis* 29.

Fabric. S. E. p. 157. *Clerus* 2.

Elytris fascia duplici alba basique *rubris.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 12. No. 121.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1077.

Niger; *thorace abdomine, elytrorumque* basi rubra; dorso fasciis binis albis.

Schaeff. Icon. t. 186. f. 4. *Cleroïdes.*

Catholicon A. p. 596. der *Ameisen-Afterrüsselkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 160. No. 3. t. 5. f. 8. *Clairon fourmi.*

CLERVS (*formicarius*) niger; *thorace elytris* antice abdomineque rubris; elytris *fasciis binis albis.*

Poda Mus. graec. p. 31.

9. *Sipylus*, der *grüne morgenländische Afterrüsselkäfer.**)

Müller l. c. S. 246. No. 9. der *Morgenländer.*

Catholicon A. p. 596. der *aegyptische Afterrüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 158. *Clerus* 3.

10. *Apiarius*, der *Bienenfeind.*

Müller l. c. S. 246. No. 10. t. 4. f. 19. der *Bienenfresser.*

Füeßlins Verz. S. 11. No. 224. der *Bienenfresser.*

Sulzers Kennz. t. 4. f. 25. b. der *bläuliche Afterrüsselkäfer mit rothen Flügeldecken.*

— — Gesch. S. 42. t. 4. f. 14. der *Bienenfresser.*

*) *Nicht abgebildet.*

Taubens Nat. Gesch. von Zelle II. Th. S. 104.
Pontopp. N. G. v. D. S. 205. No. 3.
Grünitz Bienengesch. S. 303. No. 8. *Bienenwolf; Rankmade;* der *Rieht*- oder *Rehwurm.*
Börners Samml. I. Th. S. 470. *Bienenkäfer.*
Beckmanns phys. oek. Bibl. I. Th. S. 133. *Immenwolf.*
Lepechins Tageb. I. Th. S. 219. der *den Bienen feindselige Afterrüsselkäfer; Attelabus apiaster.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 44. die *kleine Heuschrecke.*
Schaeff. Mauerbiene 1764. S. 22. 23. 37. t. 5. f. 10. der *Bienenfresser.*
— — Elem. t. 46. *Clerus, Bienenkäfer.*
— — Icon. t. 48. f. 11.
Catholicon A. p. 386. *Bienenkäfer.*
— — — p. 596. der *Bienenafterrüsselkäfer.*
Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1076.
Fabric. S. E. p. 158. *Clerus* 4.
Elytris rubris; fasciis tribus coeruleseentibus.
Scop. Entom. carn. No. 35.
Atro-coeruleus, villosus; *elytris* rubris, apice fasciisque binis atris.
Poda Mus. graec. p. 31.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 304. *Clerus* 1. t. 5. f. 4. *Le Clairon à bandes rouges.*
Nigro-violaceus, hirsutus; *elytris* fascia triplici coccinea.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 157. No. 1. t. 5. f. 3. *Clairon apivore.*
Coeruleo-violaceus; *elytris* rubris, fasciis tribus transversis violaceis.

11. *Mollis,* der *weichschaalichte Afterrüsselkäfer.*
Müller l. c. S. 247. No. 11. der *Sammetrock.*
Catholicon A. p. 596. der *weiche graulichte Afterrüsselkäfer.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 158. *Notoxus* 1.

Pubescens; *elytris* nigris, fasciis tribus pallidis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1078. Flavicans; *thorace* fasciisque elytrorum duabus fuscis.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 2.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 305. *Clerus* 3. Le *Clairon porte-croix.*

Fuscus, villosus; *elytris* flavis, *cruce* fusca.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 159. No. 2. t. 5. f. 6. *Clairon à bandes brunes.*

Clerus *(fusco-fasciatus)*; *elytris* flavo-griseis; fasciis duabus transversis fuscis, abdomine rubro.

12. *Ceramboïdes*, der *holzbockartige Afterrüsselkäfer.*

Müller l. c. S. 247. No. 12. der *Schwammkäfer.*

Catholicon A. p. 596. der *holzbockartige Afterrüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 159. *Spondylis* 2.

Atra; *elytris* rugosis; thorace latioribus.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 32. No. 2. t. 2. f. 1. *Tenebrion à etuis variolés.*

TENEBRIO *(varioloſus)* alatus ater; *elytris* rugosis.

13. *Buprestoïdes*, der *stinkkäferartige Afterrüsselkäfer.*

Müller l. c. S. 248. t. 4. f. 20. der *Dickhals.*

Frisch Inf. 13. Th. S. 23. t. 19. der *dickhalsige Holzkäfer.*

Catholicon A. p. 596. der *stinkkäferartige Afterrüsselkäfer.*

Fabric. S. E. p. 159. *Spondylis* 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 12. No. 122.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 44. der *schwarze Stinkkäfer.* p. 353. *Buprestis ater.*

Acta Vpsal. 1736. p. 19. No. 2.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 84. No. 21. t. 3. f. 21. *Capricorne à grandes dents.*

CERVMBYX *(maxillosus)* niger, *thorace* mutico subgloboso; *antennis* longitudine thoracis; articulis compressis; *dentibus* maximis prominentibus.

Unabgebildete Attelabi.

1. No. 5. *Pensylvanicus.*
2. No. 6. *Melanurus.*
3. No. 7. *Betulae.*
4. No. 9. *Sylvae.*

Neue Arten dieses Geschlechts.

1. *Formicarius minor,* der *kleine Jäger.**)

Füeßlins Verz. S. 11. No. 222.

Sulzers Gesch. S. 42. t. 4. f. 13. b.

Niger; *antennis* clavatis; articulis cordiformibus; *thorace* atro, ab abdomine remoto. *Elytra* striata, apice rubra, *fascia* alba.

2. *Polymorphus,* der *in seinen Zeichnungen veränderliche Afterrüsselkäfer an der Wolga.*

Pallas Reisen. I. Th. Anh. No. 44. Ausz. I. S. 13. No. 44.

Totus ater, lanugine nigra pubescens; *elytra* subcompressa, rotundata, flexilia.

Müllers Suppl. B. S. 234. No. 15. der *Unbestand.*

3. *Bima-*

*) S. No. 8. *Linn.*

3. *Bimaculatus*, der *Zweyfleck.*

Pallas Reis. I. Th. Anh. No. 45. *Ausz.* S. 14. No. 45.
Totus e nigro-cyaneus, nitidissimus, fuscaque lanugine pubescens; in floribus *Euphorbiae.*
Müllers Suppl. B. S. 235. No. 16.

4. *Senex*, der *Altvater.*

Pallas Reis. II. Th. Anh. No. 48.
Magnitudo infra *Attel. formicar.* totus aterrimus.
Müllers Supplem. B. S. 234. No. 14.

5. *Mutillarius*, der *mutillenartige Afterrüsselkäfer bey Halle in Sachsen.*

Fabric. S. E. p. 157. *Clerus* 1.
Niger; *elytris* fascia triplici alba.

6. *5-punctatus*, der *Skopolische Fünfpunkt.*

Scop. Entom. carn. p. 36. No. 114.
Niger; *thorace* fulvo; *elytris* pallidioribus; *punctis 5*, vno communi et majore.

7. *14-punctatus*, der *Skopolische Vierzehnpunkt.*

Scop. Entom. carn. p. 37. No. 116.*)
Thorax fulvus, punctis tribus nigris; *elytrum* pallidius punctis septem, vno in apice sito.

8. *Hungaricus*, der *ungarische Skopolische Afterrüsselkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 92. No. 46.
Niger, *thorace* hirsuto; *elytro* singulo fasciis duabus flavis, punctisque totidem flavis, vno ad basin, vno ad apicem.

*) *Skopoli* hat verschiedene *Linnéische Chrysomelen* unter seine Attelabos gerechnet.

9. *Niger*, der *ganz schwarze sammetartige Afterrüsselkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 305. *Clerus* 4. Le *Clairon satiné.*

Clerus niger subovatus, villis cinereis.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 164. No. 5. *Clairon noir.*
CLERVS *(niger)* oblongus.

10. *Glaber*, der *Geerische glatte Afterrüsselkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 351. No. 2. t. 19. f. 14. *Attelabe lisse.*

Fusco-castaneus, nitidissimus, *elytris* glabris; maxillis magnis arcuatis.

11. *Rufipes*, der *surinamische Rothfuss.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 165. No. 1. t. 15. f. 4. *Clairon à pattes rousses.*

Oblongus, nigro-coeruleus nitidus; antennarum basi, pedibusque flavo-rufis.

12. *Formicaroïdes*, der *rothleibige Afterrüsselkäfer.*

P. Schrank Beytr. zur N. G. S. 65. §. 8.

Thorace elytrisque nigris; elytris fascia rubra albaque.

204. GESCHLECHT. *Cerambyx; Bockkäfer; Holzbock; holl.* Bock-Torren.*) *Müllers*

*) Ob die Larve der wahre Cossus der Alten, ist wohl nicht auszumachen, da von andern die Holzraupe, der Weidenbohrer, (Phalaena Cossus); von andern die Larve des Lucan. *Cervus* u. s. w. dafür gehalten wird. S. *Swammerdams* B. der N. S. 132. Den Larven der *Holzwürmer* schreibt *Rösel* aus Erfahrung das *uhrähnliche Picken* in den Wänden zu. S. 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 9. 10.

Müllers Linn. Natursyst. 5. Th. 1. B. S. 249. *Bockkäfer.*

Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 12. *Bockkäfer.*

Sulzers Kennz. der Ins. S. 61. *Holzkäfer; Steinbock; Hirsch; Bisamkäfer.*

— — Gesch. der Ins. S. 42. der *Bockkäfer.*

Hanovs Seltenheiten der Natur I. B. S. 339. *langhörnige Maykäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 205. *Holzbock.* dän. *Tömmermand (Zimmermann).*

Gleditsch Einl. in die Forstwiss. II. Th. S. 1509. der *Holzkäfer*, oder *der eigentliche Holzwurm.*

Rösels Insektenbel. 2. B. Erdk. 2. Kl. Vorb. pag. 3. *Holzböcke*, oder *Holzkäfer.*

Börners Samml. I. Th. S. 470. *Holzbock.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 96. der *Holzbock* oder *Bisamkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 198. der *Holzkäfer.*

Lessers Theologie der Insekten S. 308. der *Geiger*; Lierdräner; Scar. *Lyricen.*

Swammerd. B. der N. S. 119. *fliegende Böcke und Ziegen.*

Frisch Ins. V. Th. S. 5. *Holzkäfer; Geiger.*

Neuer Schauplatz der Natur. S. 883. *Bockkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. II. p. 604. *Capricornus*; p. 754. *Cerambyx*; der *Holzbock*; der *Holzkäfer.*

Catholicon C. p. 83. *Steinbockkäfer; Holzbock; Bisamkäfer; Fliegenkäfer.*

Commentar. Lipsi. Dec. I. Vol. III. pag. 69. Vol. V. p. 534. 606.

Bomar. Dict. des Anim. II. 364.

Imperat. hist. nat. p. 922. 923. Scar. *Taurus.*

Jonston hist. nat. Ins. p. 91. t. 15. *Capricornus; Aigocerus; Cerambylus; Quicius.*

Scop. Entom. carn. p. 50.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 94.
Mülleri Faun. Fridr. p. 12.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. 92.
Fabric. S. E. pag. 159. *Prionus.* p. 164. *Cerambyx.* pag. 170. *Lamia.* p. 178. *Stenocorus.* p. 182. *Calopus.* ibid. *Rhagium.* p. 184. *Saperda.* p. 187. *Callidium.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 198. *Prionus.* p. 221. *Stenocorus;* le *Stencore.* p. 199. *Cerambyx;* le *Capricorne.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. prélim. IX. 58. Le *Capricorne; Cerambyx.* Tom. V. p. 55. des *Capricornes.*

I. *Bockkäfer, deren Bruststück zur Seiten mit beweglichen Dornen besetzt ist.*

1. *Longimanus,* die *amerikanische Langhand.**)
Müller l. c. S. 251. No. 1. der *Langhand.*
Rösels Insektenb. 2. B. Erdk. 2. Kl. Vorb. S. 11. t. 1. f. a.
Sulzers Gesch. S. 44. t. 5. f. 1. der *Langhandbock.*
Aubent. Miscell. t. 64. f. 1.
Fabric. S. E. p. 159. *Prionus* 1.
Grew Mus. 161. t. 13. *Nocoonaca.*
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 94. No. 52. *Pedes* antici corpore longiores; *caput, thorax, elytra* nigra lineis curvis rubris albisque variegata.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 102. No. 6. *Capricorne à longues mains.*
Thorace spinoso; pedibus anticis longissimis; *elytris* basi vnidentatis apiceque bidentatis, *antennis* longissimis.

2. *Trochlearis,* der *ostindianische Scheibenbock.**)
Müller l. c. S. 252. No. 2. der *Scheibenbock.*

II. *Bock-*

*) Diesen giebt *Scheuchzer* in seiner Phys. sacr. für eine *Heuschrecke* aus. S. *Rösels* Heuschr. und Grill. Samml. 2. Band. Vorb. pag. 19.
**) *Nicht abgebildet.*

II. *Bockkäfer, deren Bruſtſtück zur Seiten nur einen gezähnelten Rand hat.*

3. *Cervicornis*, der *amerikaniſche Hirſchbock.*

Müller l. c. S. 252. No. 3. t. 5. f. 1. der *Hirſchbock.*
Röſels Inſektenbel. 2. B. Vorb. Erdk. 2. Kl. S. 12. t. 1. f. b. der *berbyceniſche Holzkäfer aus einer holländiſchen Kolonie in Amerika.*
Aubent. Miſcell. t. 90. f. 3.
Fabric. S. E. p. 161. *Prionus* 6.
Thorace marginato, vtrinque tridentato, *maxillis* porrectis, extus vniſpinoſis, *antennis* brevibus.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 94. No. 1.
Faſciis longitudinalibus vndulatis ferrugineis; *thorace* depreſſo dentato; *maxillis* porrectis corniformibus dentatis; *antennis* brevibus.

4. *Armillatus*, der *indianiſche Ringelfuß.*

Müller l. c. S. 253. No. 4. der *Ringelfuß.*
Fabric. S. E. p. 162. *Prionus* 9.

5. *Imbricornis*, das *Schuppenhorn.*

Müller l. c. S. 253. No. 5.
Röſels 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 15. t. 1. f. 1. *der aus dem Eichbaum, oder anderem harten Holz entſpringende ſchwarzbraune Holzkäfer.**)

6. *Faber*, der *Zimmermann.*

Müller l. c. S. 254. No. 6.
Friſch Inſ. 13. Th. S. 23. t. 18. der *braunflügliche mittlere Holzkäfer.***)
Schaeff. Icon. t. 72. f. 3.

7. Coria-

*) Das *Männchen* von No. 7. *Coriarius.*
**) *Forte* ſagt der Ritter in der *Faun. Suec.* ed. 2. No. 646.

7. *Coriarius*, der *Gerber*.

Müller l. c. S. 254. No. 7.
Füeßlins Verz. S. 12. No. 225. der *Gerwer*.
Gleditsch Forstwiss. I. Th. S. 551. No. 11. der *schwarze oder dunkelgraue Birkenrindenkäfer*.
Röfels 2. B. Erdk. 2. Kl. t. 1. f. 2.*)
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 759. der *schwarze Holzbock mit grosen gelenksamen und zurückgebogenen Fühlhörnern:* der *allergröste Holzbock mit einer platten Brust und dreyen Dornen an derselben*.
Frisch Ins. XIII. Th. S. 15. t. 9. der *sägehörnige schwarze Holzkäfer*.
Raj. Ins. 95. *Cerambyx* maxima, cornubus magnis articulatis et reflexis.
Schaeff. Elem. t. 103. *Prionus*, der *Sägenholzkäfer*.
— — Icon. t. 67. f. 3. (nach *Füeßlin.*)
— — — t. 9. f. 1. (nach *Müllers* Zool.)
Fabric. S. E. p. 161. *Prionus* 7.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 802. *Prionus* piceus; *thorace* vtrinque tridentato.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 198. *Prionus* 1. t. 3. f. 5. Le *Brione*.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 59. No. 1. t. 3. f. 5. *Capricorne prione*.
Cerambyx *(Prionus)* fusco-castaneus obscurus nitidus, *thorace* depresso dentato, corpore lato, *antennis* brevioribus.

8. *Melanopus*, der *karolinische Schwarzfus*.**)

Müller

*) Das *Weibchen* von No. 5. *Imbricornis*.

**) Da *Linné* hieraus in seiner *Mantissa* p. 532. eine ganz neue Art gemacht; der Herr *de Geer* aber bey diesem Melanopus alle daselbst befindliche Citata, selbst den *Drury* angeführet hat;

Müller l. c. S. 254. No. 8. der *Schwarzfuss.*
— — Suppl. B. S. 237. 17. a. der *Hirschgeweyhbock.*
Linn. Mantiss. p. 532. *Ceramb. damicornis.*
Brown Jam. 429. t. 44. f. 8. *Lucanus fuscus maximus.*
Fabric. S. E. p. 162. *Prionus* 10.
Cerambyx *damicornis; thorace* marginato, denticulato; *maxillis* porrectis, bidentatis; *antennis* brevibus.
Drury Ins. I. p. 85. 86. t. 38. f. 1. Le *Makoko Scarabé;* the *Makoko-Beetle.**)
de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 97. No. 2. *Capricorne à corne de daim.*
Cerambyx *(damicornis)* castaneus; *thorace* depresso serrato, *maxillis* porrectis intus villosis apice tridentatis; *antennis* brevibus.

9. *Thomae*, der *Holzbock von der Thomasinsel.***)
Müller l. c. S. 255. No. 9. der *Thomasbock.*
Fabric. S. E. p. 162. *Prionus* 12.
Thorace marginato, crenulato, *corpore* nigro; *elytris* glabris ferrugineis; *margine* luteo.

10. *Cinnamomeus*, der *Zimmetbock.*
Müller l. c. S. 255. No. 10.
Sulzers Gesch. S. 44. t. 5. f. 2. der *Zimmetbock.*
Fabric.

hat; so wollen wir demselben folgen, und dies merkwürdige Insekt, dessen wir schon *bey der ersten Numer* der neuen *Schröterarten* unter dem Namen *Lucanus fuscus maximus* gedacht haben, mit diesem Menalopus für einerley halten.

*) Die *Larve* ist bey den Amerikanern eine grosse Delikatesse.

**) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 163. *Prionus* 16.
Thorace marginato, denticulato, *maxillis* porrectis tridentatis.
Drury Inſ. Tom. I. t. 40. f. 2.

11. *Feſtivus*, der *Staatsbock.*

Müller l. c. S. 256. No. 11. der *Treſſenbock.*
Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus* 4.
Drury Inſ. Tom. I. t. 37. f. 5.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 100. No. 4. t. 13. f. 14. *Capricorne épineux.*
Cerambyx *(ſpinoſus)*; *thorace* depreſſo rufo, vtrinque bidentato, faſciis longitudinalibus quinque nigris; *elytris* bidentatis viridibus; *linea* lutea.

12. *Dapſarius*, der *ſchwediſche Pechbock.**)

Müller l. c. S. 257. No. 12. der *Pechbock.*

13. *Atratus*, der *zeyloniſche ſchwarze Holzbock.*

Müller l. c. S. 257. No. 13. der *Zingaleſer.*

14. *Lineatus*, der *jamaiſche lineirte Holzbock.*

Müller l. c. S. 257. No. 14. der *Schleyerſchild.*
Fabric. S. E. p. 160. *Prionus* 3.
Thorace marginato, crenato, vnidentato, niger, albo-vittatus; *elytris* apice crenato-dentatis.

15. *Spinibarbis*, der *amerikaniſche Stachelbart.*

Müller l. c. S. 258. No. 15. der *Stachelbart.*
Fabric. S. E. p. 163. *Prionus* 14.

Thorace

*) *Nicht abgebildet.*

Thorace marginato, crenato — maxillis tridentatis.

Drury Inf. Tom. I. t. 37. f. 2. t. 38. f. 2.*)

16. *Bifasciatus*, das *amerikanische doppelte Schwarzband.*

Müller l. c. S. 258. No. 16. der *Schwarzband.*
Fabric. S. E. p. 162. *Prionus* 11.

17. *Planatus*, der *Plattschild.***)

Müller l. c. S. 258. No. 17.

III. *Bockkäfer mit rundem Brustschilde, welches an den Seiten durch festsitzende Dornen zugespitzt ist.*

18. *Barbicornis*, das *asiatische Barthorn.*†)

Müller l. c. S. 258. No. 18. der *Barthorn.*
Fabric. S. E. p. 168. *Ceramb.* 18.

19. *Ammiralis*, der *ammiralische Holzbock aus Surinam.*††)

Müller l. c. S. 259. No. 19.
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 351.
Neuer Schauplatz der Nat. 1. B. S. 106.

20. *Batus*, das *ostindianische Klauenhorn.*†††)

Müller l. c. S. 259. No. 20. das *Klauenhorn.*

21. *Rubus*,

*) Den *erstern* hält *Drury* für eine *ähnliche* aber doch von diesem *Spinib.* verschiedene Art, den *zweeten* aber für eben denselben.

**) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

†††) *Nicht abgebildet.*

21. *Rubus*, das *ostindianische Stachelhorn.*

Müller l. c. S. 259. No. 21. das *Stachelhorn.*
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 332. t. 2. f. 2.
(Eine blosse Abänderung des Rubus).
Fabric. S. E. p. 177. *Lamia* 29.
Thorace spinoso, bimaculato; *elytris* bidentatis; basi scabris mucronatis.
de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 106. No. 7. t. 13. f. 16. *Capricorne noir à bande blanche.*
Cerambyx *(albo-fasciatus)* niger; *thorace* spinoso; *antennis* longis aculeatis; *elytris* basi vnidentatis apiceque bidentatis; maculis quatuor albis.

22. *Araneiformis*, der *amerikanische Spinnenbock.*

Müller l. c. S. 260. No. 22. der *Spinnenbock.*
Fabric. S. E. p. 164. *Ceramb.* 2.
Sloan. Jam. II. t. 237. f. 24.
Drury Ins. Tom. II. t. 35. f. 4.

23. *Sentis*, der *indianische Dornstrauch.**)

Müller l. c. S. 261. No. 23. der *Dornstrauch.*

24. *Farinosus*, der *westindianische Mehlbock.*

Müller l. c. S. 261. No. 24. t. 5. f. 2. der *Mehlsack.*
Fabric. S. E. p. 168. *Ceramb.* 19.
Drury Ins. Tom. II. t. 31. f. 4.
Forster nov. sp. Ins. Cent. I. p. 39. No. 39. *Cerambyx Chinensis.***)
Thorace spinoso; ater totus, elytris antice scabris punctis paucis albis sparsis, *antennis* longioribus, singulo articulo basi canescente.

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Nach dem *Drury.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 108. No. 9. t. 13. f. 17.
Niger; *thorace* ſpinoſo; *elytris* maculis rotundatis piloſis flavo-albidis ſparſis, abdomine bidentato.

25. *Ferrugineus*, der *indianiſche Rothbock.**)
Müller l. c. S. 261. No. 25. der *Rothbock.***)

26. *Depreſſus*, der *oſtindianiſche Plattrücken.*
Müller l. c. S. 262. No. 26. t. 5. f. 3. der *Plattrücken.*
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 110. No. 11. t. 14. f. 2. *Capricorne applati.*
Cerambyx thorace quadriſpinoſo; dorſo depreſſo; *elytris* fuſco-nebuloſis: antice punctis elevatis; *antennis* longis.

27. *4-maculatus*, der *amerikaniſche Vierfleck.*
Müller l. c. S. 262. No. 27. der *Stachelrücken.*
Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 11.
Drury Inſ. Tom. I. t. 37. f. 3.

28. *Glaucus*, der *amerikaniſche ſeladongrüne Holzbock.*†)

Müller

*) *Nicht abgebildet.*

**) Von dieſer Art befinden ſich einige in den Kabineten, deren Fühlhörner über *einen halben Schuh* lang ſind, und daher von den Holländern *Lang-Spriet* genennet werden.

†) *Drury* ſagt im 2ten Theile p. 57. von einem Bockkäfer t. 31. f. 3. es habe faſt den Anſchein, als wär' es dieſer *Tuberculatus* Linn. allein er ſetzt hinzu, daſs er doch in vielen Stücken, z. E. in der Farbe und den groſsen merklichen Stacheln von den Linnéiſchen abweiche. Und ſo iſt es auch. Daher heiſst er auch mit Recht nicht ſowohl Tuberculatus, als vielmehr Spinoſus. S. unter den neuen 3. Kl. No. 37.

Müller l. c. S. 263. No. 28. der *Seledonbock.*
Fabric. S. E. p. 165. *Ceramb.* 5.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 111. No. 13. t. 14. f. 4. *Capricorne à tubercules.*

Cerambyx *(tuberculatus)* cinereus; *thorace* quinque spinoso, *elytris* spinosis postice vnidentatis latere fasciaque nigris; *antennis* longioribus.

29. *Nebulosus*, der *Tannenbock.*

Müller l. c. S. 263. No. 29.
Füeßlins Verz. S. 12. No. 226.
Gleditsch Forstwiss. 1. Th. S. 507. No. 14. der *graue Holzbock*, *Holzkäfer*, oder *Holzwurm*; der *graue Tannenkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 756. der *graue Holzbock mit schwarzen Punkten, und einem schwarzen Strich auf den Flügeldecken, und anderthalb längern Fühlhörnern als der Leib.*

Fabric. S. E. p. 168. *Ceramb.* 20.
Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 124.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1034.

Cinereus; *elytris* punctis fasciisque nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 204. *Ceramb.* 7. Le *Capricorne noir marbré de gris.*

Niger; *elytris* vellere cinereo marmoratis; *antennis* pedibusque cinereo intersectis.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 71. No. 8. *Capricorne nebuleux.*

Thorace spinoso; *elytris* cinereis punctis fasciisque nigris; *antennis* mediocribus, cinereo nigroque maculatis.

30. *Hispidus*, der *kleine Dornbock.*

Müller l. c. S. 263. No. 30. der *Dornbock.*
Füeßlins Verz. S. 12. No. 228. der *Dornbockkäfer.*

Frisch

Frisch Inf. 13. Th. S. 22. t. 16. Einer der *kleinsten Holzböcke.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 756. der *graue Holzbock mit schwarzen Punkten und einem weissen Strich auf den ausgezackten Flügeldecken und anderthalbmal längern Fühlhörnern als der Leib.*

Fabric. S. E. p. 169. *Ceramb.* 21.

Thorace spinoso; *elytris* apice bidentatis; *antennis* mediocribus hirtis.

Schaeff. Icon. t. 14. f. 9.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 206. *Ceramb.* 9. Le *Capricorne à etuis dentelés.*

Ovatus fuscus; *elytris* antice cinereis, apice bidentatis.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1035.

Fusco-alboque varius; *thorace* tuberculato; *elytris* postice praemorsis, supra punctis hispidis.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 71. No. 9. t. 3. f. 17. *Capricorne à brosses.**)

Cerambyx *(fasciculatus)* *thorace* spinoso; *elytris* fuscis, fascia transversa alba fasciculisque sex nigris; *antennis* longioribus.

31. *Desertus*, der *amerikanische Weissstrich.***).

Müller l. c. S. 263. No. 31.

32. *Succinctus*, der *surinamische Gelbband.* †)

*) Der Herr *de Geer* zweifelt mit Recht, ob dieser Holzbock von der Art sey, die *Geoffroi* à etuis dentelés mit gezähnelten Flügeldecken beschreibt, indem dieser und acht andere Exemplare seines Kabinets *abgestumpfte* Flügeldecken hatten.

**) *Nicht abgebildet.*

†) Bey diesem sowohl als bey No. 63. *Zonarius* hat *Linné* einerley Citatum, nämlich *Marcgr.* Bras. 254. In *Surinam* und *Brasilien* heisst diese Art *Quici.*

Müller l. c. S. 264. No. 32. t. 5. f. 4. der *Gelbband.*
Schröters Abhandl. 1. Th. S. 352.
Fabric. S. E. p. 168. *Ceramb.* 16.
Drury Inf. Tom. I. t. 39. f. 2.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 113. No. 14. t. 14. f. 5. *Capricorne à cordon.*

Fusco-castaneus; *thorace* rugoso quadrispinoso; *elytris* fascia transversali flava; *antennis* longioribus compressis.

33. *Virens*, der *ostindianische Grünling.*

Müller l. c. S. 264. No. 33. der *Grünling.**)
Fabric. S. E. p. 166. *Ceramb.* 8.
Thorace rotundato, spinoso; *corpore viridi;* femoribus rufis.
Drury Inf. Tom. I. t. 40. f. 1.
Elytris apice duabus maculis *roseis.*

34. *Moschatus*, das *Bisamböcklein;* der *Rosenbock.***)

Müller l. c. S. 264. No. 34.
Füesslins Verz. S. 12. No. 227. der *Bisambockkäfer.*
Frisch

*) Heifst wegen seiner schönen goldgrünen Farbe in *England* der Lady-Capricorn, oder *Frauenbock.*

**) Ich habe ihn besonders in solchen *Haberstücken* häufig gefunden, die in einem Strich unter alten Weidenbäumen weggiengen.

Sonderbar ist es, dafs der Herr Hofr. *Gleditsch* dessen in seiner Forstwiss. bey den Weiden nicht gedacht hat. Ich schlüfse fast daraus, dafs er in den dasigen Gegenden nicht einheimisch sey.

Drury Tom. I. préf. p. 9. sagt: er heifse im Englischen *Musk-Beetle,* und habe nach dem Zeugnifs eines erfahrnen Chirurgi, Herrn *Gui,* gleiche Arzneykräfte als die spanischen Fliegen.

Frisch Inf. 13. Th. S. 17. t. 11. der *blaulich-grüne Holzkäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 206. No. 5.*)

Onomatol. hist. nat. P. 2. p. 606. der *grüne wohlriechende Holzbock.*

Act. Upsal. 1736. p. 120. No. 1. Cerambyx *viridi-aeneus.*

Mouffet lat. p. 134. f. vlt. Cerambyx *tertius.*

Raj. Inf. p. 81. No. 17. *Scarabaeus Capricornus* dictus major viridis odoratus.

Fabric. S. E. p. 165. *Ceramb.* 7.**)

Thorace spinoso, viridis, nitens, *antennis* cyaneis mediocribus.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1037. *Elytris* obtusis viridibus, nitentibus; *femoribus* muticis; *antennis* mediocribus.

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 64. No. 2. *Capricorne odoriferant.*

Cerambyx *(odoratus); thorace* spinoso, viridi-aureo-nitidus; *antennis* mediocribus coeruleo-violaceis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 203. *Cerамb.* 5. Le *Capricorne vert à odeur de rose.*

Viridi-coerulescens.

Poda Musf. graec.

35. *Alpinus*, das *schweizerische Steinböcklein.*

Müller l. c. S. 265. No. 35. t. 5. f. 5. das *Steinböcklein.*

*) Der Bischof hat angemerkt, dass das *Weibchen* besonders den starken Bisamgeruch an sich habe: vielleicht das Männchen dadurch desto eher an sich zu locken.

**) Herr Prof. *Fabricius* versichert, dass er seinen Bisamgeruch nach dem Tode verliere, welches ich wahr befunden habe, dahingegen solchen der Silpha *Vespillo* viele Jahre behält.

Füeßlins Verz. S. 12. No. 229. der *Alpenbockkäfer.*
Fabric. S. E. p. 168. *Ceramb.* 15.
Schaeff. Icon. t. 123. f. 1.
Drury Inf. Tom. II. t. 31. f. 5.
Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 202. *Ceramb.* 4. t. 3. f. 6.
La *Rosalie.*
Cinereo-coeruleſcens; *elytrorum* maculis ſex fuſcis.

36. *Capenſis*, das *kapenſiſche Zebraböcklein.*

Müller l. c. S. 265. No. 36. das *Zebraböcklein.*
Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 14.
Drury Inf. Tom. I. t. 39. f. 3.
Petiv. Gazoph. t. 3. f. 8.
Poda Muſ. graec. p. 32. No. 3. CERAMB. *piloſus.*

37. *Aedilis*, der *Zimmermann.*

Müller l. c. S. 266. No. 37. der *Schreiner.*
Füeßlins Verz. S. 12. No. 230. der *Zimmermann.*
Friſch Inf. 13. Th. S. 18. t. 12. der *Holzkäfer mit den längſten Hörnern.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 206. No. 6. der *Holzmeiſter.*
Gleditſch Forſtwiſſ. 1. Th. S. 507. No. 15. der *Baumeiſter oder ruſſiſche Holzbock.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 653. *Smoland.* Timberman.
Act. Vpſal. 1736. p. 120. No. 2. 3. *Ceramb.* fuſcus, *antennis* corpore quater longioribus.
Pet. Gaz. 14. t. 8. f. 8. *Capricornus* ruſticus cinereus, *antennis* longiſſimis.
Acta Nidr. IV. 16. t. 16. f. 8.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. pag. 605. der *Baumeiſter;* der *graue ruſſiſche Holzbock mit langen Fühlhörnern.*
Schaeff. Icon. t. 14. f. 7. *femina.*

Scop.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 95. No. 53. *Antennae* valde longae, griseae, annulis nigris; *elytra* fuscescentia; *fascia* alba.

Fabric. S. E. p. 164. *Ceramb.* 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 125.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1033.

Cinereus; *thorace* punctis quatuor luteis transversalibus. Dan. *Tömmermand.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 66. No. 5. t. 4. f. 1. 2. *Capricorne charpentier. Suec.* Timmerman.

Thorace spinoso, punctis quatuor luteis; *elytris* griseo-cinereis, fuscomaculatis; *antennis* longissimis.

38. *Sutor*, der *Schuster*.*)

Müller l. c. S. 266. No. 38.

Füeßlins Verz. S. 12. No. 231. der *Schuster*.

Sulzers Gesch. S. 44. t. 5. f. 4. der *Schuster*.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 755. der *schwarze Holzbock mit tiefen Punkten und zerstreueten gelblichen Flecken auf den Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 10.

Thorace spinoso; *elytris* atris, ferrugineo maculatis, scutello luteo; *antennis* longissimis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 126.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1032.

Nigricans; *elytris* punctis excavatis, maculisque rubiginosis.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 65. No. 4.

Cerambyx *(atomarius); thorace* spinoso, niger nitidus *atomis* albescentibus; antennis longissimis, scutello albicante.

*) Dies ist nach dem *Linn.* des *Scop. Cerdo* Entom. Carn. No. 162, woraus aber *Füeßlin* eine neue Art gemacht hat.

39. *Cerdo*, der *Flicker.**)

Müller l. c. S. 266. No. 39.

Füeßlins Verz. S. 12. No. 232. der *Flicker.***)

Frisch Insect. 13. Th. S. 14. t. 8. der *langgehörnte schwarze Holzkäfer.*

Pontopp. N. G. von Dänem. S. 206. t. 16.

Fabric. S. E. p. 167. *Ceramb.* 14. †)

Thorace spinoso, rugoso, niger, *antennis* longis.

Scop. Entom. carn. No. 163. *Heros.*

Schaeff. Icon. t. 124. f. 3. *fem.* t. 14. f. 8.

Müllери Faun. Fridr. p. 13. No. 123.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1026.

Ater; *thorace* rugoso; *elytris* concoloribus. Nullum *maris et feminae* discrimen.

Pontopp. Atlas Dan. I. t. 29.

Drury Inf. Tom. I. t. 39. f. 1.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 201. *Ceramb.* 2. Le *petit Capricorne noir.*

Ater, *elytris* rugosis integris, *antennis* corpore longioribus.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 69. No. 6. *Capricorne savetier.*

Niger; thorace spinoso rugoso, *elytris* scabris; *antennis* mediocribus.

40. *Auri-*

*) Nach dem *Linné* ist dies des *Skop. Heros* No. 163. da doch dieser den *Linné* nicht dabey angeführet hat.

**) Nach *Füeßlin* ebenfalls.

†) Nach *Fabric.* aber ist des Skop. *Heros* eine Varietät des *Linnéischen* Cerdo, und des *Geoffr.* Inf. Tom. I. p. 200. Cer. 1. Le *grand Capricorne noir.* Fusco-niger; *elytris* rugosis, apice interiori spinosis; *antennis* corpore longioribus; wobey *Geoffr.* des *Frisch* 13. Th. t. 8. angeführt hat.

S. *Beckmanns* phys. oekon. Bibl. 7. B. 2. St. p. 288.

40. *Auricomus*, der *amerikanische Goldschläger.*

Müller l. c. S. 267. No. 40. der *Goldschläger.*

41. *Textor*, der *Stricker.*

Müller l. c. S. 267. No. 41. der *Weber.*
Füeßlins Verz. S. 12. No. 234. der *Weber.*
Poda Mus. graec. p. 33.
Schaeff. Icon. t. 10. f. 1.
Fabric. S. E. p. 171. *Lamia* 5.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1027. Nigricans; *elytris* punctis elevatis; *antennarum* articulo infimo, clavato.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 201. *Ceramb.* 3. Le *Capricorne noir chagriné.*

Ater, *elytris* punctis elevatis, *antennis* corpore brevioribus.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 64. No. 3. *Capricorne noir chagriné.*

Cerambyx *(nigro-rugosus)*; *thorace* spinoso, niger opacus; *antennis* brevioribus crassis; *elytris* convexis.

42. *Tristis*, der *Cypressenholzbock.*

Müller l. c. S. 268. No. 42. der *Trauerbock.*
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 95. No. 54.*)
Nigro-cinereus; *elytrum* singulum maculis duabus nigris.

Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 21.
Thorace spinoso, fusca; *elytris* maculis duabus atris, *antennis* mediocribus.

*) *Skopoli* hält ihn für eine Varietät des *Textoris*: auch hat sein Exemplar längere Fühlhörner gehabt.

43. *Fuliginator*, der *Schlotfeger.*

Müller l. c. S. 268. No. 43.
Füeßlins Verz. S. 12. No. 235.
Frisch Inf. 13. Th. S. 23. t. 19. der *dickhälsige Holzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 23.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1028. Niger; *thorace* subspinoso, *elytris* tomentosis, cinereis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 205. *Ceramb.* 8. Le *Capricorne ovale cendré.*
Ater, ovatus; *antennis* corpore dimidio brevioribus; *elytris* vellere cinereo albidis.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 70. No. 7. *Capricorne ramonneur.*
Niger; *thorace* spinoso; *elytris* cinereis; *corpore* ovato; *antennis* brevioribus.

44. *Coquus*, der *kanadaische Koch.**)

Müller l. c. S. 268. der *Koch.*
Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 24.

45. *Cursor*, der *Läufer.*

Müller l. c. S. 268. No. 45.
Füeßlins Verz. S. 12. No. 236. der *Läufer.*
Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 7. der *Läufer.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 761. der *röthliche Holzbock mit drey schwarzen Strichen auf den Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 183. *Rhagium* 2.
Thorace spinoso; *elytris* rufis, sutura lineaque nigris.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1030. *Elytris* obtusis, rufis margine lineaque nigris, *antennis* mediocribus.

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 127. No. 3.

LEPTVRA *(curſor); thorace* ſpinoſo nigro; *elytris* rufis, viridi-griſeo-tomentoſis; faſciis binis longitudinalibus nigris; *antennis* longis rufis.

46. *Lamed*, das *hebräiſche Lamed.**)

Müller l. c. S. 269. No. 46.
Fabric. S. E. p. 178. *Stenocorus* 2.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1031.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 226. *Stenocorus* 6. Le *Stencore bedeau.***)

47. *Meridiana*, der *Holzbock mit hellglänzendem Bruſtſtück.*

Müller l. c. S. 269. No. 47. der *Tagdieb.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 238. der *Tagſchwärmer.*
Fabric. S. E. p. 178. *Stenocorus* 1.
Raj. Inſ. 96. 1. *Elytris* ſpadiceis, *ventre argenteo.*
Schaeff. Icon. t. 3. f. 13. t. 79. f. 7.
de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 130. No. 5. *Lepture meridienne.*

Fuſco-cinerea; *thorace* ſpinoſo, femoribus rufis apice nigris, *corpore* ſubtus nitente; *abdominis* apice rufo.

48. *Noctis*,

*) *Nicht abgebildet.*

**) Herr Prof. *Müller* erinnert mit Recht, daſs der vom *Linné* hierbey citirte *Geoffroiſche Stenoc.* 6. nicht hieher gehöre, weil derſelbige kein dornichtes Bruſtſtück wie das Lamed habe. *Fabricius* hat nach dem Ritter eben dieſen *Geoffr.* Stenoc. citirt; der Herr *de Geer* aber daraus eine *neue Lepture* gemacht T. V. p. 138. No. 15. *Lepture à ſuture noire.*

48. *Noctis*, der *nachtschwarze Holzbock.**)

Müller l. c. S. 269. No. 48. der *Nachtschwärmer.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 239. der *Nachtschwärmer.*

49. *Inquisitor*, der *Inquisitor.*

Müller l. c. S. 269. No. 49. der *Stänkerer.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 240. der *Inquisitor.*
Frisch Ins. 13. Th. S. 21. t. 14. die *mittlere Art Holzböcke.*

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 757. der *graue und schwarz nebelfarbige Holzbock mit sehr kleinen Fühlhörnern und stachlichter Brust.*

Fabric. S. E. p. 182. *Rhagium* 1.
Schaeff. Icon. t. 83. f. 3.
Acta Nidr. III. 11.
Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 128.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 91. No. 1029.

Niger tomento testaceus; *oculis* tuberculatis; *elytris* fascia duplici fulva.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 223. *Stenocorus* 2. Le *Stenocore noir velouté de jaune.*

Niger, vellere flavo variegatus, *elytris* lineis duabus elevatis; *thorace* spinoso.

Acta Upsal. 1736. p. 20. No. 1. *Necydalis* cinereomaculata, sulcata.

de *Geer* Tom. V. p. 126. No. 2. t. 4. f. 7. *Lepture inquisiteur.*

LEPTURA *(inquisitor); thorace* spinoso, fusca, maculis punctisque cinereis villosis; *antennis* brevioribus.

B. *Schaeff.* Elem. t. 118. f. 1. *Stenocorus, Stutzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 183. B.

Onomat.

*) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 755. No. 2. der *graue Holzbock mit zwey gelben Bändern auf den Flügeldecken, und sehr kleinen Fühlhörnern.*

Schaeff. Icon. t. 2. f. 10. t. 8. f. 2. 3.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 222. *Stenocorus* 1. Le *Stencore lisse à bandes jaunes.*

Glaber, e fusco niger; *elytro* singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis; *thorace* spinoso.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 124. No. 1. t. 4. f. 6. *Lepture hargneuse.*

LEPTURA *(mordax)*; *thorace* spinoso, nigra, maculis punctisque griseis villosis; *elytris* fascia duplici fulva maculaque nigra, *antennis* brevioribus.

50. *Kähleri*, der *Kählersche Holzbock.*

Müller l. c. S. 270. No. 50.

Füeßlins Verz. S. 13. No. 242. *Kählers Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 13.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 96. No. 56.

Elytra sanguinea, macula communi, lanceolata, magna, nigra.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 204. *Ceramb.* 6. Le *Capricorne rouge.*

Niger; *elytris* thoracisque lateribus rubris.

51. *Pedestris*, der *langsame und ungeflügelte Bockkäfer.**)

Müller l. c. S. 270. No. 51. der *Fußknecht.*

Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 27.

Thorace spinoso; atra, *vitta* integra alba; *antennis* mediocribus.

Scop. Ent. carn. No. 168. Cerambyx *arenarius.*

Poda Inf. 34. 9. Ceramb. *pedestris.*

*) *Nicht abgebildet.*

IV. *Bockkäfer mit cylindrisch-rundem und unbewaffneten oder ungedornten Brustschild.*

52. *Carcharias*, der *seehundfarbige Holzbock.**)

Müller l. c. S. 271. No. 52. der *Hundsbock.*
Fließlins Verz. S. 13. No. 243.
Lepechins Tageb. II. p. 199. t. 11. f. 18.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 604. No. 4. p. 758. No. 2. der *schwarze norwegische Holzbock.*
Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 1.
Corpore griseo, punctato nigro, *antennis* mediocribus.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 1. La *Lepture chagrinée.*
Cinerea, nigro-punctata; *thorace* cylindriaceo.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 73. No. 10. t. 3. f. 19. *Capricorne ponctué.*
Punctatus, thorace mutico cylindrico; flavo-griseus nigro-punctatus; *antennis* mediocribus griseo-nigroque maculatis.
Schaeff. Icon. t. 38. f. 4. t. 152. f. 4.
Drury Inf. Tom. I. t. 41. f. 5.

53. *Iuvencus*, der *amerikanische wollichte Holzbock mit gezähnelter Flügelnath.***)

Müller l. c. S. 271. No. 53. der *Wollenbock.*
Fabric. S. E. p. 169. *Cerambyx* 24.

54. *Surinamus*, die *surinamische Braunlinie.*

Müller l. c. S. 272. No. 54. der *Surinamer.*

de *Geer*

*) Diesen nennt Franz von *Paula Schrank* in seinen Beytr. zur Naturgesch. S. 65. §. 9. den *Seehund.*

**) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 117. No. 20. t. 14. f. 11. *Capricorne à long col.*

Longicollis; thorace mutico cylindrico elongato rufo; *elytris* testaceis punctis quatuor nigris; *antennis* longioribus.

55. *Scalaris*, der *Treppenbock.*

Müller l. c. S. 272. No. 55. t. 5. f. 6. der *Stiegenbock.*

Füeßlins Verz. S. 13. No. 244. der *Stiegenbockkäfer.*

Frisch Inf. 12. Th. S. 29. t. 3. der *Holzkäfer von mittelmäßiger oder vierter Größe mit schwarzen Flügeln und gelben oder weissen Zierrathen darauf.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 607.

LEPTURA *scalaris.*

Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 2.

Poda Mus. graec. p. 34.

Schaeff. Icon. t. 38. f. 5.

Hoefnag. Inf. t. 7.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 758. No. 4. der *schwarze Holzbock mit gelben Flecken.*

Acta Upsal. 1736. p. 20. No. 7. *Cerambyx* cinereus, fascia alba.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 102. No. 77. *Leptura* scalaris.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 77. No. 14. *Capricorne à bande dentelée.*

Flavo-viridis; *thorace* mutico cylindrico; macula nigra, *elytris* nigris fascia dentata, punctisque flavo-viridibus, *antennis* mediocribus.

56. *Cardui*, der *Distelbock.**)

Müller l. c. S. 272. No. 56. der *Distelkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 13. No. 255. der *Distelbockkäfer.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 186. *Saperda* 10.

Fusca; *thorace* lineato, scutello flavo; *antennis* longis.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 74.

57. *Populneus*, der *Pappelnbock.*

Müller l. c. S. 273. No. 57. t. 5. f. 7. 8.

Füeßlins Verz. S. 13. No. 256. der *Pappelnbockkäfer.*

Schröters Abhandl. I. S. 349. t. 3. f. 1.

Fabric. S. E. p. 186. *Saperda* 12.

Schaeff. Icon. t. 48. f. 5.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1070.

LEPTURA *populnea* nigra; *thorace* cylindrico; *lineis* tribus; *elytris* punctis decem luteis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 3. La *Lepture à corcelet cylindrique et taches jaunes.*

Nigra, *thoracis* lineis tribus, *elytrorumque* maculis villoso-flavis; *thorace* cylindraceo; *antennis* corpus aequantibus.

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 78. No. 15. *Capricorne à dix points jaunes.*

10-punctatus nigro-plumbeus, *thorace* mutico cylindrico; lineis binis flavis; *elytris* punctis quinque flavis; *antennis* mediocribus.

58. *Linearis*, die *Parallele.**)

Müller l. c. S. 274. No. 58.

Füeßlins Verz. S. 13. No. 257.

Fabric. S. E. p. 185. *Saperda* 5.

Scop. Ent. carn. No. 153. LEPTURA *parallela.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 129.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1044.

59. *Cylin-*

*) *Nicht abgebildet.*

59. *Cylindricus*, der *walzenförmige Holzbock.*

Müller l. c. S. 274. No. 59. die *Rolle.*

Rösels Inf. 2. B. Erdk. 2. Kl. S. 21. t. 3. der *kleine orangengelbe Holzwurm in den abgestandnen Zweigen der Haselstauden mit seinem kleinen schwarzen schmalleibigen Holzkäfer.*

Fabric. S. E. p. 185. *Saperda* 6.

Scop. Ent. carn. No. 157. LEPTVRA *cylindrica.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1043.

Nigro-cinerea; *thorace* cylindrico, *linea* flava; *tibiis* anticis femoribusque rufis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 208. *Leptura* 2. La *Lepture ardoisée.*

Tota coeruleo-atra, *capite thoraceque* subvilloso.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 75. No. 12. *Capricorne ardoisé.**)

(Cinereus) coeruleo-niger; *thorace* mutico cylindrico linea albida, pedibus anticis flavis, *antennis* mediocribus.

60. *Oculatus*, das *Schildauge.*

Müller l. c. S. 274. No. 60.

Füeßlins Verz. S. 13. No. 260. *Schildauge.*

Hoefn. Inf. 13.

Schaeff. Icon. t. 128. f. 4.

Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 3.

Thorace luteo; punctis duobus atris, *elytris* nigris.

de *Geer*

*) Der Herr *de Geer* hält diesen für des *Geoffroi* ardoisé; *Füeßlin* aber S. 13. No. 258. hat daraus eine *neue* Art gemacht, die er *Micans* nennet, und er scheint Recht zu haben, da er versichert: er habe die Gröfse und Gestalt des *Pappelnbockkäfers* No. 57. Wir werden ihn hinten unter den *neuen* mit anführen.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 74. No. 11. t. 3. f. 20. *Capricorne à yeux.*

Thorace mutico cylindrico rufo-flavo; punctis duobus nigris, *capite* antennisque nigris; *elytris* cinereo-coerulescentibus.

Scop. Ent. carn. No. 152. LEPTURA *oculata.*

61. *Ramphygeus*, der *amerikanische Gelbfleck.**)
Müller l. c. S. 274. No. 61.

62. *Irroratus*, der *amerikanische bereifte Holzbock.*
Müller l. c. S. 275. No. 62. der *Thaubock.*
Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 9.
Drury Ins. Tom. I. t. 33. f. 3.

63. *Zonarius*, der *amerikanische Gürtelbock.***)
Müller l. c. S. 275. No. 63. t. 5. f. 9. der *Gürtler.*

V. *Bockkäfer, deren Bruststück etwas rund oder kugelförmig platt gedruckt, und dabey unbewaffnet ist.*

64. *Curculionoïdes*, der *rüßelkäferartige Holzbock.*
Müller l. c. S. 276. No. 64. der *Rüßelbock.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 261. der *Argus.*
Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 20.
Fusca; *thorace* coleoptrisque *ocellis quatuor atris.*
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 101. No. 75. LEPTURA *Curculioïdes.*
Fusco-cinerascens; *elytrum* singulum *ocellis binis*, thorace *quaternis.*

Schaeff.

*) *Nicht abgebildet.*

**) S. No. 32. *Succinctus*, wobey einerley Citatum des *Marcgr.*

Schaeff. Icon. t. 39. f. 1. t. 153. f. 5.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 210. *Leptura* 5. La *Leptur*e *à yeux de paon.*

Nigro-cinerea; thorace elytrisque maculis oculiferis atris, circulo cinereo; *thorace* ſubcylindraceo.

65. *Serraticornis*, das *Sägehorn.**)

Müller l. c. S. 276. No. 65.
Fabric. S. E. p. 182. *Calopus* 1.
Fuſcus, *antennis* compreſſis.
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 79. No. 16. *Capricorne à antennes dentelées.*

Thorace mutico cylindrico; griſeo-fuſcus, oculis nigris, *antennis ſerratis* mediocribus, tentaculis longis pedibusque teretibus.

66. *Hiſpicornis*, das *amerikaniſche Stachelhorn.***)

Müller l. c. S. 276. No. 66. das *Dornhorn.*

67. *Ruſticus*, der *Bauer.*

Müller l. c. S. 276. No. 67.
Füeßlins Verz. S. 13. No. 262. der *Bauer.*
Sulzers Kennz. t. 4. f. 29. †)
— — Geſch. S. 46. der *Bauer.*
Schaeff. Elem. t. 13. f. 1. t. 76. f. 1. *Afterholzkäfer.*
— — Icon. t. 63. f. 6. (t. 2. f. 7. allegante *Müllero*).
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1041.
Leptura nigra; *thorace* globoſo, *elytris* fuſcis, lineis transverſis tribus albis, antica arcuata puncto medio.

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) Im *Linn.* muſs es ſtatt f. 9. heiſſen: f. 29.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 758. der *braune Holzbock mit Vertiefungen auf der Brust.*

Fabric. S. E. p. 188. *Callidium* 6.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 83. No. 20. *Capricorne rustique.*

Griseo-fuscus; *thorace* mutico subrotundo depresso; punctis impressis; *antennis* subulatis brevioribus.

68. *Luridus*, der *Bräunling.**)

Müller l. c. S. 277. No. 68.

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium* 14.

Thorace subtuberculato, nudo, nigrum; *elytris* testaceis.

69. *Femoratus*, der *Rothschenkel.*

Müller l. c. S. 277. No. 69.

Schaeff. Icon. t. 55. f. 7.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 93. No. 31. *Capricorne à cuisses rouges.*

70. *Violaceus*, der *blaue Bockkäfer.*

Müller l. c. S. 277. No. 70. der *Blaubock.*

Füeßlins Verz. S. 13. No. 263.

Frisch Ins. 12. Th. S. 33. 3. Pl. t. 6. f. 1. der *ganz violetblaue Holzkäfer.*

Acta Upsal. 1736. pag. 20. No. 4. *Bupreſtis* collari nigro; *elytris* aeneo-coeruleis.

Fabric. S. E. p. 188. *Callidium* 4.

Thorace subpubescente, *corpore* violaceo; *antennis* brevibus.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 763. der *glänzende blaue Holzbock mit schwarzen Fühlhörnern und keulförmigen Schenkeln.*

Scop.

*) *Nicht abgebildet.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 97. No. 59. STENOCORUS *violaceus.*

Thorax vna cum antennis niger et villosus; *elytra* violacea, villosa, punctata.

Müllerі Faun. Fridr. p. 13. No. 130.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1059.

LEPTURA *violacea;* tota violacea, pubescens; *thorace* depresso; *oculis* fuscis.

Schaeff. Icon. t. 4. f. 13.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 88. No. 24. *Capricorne violet.*

Violaceus nitens; *corpore thoraceque* mutico subrotundo depressis; *femoribus* clavatis; *antennis* mediocribus nigris.

71. *Auratus*, der *amerikanische Goldbock.*

Müller l. c. S. 277. No. 71. der *Goldbock.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 101. No. 5. t. 13. f. 15. *Capricorne doré.*

Viridi-inauratus; *thorace* depresso marginato-dentato; *pedibus* rufo-violaceis; *antennis* mediocribus violaceo-nigris.

72. *Stigma*, die *amerikanische Marke.*

Müller l. c. S. 278. No. 72. die *Marke.*

Fabric. S. E. p. 189. *Callidium* 7.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 119. No. 22. t. 14. f. 13. *Capricorne stigmate.*

Totus niger; *thorace* submutico semi-lunari punctato, *corpore* depresso; *elytris* laevibus *stigmate flavo;* antennis brevibus.

73. *Striatus*, der *gestreifte Holzbock.**)

Müller l. c. S. 278. No. 73. der *Streifbock.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 264. der *Streifbockkäfer.*
Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 17.
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 90. No. 26. *Capricorne strié.*

Niger nitidus; *thorace* mutico subrotundo subdepresso; *elytris* striatis; *antennis* brevioribus dentibusque parvis.

74. *Variabilis*, der *in seinen Farben sehr veränderliche Holzbock.*

Müller l. c. S. 278. No. 74. der *Unbestand.*
Frisch Inf. 12. Th. S. 34. 35. 3. Pl. t. 6. f. 3. 4. der *braune Holzkäfer mit blauen Oberflügeln; der schwarzbraune kleine Holzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 188. *Callidium* 5.
Thorace glabro, *corpore* fusco-aeneo; *antennis* pedibusque fuscis.
Schaeff. Icon. t. 4. f. 12.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 94.
Leptura No. 1060. Violacea, *thorace* depresso *abdomine pedibusque* rufis.

75. *Testaceus*, der *ziegelrothe Holzbock.*

Müller l. c. S. 279. No. 75. der *Rothbock.*
Füeßlins Verz. S. 13. No. 265.
Schaeff. Icon. t. 64. f. 6.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 762. der *muschelfarbige Holzbock mit kahler Brust.*
Act. Upsal. 1736. p. 20. No. 3. *Bupreſtis* collari glabro, *elytris* testaceis.

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium* 13.

Thorace subtuberculato; *corpore* testaceo; *antennis* mediocribus fuscis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1061.

Leptura testaceo-fusca; *thorace* depresso; abdomine femoribusque nigris.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 218. *Leptura* 18. La *Lepture livide à corcelet lisse.*

Testacea; *thorace* glabro.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 93. No. 30. *Capricorne fauve.*

76. *Bajulus*, der *Bockkäfer mit zween Hökern auf dem Brustschilde.*

Müller l. c. S. 279. No. 76. der *Lastträger.*

Füeßlin Verz. S. 13. No. 266. der *Lastträger.*

Sulzers Kennz. t. 4. f. 29.

Frisch Ins. 13. Th. S. 17. 2. Pl. t. 10. Ein *Holzkäfer mit kleinen Fühlhörnern und grauem Halsschild mit zween Punkten.*

Fabric. S. E. p. 187. *Callidium* 1.

Thorace villoso; *tuberculis* duobus, *corpore* fusco.

Schaeff. Icon. t. 64. f. 4. 5.

Act. Upsal. 1736. pag. 20. No. 1. *Bupreſtis* collari villoso; *elytris* cinereis.

Onomat. hist. nat. P. 2. pag. 760. der *schwärzlichte Holzbock mit einer wollichten grauen Brust, und zweyen kahlen Punkten auf derselben.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 13. No. 131.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1062.

Leptura variabilis, nitida; *thorace* depresso villoso; *tuberculis* duobus.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 218. *Leptura* 17. La *Lepture brune à corcelet romboïdale.*

Testaceo-fusca; *thorace* rhomboïdali villoso; *elytrorum* maculis quatuor albidis transversim positis.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 86. No. 82. *Capricorne à queue.*

Cerambyx (*caudatus*,) fusco-obscurus; *thorace* mutico subrotundo depresso cinereo-villoso, punctis duobus nigris glabris, *antennis* brevibus.

B. *Onomat.* hist. nat. P. 2. p. 762. der *muschelfarbigte Holzbock mit einer haarichten Brust.*

77. *Fennicus*, der *Finnländer.**)

Müller l. c. S. 279. No. 77.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 267. der *Finnländer.*
Fabric. S. E. p. 188. *Callidium* 2.

Thorace tuberculato, rufo; *elytris* violaceis, *antennis* mediocribus.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1068.

Thorace subrotundo, tuberculis subferrugineis, obsoletis; *elytris* violaceis; *antennis* longiusculis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 219. *Leptura* 19. La *Lepture noire à corcelet rougeatre.*

Atra, *thorace* testaceo, *femoribus* crassis.

78. *Liciatus*, der *Striembock.***)

Müller l. c. S. 280. No. 78.

79. *Undatus*, der *Wellenbock.*

Müller l. c. S. 280. No. 79.
Act. Upsal. 1736. p. 20. No. 6.
Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 20.

Thorace tuberculato; *elytris* nigris, fasciis duabus undatis albis, *antennis* brevibus.

Schaeff.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Schaeff. Icon. t. 68. f. 1.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 759. der *schwarze Holzbock mit schwarzen Strichen auf den Flügeldecken.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1069.

Leptura: thorace subrotundo, tuberculato, *elytris* fasciis duabus vndulatis, *antennis* submediocribus.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 91. No. 28. *Capricorne à ondes blanches.*

Nigro-fuscus; *thorace* mutico subrotundo depresso tuberculato, *elytris* fasciis duabus albidis vndulatis, *antennis* submediocribus.

80. *Sanguineus*, der *Blutbock.*

Müller l. c. S. 280. No. 80.

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium* 12.

Thorace subtuberculato, *elytrisque* sanguineis; *antennis* mediocribus.

Raj. Ins. 97. 3. *Cerambyx* minor.

Schaeff. Icon. t. 64. f. 1.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1038.

Niger, *thorace* elytrisque rubris. Dan. *Trae-Buk.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 220. *Leptura* 21. La *Lepture veloutée couleur de feu.*

Nigra, *thorace* coleoptrisque fericeo-rubris.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 92. No. 29. *Capricorne couleur de feu.*

Thorace mutico subrotundo depresso angulato *elytrisque* sanguineis, corpore nigro; *antennis* brevioribus.

81. *Castaneus*, der *kastanienfarbige Bock.*

Müller l. c. S. 281. No. 81.

Füeßlins Verz. S. 14. No. 268. der *Kastanienbraune.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 132.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1005.

Thorace subrotundo, corporeque nigro; *elytris* antennis pedibusque ferrugineis.

Schaeff. Icon. t. 108. f. 1.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 90. No. 27. *Capricorne rousseatre.*

Thorace nigro mutico subrotundo subdepresso; *elytris* pedibusque ferrugineis; *antennis* brevioribus.

82. *Cantharinus*, der *Johannisfliegenartige Bock.**)

Müller l. c. S. 281. No. 82. der *Johannisbock.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1075. *Leptura* rufo-fusca; *thorace* cylindrico; *antennis* corpore longioribus; *oculis* nigris.

83. *Ebulinus*, der *Hollunderbock.*

Müller l. c. S. 282. No. 83.

Schaeff. Icon. t. 4. f. 12.

Unabgebildete Holzböcke.

I. Klasse.

No. 2. *Trochlearis.*

II. Klasse.

1. No. 9. *Thomae.*
2. No. 12. *Dapsarius.*
3. No. 17. *Planatus.*

III. Klasse.

1. No. 18. *Barbicornis.*
2. No. 19. *Ammiralis.*
3. No. 20. *Batus.*

4. No.

*) *Nicht abgebildet.* v. unter den *neuen Leptur.* 2. Kl. No. 5.

4. No. 23. *Sentis.*
5. No. 31. *Desertus.*
6. No. 44. *Coquus.*
7. No. 46. *Lamed.*
8. No. 48. *Noctis.*
9. No. 51. *Pedestris.*

IV. Klasse.

1. No. 53. *Iuvencus.*
2. No. 56. *Cardui.*
3. No. 58. *Linearis.*
4. No. 61. *Ramphygeus.*
5. No. 65. *Serraticornis.*

V. Klasse.

1. No. 66. *Hispicornis.*
2. No. 68. *Luridus.*
3. No. 73. *Striatus.*
4. No. 77. *Fennicus.*
5. No. 78. *Liciatus.*
6. No. 82. *Cantharinus.*

Neue Arten von Holzböcken.

I. Klasse.

Holzböcke, deren Bruststück zur Seiten mit beweglichen Dornen besetzt ist.

1. *Lusitanus*, der *portugiesische Holzbock mit der blassen wellenförmigen Streife.*

Linn. Add. p. 1067. No. 5.
Müllers Supplem. B. S. 236. 2. a. der *Ziegelbock.*

2. *Bal-*

2. *Balteus*, der *portugiesische Rostbock.*

Linn. Add. p. 1067. No. 6.
Müllers Suppl. B. S. 236. 2. b.

3. *Giganteus*, der *kayennische Riesenbock.*

Linn. Mantiss. p. 531.
Fabric. S. E. p. 161. *Prionus* 8.
Müllers S. B. S. 237. 2. c.

4. *Luzonum*, der *luzonische Holzbock mit langen Vorderfüßen.*

Fabric. S. E. p. 106. *Prionus* 5.
Thorace marginato, *multispinoso*, maxillis porrectis, vnidentatis, apice bifidis, pedibus anticis elongatis.
Petiv. Gazoph. t. 47. f. 1.

II. Klasse.

Holzböcke, deren Bruststück zur Seite einen gezähnelten Rand hat.

1. *Fuliginosus*, der *amerikanische Rostbock.*

Fabric. S. E. p. 160. *Prionus* 2.
Thorace marginato, crenato, vnidentato, ater; *elytris* apice crenato dentatis.

2. *Mucronatus*, der *amerikanische bronzackige Bock.*

Fabric. S. E. p. 160. *Prionus* 4.
Thorace marginato, bidentato, *elytris* rufis, *mucronatis.*

3. *Bili-*

3. *Bilineatus*, die *amerikanische Zweylinie.*

Fabric. S. E. p. 163. *Prionus* 13.

Thorace marginato, crenato, albo, *bilineato; elytris* ferrugineis, atomis albis, margineque luteo.

4. *Maxillosus*, der *amerikanische Holzbock mit hervorstehenden Kinnladen.*

Drury Inf. Tom. I. t. 38. f. 3.

Fabric. S. E. p. 163. *Prionus* 15.

Thorace marginato, crenato, *maxillis porrectis*, intus hirsutus, quadridentatis.

5. *Smirnensis*, der *Haßelquistische Holzbock.*

Haßelquists Reis. nach Paläst. S. 451.

Thorace teretiusculo, subconvexo ad latera vtrinque mucronatus.

III. Klasse.

Holzböcke mit rundem Brustschilde, das an den Seiten dornicht ist.

1. *Afer*, der *grünglänzende afrikanische Holzbock.*

Linn. Mantissa p. 532.

Drury Inf. Tom. I. t. 39. f. 4.

Fabric. S. E. p. 166. *Ceramb.* 9.

Thorace rotundato, spinoso, corpore viridi; *antennis pedibusque* rufis.

Müllers S. B. S. 238. 51. b. der *afrikanische Bock.*

2. *Suaveolus*, das *karolinische Muskusböcklein.*

Müllers S. B. S. 238. 51. a.

Thorace spinoso, coeruleo-ferrugineo-aurato.

3. *Scopoli*,

3. *Scopoli*, *Skopolis-Bockkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 12. No. 233.
Totus niger; in floribus plantarum vmbelliferarum.
Scop. Ent. carn. No. 162. *Cerdo.**)
Niger, *thorace* rugoso, rugis transversis.
Poda Mus. graec. p. 33.

4. *Maculatus*, der *gefleckte Bockkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 12. No. 237.
Sulzers Gesch. p. 45. t. 5. f. 8. der *Gefleckte.*
Fabric. S. E. p. 183. *Rhagium* 3. *bifasciatum.***)
Thorace spinoso; *elytris* fuscis; fasciis duabus obliquis, flavis.

5. *Scabricornis*, das *Rauchhorn.*

Füeßlins Verz. S. 13. No. 241. fig. 3. a, b.
Scop. Entom. carn. No. 174.
Fusco-rufescens, antennis aequalibus, nitidis, interiore latere *denticulatis, scabris.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 210. *Leptura* 6. La *Lepture rouillée.*
Tota nigro-ferruginea; *thorace* subcylindraceo.

6. *Asper*, der *chagrinschwarze italiänische Holzbock.*

Sulzers Gesch. S. 44. t. 5. f. 3. der *Grobe.*
Thorace bispinoso, ater, totus asper et rigidus; *elytra* in medio tuberculata.

7. *Brevis*,

*) S. No. 38. *Sutor.*

**) Bey diesem hat *Fabric.* des *Geoffr. Stenocorus* 1. Inf. Tom. I. p. 222. No. 1. citirt, den de *Geer* bey des *Linn.* Inquisitor B. No. 49. angeführet hat.

7. *Brevis*, der *surinamische Bockkäfer mit kuglichten kurzen Schenkeln.*

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 5. der *Kurze.*

Totus nigricans, *thorace* spinoso; femoribus rotundatis brevibus, tarsisque anticis lobatis, admodum hirsutis.

8. *Sulcatus*, der *surinamische gefurchte Bockkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 6. der *Gefurchte.*

Thorace spinoso; totus viridis, *antennis* fuscis, articulo primo viridi; *elytris* sulcatis.

9. *Ovatus*, der *würtembergische eyrunde Bockkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 9. der *Eyrunde.*

Thorace leviter spinoso; *capite* grandi rotundo; *elytris* ovatis pallido-nigris.

10. *Carinatus*, der *Kielbock in den Gebüschen an der Wolga.*

Pallas Reisen I. Anh. No. 43. Ausz. I. p. 13. No. 43.

Thorace vtrinque tuberculo conico, *elytra* coalita, scabriuscula, obtusa, exterius *carina* longitudinali obtuse angulata.

Müllers S. B. S. 239. 51. e. der *Kielbock.*

11. *Glizyrrhizae*, der *Süßholzbock.*

Pallas Reisen II. Anh. No. 61.

Forma C. *pedestris; antennae* et quibusdam caput picea; *corpus* subtus nigrum, sed totum polline albo irroratum; *elytra* aterrima.

Müllers S. B. S. 238. 51. c.

12. *Holo-*

12. *Holodendri*, der *Robinbock.*

Pallas Reisen II. Anh. No. 62.

Affinis C. *Kählerí*, sed minor; totus ater, poris excavatis punctatus; *thorax* albida lanugine pubescens; *elytra* atra.

Müllers S. B. S. 239. 51. d. der *Robinbock.*

13. *Crucifer*, der *Kreuzträger.*

Lepechins Tageb. I. S. 231. t. 16. f. 6.

Thorace bispinoso; ater; *elytris cruce alba* notatis.

14. *Striatus*, der *gestreifte Holzbock.*

Lepechins Tageb. II. S. 198. t. 10. f. 8.

Thorace bispinoso; totus ater, vbique albo marginatus.

15. *Bifasciatus*, die *Doppelstreife.*

Lepechins Tageb. II. S. 199. t. 11. f. 32.

Thorace spinoso; *elytris* nigricantibus; *fasciis duabus albidis; antennis* corpore duplo longioribus.

16. *Guianus*, der *guianische Bockkäfer mit haarichten Fühlhörnern.*

Rozier Abhandl. I. S. 26. t. 1. f. B.

Americanus subflavescens, nigro conspersus, *antennarum* articulis quatuor primis, numerando a basi *pilosis.*

17. *Spinosus*, der *amerikanische Stachelbock.*

Rozier Abhandl. I. S. 26. t. 1. f. C.

Nigricans; antennis longissimis, spinis tribus introrsum armatis.

18. *Brun-*

18. *Brunnus*, der *amerikanische braunhaarichte Bockkäfer.*

Drury Inſ. Tom. I. t. 37. f. 1.

Forſteri nov. ſpec. Inſ. Cent. 1. p. 37. No. 37.

Thorace triſpinoſo, brunneus, *elytris* obtuſis, ſtriis duabus elevatis obſcuris; *antennis* compreſſis brevioribus.

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 99. No. 3. t. 13. f. 13. *Capricorne de Penſylvanie.*

Penſylvanicus, rufo-fuſcus, *thorace* vtrinque triſpinoſo, pectore tomentoſo fulvo, *antennis* mediocribus.

19. *Incanus*, die *Gelbſtreife.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. 1. p. 38. No. 38.

Thorace ſpinoſo, albus; *elytrorum* faſciis duabus longitudinalibus fulvis, nigro-marginatis, antennis longioribus, ſubciliatis.

20. *Palliatus*, der *amerikaniſche Braunmantel.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. 1. p. 40. No. 40.

Thorace ſpinoſo, violaceus; *elytris* ſubfaſtigiatis a baſi ad medium fere teſtaceis; *antennis* brevibus articulis quatuor clavatis.

21. *Arenarius*, der *Sandbock.*

Scop. Entom. carn. No. 168.

Niger, *apterus;* capite et thorace, linea media longitudinali alba, *elytris* margine albo; *antennis* brevibus.

Poda Muſ. graec. p. 34. *pedeſtris.*

22. *Aethiops*, der *Mohr.*

Scop. Entom. carn. No. 169.

Totus niger, nitidulus, punctatus; *apterus*, antennis brevibus.

23. *Fulvus*, der *Gelbe.*

Scop. Entom. carn. No. 170.

Apterus, punctatus; *elytris* fulvis; antennarum baſes, abdomen, femora, et tibiae, reliqua nigra.

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 99. No. 68. *Prionus* ſanguinolentus.

24. *Timidus*, der *Furchtſame.*

Scop. Entom. carn. No. 171.

Niger; *elytro* flaveſcente, maculis binis atris; longe fugiens ab hoſte, ſub vmbellaque ſe recipiens.

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 99. No. 67. *Prionus.*

25. *Pulverulentus*, der *Beſtäubte.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 95. No. 55.

Triſti ſimilis, ſed minor; antennis brevibus; *elytro* macula, punctoque vno aut duobus nigris conjugatis.

26. *Nodoſus*, der *maryländiſche Knotenbock.*

Fabric. S. E. p. 164. *Ceramb.* 3.

Thorace ſpinoſo; *elytris* cinereis, nigro-maculatis; *antennis* longiſſimis; articulo tertio apice *nodoſo.*

27. *Cancriformis*, der *jamaiſche krebsartige Holzbock.*

Drury Inſ. Tom. II. t. 35. f. 1. *Puſtulatus.*

Fabric. S. E. p. 165. *Cerambyx* 4.

Thorace multidentato; dorſo plano; *elytris* tibiisque anticis vnidentatis.

28. *Biden-*

28. *Bidentatus*, der *amerikanische Holzbock mit zweymal gezähnelten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 165. *Cerambyx* 6.

Thorace subspinoso; *elytris* bidentatis, scabris, cinereo fuscis.

29. *Festivus*, der *afrikanische Staatsbock.*

Fabric. S. E. p. 166. *Cerambyx* 10.

Thorace spinoso, viridi; *elytris* violaceis, basi viridibus, femoribus ferrugineis, vnidentatis.

30. *Vittatus*, der *brasilianische schwarzbandirte Holzbock.*

Fabric. S. E. p. 166. *Cerambyx* 11.

Thorace spinoso; viridis, nitens, thorace elytrisque nigro-lineatis.

31. *Velutinus*, die *amerikanische Schwarzbinde.*

Fabric. S. E. p. 167. *Cerambyx* 12.

Thorace spinoso, niger, *vitta atra.*

32. *Spinicornis*, das *afrikanische Stachelhorn.*

Fabric. S. E. p. 167. *Cerambyx* 13.

Thorace suspinoso, niger, *elytris* viridibus, apice spinosis.

33. *Fasciatus*, der *trankebarische bandirte* Bock.

Fabric. S. E. p. 168. *Cerambyx* 17.

Thorace spinoso, cyaneus; *elytris* fascia flava; *antennis* mediocribus ante apicem flavis.

34. *Pulcher*, der *überaus schöne afrikanische Bockkäfer.*

Drury Inf. Tom. I. t. 32. f. 6.

Fabric. S. E. p. 171. *Lamia* 6.

Thorace spinoso, nigra, antice fasciis, postice punctis viridibus, *elytris* basi mucronatis.

35. *Squamatus*, der *barbadosische Schuppenbock.*

Drury Ins. Tom. I. t. 40. f. 4.

Thorace vtrinque acute spinoso, griseo-squamato; *elytris* nitide nigris, apice maculatis.

36. *Balteatus*, der *virginische Bockkäfer mit dem Queergehenke.*

Drury Ins. Tom. I. t. 37. f. 6.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 111. No. 12. t. 14. f. 3. *Capricorne à baudrier.*

Griseo-fuscus; *thorace* spinoso, *elytris* apice bidentatis, fasciaque ferruginea, antennis longissimis.

37. *Mirabilis*, der *afrikanische Wunderbock.*

Drury Ins. Tom. II. t. 31. f. 1.

Thorace spinoso, nigro-viridis, tantae pulchritudinis, vt describi non possit.

38. *Spinosus*, der *Drurysche Stachelbock.*

Drury Ins. Tom. II. t. 31. f. 3.

Fuscus; *thorace* duabus peracutis spinis prominentibus; supra duabus brevioribus; *elytris* supra, apice et ad latera admodum spinosis.

39. *Notatus*, der *norwegische merklich gezeichnete Bockkäfer.*

Drury Ins. Tom. II. t. 35. f. 2.

Thorace spinoso; *capite*, *antennis*, *thorace*, *pedibusque* flavis; *elytris* griseo-rufescentibus, atro-punctatis et maculatis.

40. *Seti-*

40. *Setifer*, der *Borstenträger.*

Schaeff. Icon. t. 176. f. 5.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1036.
Fusco-alboque varius; *thorace gibbo; elytris* postice integris punctisque hispidis.

41. *Tribulus*, der *afrikanische Vierdorn.*

Fabric. S. E. p. 170. *Lamia* 1.
Thorace quadrispinoso, scutello, *elytris*que spinosis; *antennis* longioribus.

42. *Pedicornis*, das *neuholländische Fußhorn.*

Fabric. S. E. p. 170. *Lamia* 2.
Thorace elytrisque spinosis; *femoribus* anticis cornutis.

43. *Crista*, der *neuseeländische Federbusch.*

Fabric. S. E. p. 170. *Lamia* 3.
Thorace acute spinoso, grisea, *elytris* basi tuberculo compresso tridentato.

44. *Ambulator*, der *Wanderer auf den luzonischen Inseln.*

Fabric. S. E. p. 170. *Lamia* 4.
Thorace antice vtrinque bispinoso, corpore nebuloso.
Petiv. Gazoph. t. 37. f. 6.

45. *Sternutator*, die *barbadosische Löcherdecke.*

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 7.
Thorace spinoso; *elytris* basi porosis, *antennis* mediocribus.

46. *Gutturator*, der *afrikanische Runzelschild.*

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 8.

Thorace spinoso; *elytris* testaceis, albo irroratis, basi punctis elevatis, glabris; thoracis *ruga media* transversali.

47. *Ariolator*, der *indianische Linienschild.*

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 9.

Thorace spinoso, *lineolato*; elytris fuscis; *linea* semicirculari alba.

48. *Titillator*, die *karolinische Nebeldecke.*

Fabric. S. E. p. 172. *Lamia* 11.

Thorace spinoso; elytris cinereo-fusco-glaucoque *nebulosis*, antennis longissimis rufis.

49. *Vittator*, die *campechanische Doppelbinde.*

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 12.

Thorace spinoso; *elytris* cinereo pulverulentis; *vittis duabus flavis*, nigro marginatis.

Petiv. Gazoph. t. 24. f. 6.

50. *Hottentotta*, der *Hottentotte.*

Fabric. S. E. p. 173. *Lamia* 15.

Thorace spinoso, rufo; *elytris* nigris, fascia maculisque duabus marginalibus sanguineis.

51. *Humeralis*, der *Druryische Schulterbock.*

Fabric. S. E. p. 174. *Lamia* 16.

Thorace spinoso; *elytris* flavis, nigro-fasciatis, antice mucronatis.

52. *Trifasciatus*, der *afrikanische dreygestreifte Bockkäfer.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 174. *Lamia* 17.

Thorace subspinoso, atra; *elytris* fasciis tribus flavis, antennis mediocribus

53. *Bifasciatus*, die *jamaische Doppelstreife.*

Fabric. S. E. p. 174. *Lamia* 18.

Thorace spinoso, postice sinuato; *elytris* flavis; *fasciis* duabus maculaque rhombea cyaneis.

54. *Aethiops*, der *kapensische Mohr.*

Fabric. S. E. p. 174. *Lamia* 19.

Thorace spinoso, atra; *elytris* fasciis duabus punctoque apicis luteis; *antennis* mediocribus.

55. *Rotator*, der *indianische Räderbock.*

Fabric. S. E. p. 175. *Lamia* 23.

Thorace spinoso, cinerea, *elytris* subfasciatis; *antennis* mediocribus.

56. *Tornator*, der *amerikanische Schwarzfleck.*

Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 25.

Thorace spinoso, quadripunctato; *elytris* rufis, maculis quatuor nigris; *antennis* brevibus.

57. *Bankii*, der *kapensische Bankische Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 26.

Thorace subspinoso, grisea; *elytris* ferrugineo irroratis; fasciisque duabus cinereis.

58. *Molitor*, die *indianische weisse Dreybinde.*

Fabric. S. E. p. 176. *Lamia* 28.

Thorace subspinoso, fusca: *vittis* tribus integris albis, *antennis* mediocribus.

59. *Bidens*, der *neuholländische Bockkäfer mit zweygezähnten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 177. *Lamia* 30.

Thorace acute spinoso, grisea, *elytris* apice bidentatis.

60. *Solandri*, der *neuholländische Solanderische Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 177. *Lamia* 31.

Thorace subspinoso, nigro; *elytris* bidentatis, fuscis, cinereo irroratis.

61. *Cornutor*, der *amerikanische Bockkäfer mit gehörnten Kinnladen.*

Fabric. S. E. p. 177. *Lamia* 32.

Thorace obtuse spinoso; *maxillis* basi *cornutis*; antennis longissimis.

62. *Leprosus*, der *amerikanische Blatterbock.*

Fabric. S. E. p. 178. *Lamia* 33.

Thorace spinoso; *elytris* basi *variolosis*, cinereis, macula laterali nigra; *antennis* longis.

63. *Garganicus*, der *maryländische Weißmond.*

Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus* 3.

Thorace spinoso; *elytris* bidentatis, testaceis: *lunula* in medio alba.

64. *Semipunctatus*, der *neuholländische halbpunktirte Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 8.

Thorace spinoso, inaequali; *elytris* bidentatis, basi punctatis, apice glabris.

65. *io-ma-*

65. *10-maculatus*, der *amerikanische Zehnfleck.*

Fabric. S. E. p. 181. *Stenocorus* 13.

Thorace subspinoso, quadrimaculato; *elytris* bidentatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis.

66. *Drurii*, der *amerikanische Druryische Bockkäfer mit abgestumpften Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 181. *Stenocorus* 14.

Thorace subspinoso; *elytris* truncatis, bidentatis, ferrugineis, cinereo fasciatis; *antennis* brevibus.

67. *Undatus*, der *amerikanische Bockkäfer mit zwo schwarzen gewässerten Streifen.*

Fabric. S. E. p. 181. *Stenocorus* 15.

Thorace spinoso, cinereus; *elytris* bidentatis; *fasciis duabus undatis*, nigris.

68. *Ornatus*, der *pensylvanische Prachtbockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 183. *Rhagium* 4.

Thorace spinoso, nigrum; *elytris* fascia lata flava.

69. *Tristis*, der *neuseeländische Trauerbockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 186. *Saperda* 11.

Thorace quadrispinoso, corpore fusco.

70. *Oculator*, der *kapensische äugigte Bockkäfer.*

Fabric. App. S. E. p. 823. *Lamia.*

Thorace spinoso, nigra; *elytris* maculis quatuor flavis, *subocellaribus*, antennis longis.

71. *Cyaneus*, der *indianische blaulichte Bockkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 823. *Stenocorus.*

Thorace subspinoso, cyaneus, *elytris* basi flavis.

72. *Lynceus*, der *kapensische Doppelfleck.*

Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 18.

Thorace rotundato, subspinoso, villoso, nigrum; *elytris* macula subdidyma, fulva.

73. *Acuminatus*, der *amerikanische Bockkäfer mit zugespitzten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 194. *Callidium* 30.

Thorace rotundato, *subspinoso*, *elytris* bidentatis, fuscis, strigis quatuor, flavis; *femoribus* clavatis compressis.

74. *Ovatus*, der *eyförmige Bockkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 206. *Ceramb.* 10. Le *Capricorne brun de forme ovale.*

Ovatus fuscus, elytris integris.

75. *Rufo-maculatus*, der *Rothfleck.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 107. No. 8. *Capricorne à taches rouillées.*

Griseus, *thorace* spinoso, *antennis* longis aculeatis; *elytris* basi vnidentatis; maculis sex ferrugineis.

76. *Chinensis*, der *Chineser.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 109. No. 10. *Capricorne de la Chine.*

Niger; *thorace* spinoso, *antennis* longis cinereomaculatis; *elytrorum* lateribus maculis albis sparsis.

77. *Tigrinus*, der *pensylvanische gefleckte Tiger.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 114. No. 15. t. 14. f. 6. *Capricorne tigré.*

Fusco-griseus; *thorace* spinoso, *elytris* maculis punctisque fuscis sparsis, *antennis* longioribus.

78. *Fascia-*

78. *Fasciatus*, der *pensylvanische gestreifte Bockkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 114. No. 16. t. 14. f. 7. *Capricorne rayé.*

Thorace subspinoso; *elytris* truncatis flavo-griseis; fasciis vndulatis punctatis fuscis; *antennis* longioribus maculatis.

79. *Hirsutus*, der *surinamische rauchhaarichte Bockkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 115. No. 17. t. 14. f. 8. *Capricorne velu.*

Fuscus; *thorace* spinoso; *elytris* hirsutis striato-punctatis, antennis mediocribus maculatis.

80. *Gibbus*, der *surinamische Hökerbock.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 116. No. 18. t. 14. f. 9. *Capricorne bossu.*

Fuscus, cinereo-maculatus; *thorace* rugoso subspinoso; *elytris* gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus.

IV. Klasse.

Holzböcke mit cylindrischem Brustschilde ohne Dornen.

1. *Punctatus*, der *portugiesische Punctirte.*

Füeßlins Verz. S. 13. No. 259.
Sulzers Gesch. S. 45. t. 5. f. 10.
Schaeff. Icon. t. 101. f. 1.
Linn. Mant. p. 1067. No. 7.
Müllers Supplem. B. S. 240. 63. a. der *Punktbock.*
Fabric. S. E. p. 187. *Saperda* 14.

Thorace

Thorace mutico, totus viridis, punctis nigris numerosis; *antennis* mediocribus.

2. *Trilineatus*, die *jamaiſche Dreylinie.*

Linn. Mantiſſ. p. 532.
Drury Inſ. Tom. I. t. 41. f. 1.
Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus 6.*
Thorace mutico; *elytris* apice vnidentatis; *margine* omni albo.
Müllers Supplem. B. S. 240. 63. b. der *dreylinige Bock.*

3. *Hieroglyphicus*, der *hieroglyphiſch gezeichnete ſibiriſche Bockkäfer.*

Pallas Reiſen II. Anh. No. 59.
Forma *Scalaris;* ſubtus coeruleſcenti-canus; *elytra* glabra nigra; *caput et thorax* lanuginoſa.
Müllers S. B. S. 241. 63. c. der *Bilderbock.*

4. *Perforatus*, der *ſibiriſche durchbohrte Bockkäfer.*

Pallas Reiſen II. Anh. No. 60.
Magnitudo et forma praecedentis; ſupra pulvere albidus, ſubtus lanugine flaveſcens; *elytra* albido-pulverulenta; *quinque* a dorſo longitudinaliter poſitis *punctis* nigris, *tot foramina* referentibus.
Müllers S. B. S. 241. 63. d.

5. *Tetrophthalmus*, das *neuyorkiſche Vierauge.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 41. No. 41.
Thorace mutico ſubcylindrico, corpore nigro-cineraſcente; capite, thorace, et *elytris* rubris nigropunctatis, *oculis quatuor;* antennis brevibus.

6. *Ferru-*

6. *Ferrugineus*, der *amerikanische Rostbock.*

Rozier Abhandl. 1. Th. S. 27. t. 1. f. D.
Capite et thorace nigricantibus, *elytris* ferrugineis; *antennis* introrsum spinosis.

7. *Carbonarius*, der *Köhler.*

Scop. Ent. carn. p. 55. No. 178.
Niger totus et opacus; *antennis* brevibus.

8. *Lunulatus*, der *jamaische Bockkäfer mit dunkelbraunen halben Monden.*

Drury Ins. Tom. I. t. 37. f. 4.
Obscure fusco-rufescens; *thorace* subcylindrico mutico; *elytris* pallide-rubeis, quatuor fuscis lunulis; apice dentatis; sutura prope thoracem *cor fuscum* referentibus.

9. *Spinicornis*, das *jamaische Stachelhorn.*

Drury Ins. Tom. I. t. 41. f. 4.
Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus* 7.
Thorace inermi, tuberculato, *elytris* bidentatis, antennarum articulis bispinosis.

10. *Marginalis*, der *kapensische Schwarzrand.*

Fabric. S. E. p. 169. *Cerambyx* 22.
Thorace inermi; *elytris* subtestaceis; *margine* omni nigro.

11. *Brevicornis*, das *afrikanische Kurzhorn.*

Fabric. S. E. p. 169. *Cerambyx* 23.
Thorace inermi, viridi; *elytris* obscuris; *antennis* brevibus nigris.

12. *Glabra-*

12. *Glabratus*, die *Glattlinie von der Kreuzinsel.*

Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 10.

Thorace mutico, cinereo, *linea glabra*, fusca; *elytris* bidentatis.

13. *Annulatus*, der *Bankische Dreyringel.*

Fabric. S. E. p. 180. *Stenocorus* 12.

Thorace lineato; *elytris* vnidentatis; *antennis* longioribus; *annulis* tribus albis.

14. *Hirtus*, der *neuseeländische Haarbock.*

Fabric. S. E. p. 184. *Saperda* 4.

Grisea, *villosa;* scutello flavo.

15. *Lateralis*, die *Bankische Rostseite.*

Fabric. S. E. p. 185. *Saperda* 7.

Nigra; thoracis *lateribus*, elytrorumque vitta *laterali ferrugineis.*

16. *Lynceus*, der *neuseeländische Schielbock.*

Fabric. S. E. p. 185. *Saperda* 8.

Thorace atro, puncto vtrinque ferrugineo: *elytris* griseis, acuminatis.

17. *Tremulus*, der *hallische Zitterbock.*

Fabric. S. E. p. 186. *Saperda* 13.

Viridis, *thorace* punctis duobus; *elytris* quatuor nigris.

18. *Violaceus*, der *piemontesische Blaubock.*

Fabric. S. E. p. 187. *Saperda* 15.

Thorace cylindrico, inermi; corpore *violaceo.*

19. *Villoso-virideſcens*, der *grünhaarichte Bockkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 76. No. 13. *Capricorne velu verdâtre.*

Flavo-viridis; *thorace* mutico cylindrico; faſciis tribus longitudinalibus flavis; *antennis* longioribus nigro cinereoque maculatis.

20. *Pygmaeus*, der *Zwerg.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 80. No. 17. t. 4. f. 5. *Capricorne nain.*

Minutiſſimus fuſcus; *thorace* mutico cylindrico; *antennis* ſerratis piloſis.

21. *Minimus*, der *kleinſte Bockkäfer.*

Seligm. ausl. Vögel Tom. IV. t. 108. f. 4.
Scarab. *capricornus*, cutem penetrans.

22. *Hirtipes*, der *indianiſche Rauchfuß.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 116. No. 19. t. 4. f. 10. *Capricorne à tarſes velus.*

Fuſcus; *thorace* mutico cylindrico, *elytris* apice truncatis bidentatis, plantis anticis *hirſutis*; antennis longioribus medio macula alba.

23. *Puſtulatus*, der *gebrandmarkte Holzbock.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgeſch. S. 66. §. 10.
Niger; *thorace inermi cylindrico*; medio macula ferruginea.

24. *Erytrocephalus*, der *rothköpfigte Holzbock.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgeſch. S. 67. §. 12.
Thorace inermi cylindrico; niger; capite, thorace, pedibus abdomineque poſtice teſtaceis.

V. Klasse.

Holzböcke mit rundem Bruſtſchild ohne Dornen.

1. *Clavipes*, der *amerikaniſche Keulfuß.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 42. No. 42.

Thorace globoſo mutico, ferrugineo, corpore teſtaceo, *capite* nigro; *femoribus* clavatis, vſtulatis; antennis hiſpidis mediocribus.

v. No. 8.

2. *Floralis*, der *jaikiſche Blumenbock.*

Pallas Reiſen II. Anh. No. 63.

Thorax flavus, zona lata flava. *Corpus* ſubtus totum pulcherrime citrinum; *antennae* pedesque teſtaceae. *Caput* flavo-annulatum. *Elytra* nigra, faſciis pulcherrime flavis.

Müllers S. B. S. 242. 84.

3. *Villicus*, der *Wollbock.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 13. No. 133.

Thorace mutico, cupreo tuberculato; *elytris* nigris; punctis ſtriatis; *antennis* abdomine pedibusque ferrugineis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1066.

Thorace cupreo, tuberculato; *elytris* nigris, punctis ſtriatis; antennis abdomine pedibusque ferrugineis.

Fabric. S. E. p. 196. *Lept.* 3.

Ferruginea; antennis elytrisque fuſcis.

4. *Viridis*, der *grüne Uferbock.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 134.

Thorace mutico, tuberculato, violaceo; *elytris viridibus*, punctis ſtriatis; *antennis* nigris.

Mülleri

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1067.

Leptura (viridis) thorace violaceo, tuberculato; *elytris* viridibus, punctis striatis; *antennis* nigris.

5. *Variegatus*, die *neuyorkische Buntschecke.*

Drury Ins. Tom. I. t. 41. f. 6.

Thorax niger, ovatus, griseo-flavo-villosus; *elytra* griseo-flavo-variegata.

6. *Bipunctatus*, der *afrikanische Zweypunkt.*

Drury Ins. Tom. II. t. 31. f. 2.

Totus griseo-fuscus; *thorace* rotundato mutico;*) *elytris* griseis, ad marginem macula flava rhomboïdali, in quarum margine *bini oculi* aterrimi.

7. *Marylandicus*, der *maryländische Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 179. *Stenocorus* 5.

Thorace depresso, tuberculato, mutico; *elytris* bidentatis, fusco cinereoque nebulosis; *antennis* mediocribus.

8. *Blandus*, der *indianische violette Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 182. *Calopus* 2.

Violaceus; *elytris* antice luteis, *antennis* brevibus.

9. *Clavipes*, der *deutsche Keulträger.*

Fabric. S. E. p. 188. *Callidium* 3.

Nigrum, opacum; *femoribus* omnibus clavatis; *antennis* longioribus. *v. No. 1.*

10. *Bar-*

*) In der Beschreibung sagt der Verf. zwar: es sitze an jeder Seite des Brustschilds ein dicker Dorn, den ich aber in der Zeichnung gänzlich vermisse, weshalb ich ihn auch in diese Klasse gebracht habe.

10. *Barbatus*, der *trankebarische gebärtete Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 189. *Callidium* 8.

Thorace rotundato, subtus vtrinque macula tomentosa, ferruginea; *antennis* longioribus *barbatis.*

11. *Variegatus*, die *neuseeländische Buntschecke.*

Fabric. S. E. p. 189. *Callidium* 9.

Thoracis dorso glabro, atro, lineis quatuor albis; *elytris* flavo irroratis.

12. *Lineatus*, der *neuseeländische lineirte Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 189. *Callidium* 10.

Thorace lineis duabus; *elytris* quatuor albis, mediis coeuntibus, abbreviatis.

13. *Sulcatus*, der *neuseeländische Gefurchte.*

Fabric. S. E. p. 189. *Callidium* 11.

Thorace tomentoso, cinereo; *elytris* albo nigroque striatis.

14. *Hafniensis*, der *kopenhagische schwarze Bockkäfer mit vier weissen Linien.*

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium* 15.

Thorace subvilloso, nigro; *lineis quatuor albis*, intermediis abbreviatis; *antennis* brevibus.

15. *Aulicus*, der *kopenhagische schwarze glatte Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 190. *Callidium* 16.

Thorace laevi, nitido, corpore nigro, opaco; *elytris* laevibus; *antennis* brevibus.

16. *Flavus*,

16. *Flavus*, der *amerikanische gelbe Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 19.
Thorace subrotundo, mutico, corpore flavo; *femoribus* clavatis, *antennis* mediocribus.

17. *Colonus*, der *karolinische Kolonist.*

Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 21.
Thorace rotundato; *elytris* lividis, *fasciis* tribus fuscis; *antennis* brevibus.

18. *Flexuosus*, der *amerikanische Bockkäfer mit sieben gebogenen Streifen.*

Fabric. S. E. p. 191. *Callidium* 22.
Thorace rotundato, flavo-fasciato; *elytris* fasciis septem flavis, anticis antrorsum, posticis retrorsum arcuatis.
Petiv. Gazoph. t. 27. f. 3.

19. *Minutus*, der *neuseeländische kleine Bockkäfer.*

Fabric. S. E. p. 192. *Callidium* 23.
Testaceum; *elytris* fascia abbreviata, alba.

20. *Angulatus*, der *amerikanische Winkelbock.*

Fabric. S. E. p. 192. *Callidium* 24.
Thorace globoso, nigro, flavo, fasciato; *elytris* nigris; fasciis sex flavis, secunda tertiaque *angulatis.*

21. *Fulminans*, der *Bankische Strahlenbock.*

Fabric. S. E. p. 192. *Callidium* 25.
Thorace globoso, maculato; *elytris* nigris; fasciis *undato-angulatis* albis.

22. *Mucronatus*, der *amerikanische Bockkäfer mit kronzackigen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 193. *Callidium* 29.

Thorace rotundato, maculato; *elytris* mucronatis nigris, strigis tribus arcuatis, flavis, basi ferrugineis.

23. *Aegyptiacus*, der *aegyptische Rostbock.*

Fabric. S. E. p. 194. *Callidiam* 33.

Thorace rotundato, ferrugineo, *elytris* cinerascentibus; *fasciis* tribus fuscis, prima annulari.

24. *Clavicornis*, das *kapensische Breithorn.*

Fabric. S. E. App. p. 824. *Saperda.*

Thorace rotundato, viridis; *elytris* maculis tribus flavis.

25. *Longipes*, der *kapensische Langfuß.*

Fabric. S. E. App. p. 824. *Saperda.*

Thorace subgloboso, violacea; *antennis* longioribus; *femoribus* clavatis.

25. *Nigro-planus*, der *schwarze flache Bockkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 88. No. 23. *Capricorne noir applatti.*

Corpore thoraceque mutico subrotundo depressis; *femoribus* clavatis; *antennis* mediocribus crassis.

Hoefn. Ins. Tab. 16.

26. *Aeneus*, der *erzfarbige Bockkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 89. No. 25. *Capricorne bronzé.*

Fusco-aeneus, nitidus; *thorace* mutico subrotundo depresso, *antennis pedibusque nigris.*

28. *Pulve-*

28. *Pulverulentus*, der *pensylvanische bestaubte Bockkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 118. No. 21. t. 14. f. 12. *Capricorne poudré.*

Thorace mutico subrotundo, convexo, nigro-fusco; *elytris* castaneis griseo-villosis, apice bidentatis; *antennis* longioribus aculeatis.

29. *Lucidus*, der *Leuchtbock.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 60.
Stenocorus, niger; *elytris* fusco-castaneis, *lucidis.*

30. *Rufus*, das *Fuchshorn.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 61.
Stenocorus niger; *thorace* villoso; *antennis* rufis;

31. *Fuliginosus*, der *Rostbock.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 62. *Stenocorus.*
Totus ater, opacus; *antennae* mediocres.

32. *Fenicus*, der *Zweyhöker.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 63. *Stenocorus.*
Elytra atro-violacea; *thorax* nitens, rufus; *tuberculis obscuris binis.*

33. *Calcaratus*, der *Spornbock.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 98. No. 64. *Stenocorus.*
Totus nigro-violaceus; *femora* rufa; posticis *dente* instructis.

34. *Caraboïdes*, der *laufkäferartige Holzbock.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 65. *Stenocorus.*
Statura et facies *Carabi* minoris; totus rufus; *elytris* atro-violaceis.

35. *Ater*, der *schwarzpunktirte Holzbock.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 69. *Prionus.*

Totus niger *punctatus*, *elytris* truncatis; *antennis* mediocribus.

36. *Bracatus*, die *Dickhüfte.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 70. *Prionus.*

Niger; *antennis* pedibusque rufis; *femoribus* posticis *crassis*; spina armatis.

37. *Tenuis*, der *Schmale.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 71. *Prionus.*

Niger, nitens; *elytris* attenuatis; *antennis* mediocribus.

38. *Octopunctatus*, der *Holzbock mit acht Punkten.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgesch. S. 65. §. 9.

Viridis; thorace *tereti* mutico; *elytris* punctis octo nigris.

39. *Ferreus*, der *eisenfarbigte Holzbock.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgesch. S. 66. §. 11.

Thorace *tereti* mutico, plumbeo-niger immaculatus.

205. GESCHLECHT. Leptura; *Schmalschwanz. Holl.* Bokjes. *Afterbockkäfer.*

Müllers Linn. Natursy. 5. B. I. Th. S. 283. *weiche Holzböcke.*

Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 14. *Afterbockkäfer.*

Sulzers Kennz. der Ins. S. 64. *weicher Bockkäfer.*

— — abgekürzte Gesch. der Ins. S. 46. *Afterbockkäfer.*

Pontop-

Pontoppid. N. G. von D. S. 206. *weicher Holzbock.*
Börners Samml. I. Th. S. 471. *)
Eberhards Thiergesch. S. 198. *Afterholzkäfer.*
Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 97. *Holzkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 4. S. 790. *Holzkäfer.*
Bomar. Dict. des Anim. V. p. 291.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura.* p. 221. *Stenocorus.*
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 121. des *Leptures.*
Fabric. S. E. p. 195. *Donacia* et p. 196. *Leptura.*
Scop. Entom. carn. p. 45.
— Ann. 5. hist. nat. p. 100.
Müllerі Faun. Fridr. p. 14.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 92.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 194.
Pallas Spicil. Zool. fascic. 9. p. 4. **)

I. *Mit eyförmigem Bruststück und abgestutzten Flügeldecken.*

1. *Aquatica*, der *Wasserschwimmer.*
Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 284.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 269. *Wasser-Afterbockkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 203. No. 1. †)

*) Der Name: *weiche Holzböcke*, den ihnen *Sulzer* in seinen Kennzeichen beygeleget hat, ist nicht der bequemste, wie Herr M. *Börner* erinnert, indem *Sulzer* selbst nachher sagt: dass die Flügeldecken der Lepturen härter, als bey den vorigen von gleicher Grösse wären.

**) Nach *Pallas* Meynung ist der Uebergang von den Lepturis zu den Cerambycibus so unmerklich, dass sie füglich für einerley Geschlecht zu halten sind.

†) Der Bischof gedenkt einer Abänderung, die an der hintersten Lende keinen Zahn hat. Das besondere daran ist dieses, dass

Frisch Inf. XII. Th. S. 33. No. 28. 3. Pl. t. 6. f. 2. der *braun verguldete Holzkäfer von mittelmäßiger Größe nach den kleinen.*

Acta Vpsal. 1736. p. 20. No. 3. *Leptura* rubro-aenea.

Poda Muf. graec. p. 36.

Fabric. S. E. p. 195. *Donacia* 1. *craſſipes.*

Femoribus poſticis clavatis, dentatis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 14. No. 135.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1039.*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 229. *Stenocorus* 12. Le *Stenocore doré.***)

Deauratus; *femoribus* poſticis dentatis.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 140. No. 18. t. 4. f. 14. 15. *Lepture aquatique à cuiſſes épineuſes.*

Leptura *(aquatica ſpinoſa)* viridi deaurata, ſeu violacea, *antennis* nigris, pedibus fuſcis, *femoribus* poſticis magnis dentatis.

2. *Melanura*, der *Schwarzafter.*

Müller l. c. S. 284. No. 2. t. 6. f. 1. 2. der *Schwarzarſch.*

Füeßlins Verz. S. 14. No. 270. *Schwarzarſch.*

Gleditſch Forſtwiſſ. 2. Th. S. 792. No. 27. der *große ſchwarze Holzbock mit rothſchwarzen Flügelſpitzen.*

Acta

daſs ſie an den hinterſten Füſsen mit einem ſolchen *Haarbuſche* verſehen iſt, wie der *Waſſerkäfer*, und gleichwohl *Klauen* hat. Uebrigens ein ächtes *Amphybium*, ſowohl der Geſtalt, als der Lebensart nach.

*) Aliam, ſagt der berühmte Staatsrath M. reperi copioſe: thorace elytrisque nigris; antennis pedibusque ferrugineis. An var. *aquaticae? Schaeff.* Icon. t. 103. f. 6.

**) *Geoffroi* hat *fünferley* Abänderungen derſelben.

Acta Upsal. 1736. p. 20. No. 5. *Elytris* testaceis, apice nigris (quae mas) — No. 4. *Elytris* rubris.
Schaeff. Icon. t. 39. f. 4. (cit. *Füeßl.* et *Fabric.*)
— — — f. 8. 9. (cit. de *Geer*).
Fabric. S. E. p. 196. *Leptura* 1.
Act. Nidr. III. 13.
Müllerі Faun. Fridr. p. 14. No. 136.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1053.

Nigra, *thorace* conico; *elytris* attenuatis, rufofuscis; sutura apiceque nigris.

a. *Thorace* con. elytr. att. luteis, margine apiceque nigris; abdomine argenteo.

b. *Thorace* con. elytr. att. pedibusque luteis; margine suturaque nigris.

An varietates?

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 226. *Stenocorus* 7. t. 4. f. 1. Le *Stencore noir à etuis rougeatres.*

Niger, *elytris* rubescentibus lividis.

Scop. Ent. carn. No. 149. Nigra, *elytris* sordide flavescentibus, apice nigris.

Poda Mus. graec. p. 37.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 137. No. 14. *Leptura variable.*

L. (*variabilis*) nigra, pedibus posticis corpore longioribus; *elytris* MARIS flavo-testaceis, apice nigris; FEMINAE obscure rubris.

3. *Rubra*, der *Rothschild.*

Müller l. c. S. 285. No. 3. das *Purpurschild.*

Füeßlins Verz. S. 14. No. 271.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 792. No. 28. der *große schwarze Holzbock mit dem rothen Bruststücke, Füssen und Flügeldecken.*

Frisch Inf. 12. Th. S. 37. 3. Pl. t. 6. f. 6.*) der *braunrothe Holzkäfer der größern und kleinern Art, als dem Weiblein, und deren braungelben Männlein.*

Schaeff. Icon. t. 39. f. 2.
Fabric. S. E. p. 196. No. 4.
Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 139.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1056.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 132. No. 7. *Lepture rouge.*
Nigra; *thorace*, elytris tibiisque obscure rubris.

4. *Sanguinolenta*, der *Blutflügel.*

Müller l. c. S. 285. No. 4.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 272. der *Blutschild.*
Schaeff. Icon. t. 39. f. 9.
Fabric. S. E. p. 196. No. 2.
Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 137.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1052.
Nigra; *thorace* conico; *elytris* attenuatis, sanguineis.

5. *Testacea*, der *Gelbschild.*

Müller l. c. S. 285. No. 5. das *Ziegeldach.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 274.
Fabric. S. E. p. 197. No. 5.
Schaeff. Icon. t. 39. f. 3. (alleg. *Füeßl.* et *Fabric.*)
— — — t. 85. f. 7. (teste *Müllero*).
Raj. Inf. 82. No. 19. Scarabaeus, *Capricornus* dictus; *elytris* et pedibus fulvis, seu rufis; *thorace* longo, angusto nigro.

Mülleri

*) Es hat zwar *Linné* bey der vorigen eben das Citatum des *Frisch* angeführet, das bey dieser stehet, weil aber solches *Fabric.* sowohl als der Herr de *Geer* bey dieser allein gesetzt hat, so glaub' ich, dass es hier am rechten Orte stehe.

Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 138.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1054.
Nigra; *thorace* conico; *elytris* attenuatis; tibiis, tarsisque luteis.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 135. No. 11. *Lepture à etuis jaunes.*
Nigra; *elytris*, tibiis pedibusque flavo-testaceis.

6. *Revestita*, *Schrebers Schwarzdecke.**)
Müller l. c. S. 285. No. 6. die *Schwarzdecke.*

7. *Virens*, das *schwedische Grünböcklein.***)
Müller l. c. S. 286. No. 7. das *Grünböcklein.*
Acta Upsal. 1736. p. 20. No. 6. Leptura maxima nigra, subtus virescens.
Fabric. S. E. p. 197. No. 6.
Sericeo-virescens; *antennis* fusco viridique variis.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 131. No. 6. *Lepture verte.*
Flavo-viridis; *antennis* nigro-luteoque variis.

8. *Sericea*, das *schwedische Seidenböcklein.*
Müller l. c. S. 286. No. 8. das *Seidenböcklein.*
Fabric. S. E. p. 198. No. 15.
Schaeff. Icon. t. 84. f. 1.

9. *4-maculata*, der *schwarze Vierfleck.*
Müller l. c. S. 286. No. 9. der *Schwarzfleck.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 275. *Vierfleck.*
Schaeff. Elem. t. 118. f. 2. *Stenocorus*, *Stutzkäfer.*
— — Icon. t. 1. f. 7.
Fabric. S. E. p. 197. No. 10.

*) Nicht abgebildet. **) Nicht abgebildet.

10. *Interrogationis*, das *Fragzeichen.*

Müller l. c. S. 286. No. 10.
Müllerі Faun. Fridr. p. 14. No. 140.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1057.

11. *6-maculata*, der *Sechsfleck.*

Müller l. c. S. 287. No. 11. der *Punktrand.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 276. *Sechsfleck.*
Acta Vpsal. 1736. p. 20. No. 7. Leptura *elytris* testaceis, maculis nigris.
Fabric. S. E. p. 197. No. 11.
Raj. Inf. 81. 18. Scarabaeus *elytris* pallidis, nigris maculis pictis.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1058.
Schaeff. Icon. t. 39. f. 6. (alleg. *de Geer*). *)
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 133. No. 9. *Lepture à bandes jaunes.*
L. *(testaceo-fasciata)* nigra, *elytris* fasciis tribus transversis vndulatis testaceo-flavis.

12. *4-fasciata*, das *Vierband.*

Müller l. c. S. 287. No. 12.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 277. *Vierband.***)
Schaeff. Icon. t. 59. f. 6.
Fabric. S. E. p. 198. No. 13.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1047.
Nigra, *thorace* conico; *elytris* attenuatis; *fasciis* quatuor flavis.

de *Geer*

*) Aus dieser *Schäfferschen* hat *Müller* Prodr. p. 93. No. 1046. eine *neue* fasciata gemacht.

**) Das Citatum beym *Füeßlin* muss nicht heissen *Schaeff.* Icon. t. 39. sondern t. 59. denn die t. 39. f. 6. ist eine *neue*. S. *Müllerі* Prodr. p. 93. No. 1046. L. *fasciata.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 132. No. 8. t. 4. f. 11. *Lepture à huit taches jaunes.*

L. *(octo-maculata)* nigra, maculis quatuor flavis in singulo elytro.

13. *Attenuata*, der *Schmalbock.**)

Müller l. c. S. 286. No. 14. der *Schmalhans.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 278.
Schaeff. Icon. t. 65. f. 11.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1048. Nigra; *thorace* conico; *elytris* fastigiatis, attenuatis; fasciis quatuor; pedibus abdomineque fulvis.
Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 99. No. 66. *Prionus* attenuatus.
Fabric. S. E. p. 198. No. 12.**)

14. *Nigra*, der *schwarze Afterbockkäfer.*

Müller l. c. S. 286. No. 14. t. 6. f. 3. der *Spiegel.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 279. der *Schwarze.*
Abhandl. der schwed. Akad. der Wissensch. 30. Th. S. 195. †)
Schaeff. Icon. t. 39. f. 7.
Fabric. S. E. p. 197. No. 8.

Mülleri

*) *Linné* frägt hierbey: ob dies wohl das Männchen des vorigen seyn möchte, und Herr *Müller* sagt nichts weiter, als es sey möglich; *Scopoli* aber und *Füeßlin* bezeugen durch ihre Erfahrungen, da sie beyde in der Begattung angetroffen: dass diese Attenuata das Weibchen der L. quadrifasc. sey.

**) Das *Schäfferſche* Citatum daselbst Icon. t. 39. f. 6. ist falsch, und muss heissen: t. 65. f. 11. (teste *Müll.*)

†) An diesen Lepturen hat der Herr von *Geer* eine besondere Art von *Milben* l. c. t. 4. f. 1-7. entdeckt.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1050. Nigra, atra; *thorace* conico; *elytris* attenuatis; *abdomine* rufo. *)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 227. *Stenocor.* 9. Le *Stencore noir à ventre rougeâtre.*

Niger nitidus, *abdomine* fuſco rubente.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 144. No. 24. *Lepture noire.*

II. *Mit erhabenem runden Bruſtſtück und ſtumpfen Flügeldecken.*

15. *Virginea*, die *Jungfer.*

Müller l. c. S. 288. No. 15.

Füeßlins Verz. S. 14. No. 280.

Schaeff. Icon. t. 58. f. 3. (all. *Füeßl.* et de *Geer*).

— — — t. 4. f. 13. (all. *Müllero*).

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 552.

Cicindela elytris viridi-coeruleſcentibus; abdomine fulvo.

Fabric. S. E. p. 198. No. 17.

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 856. der *grünblaulichte leuchtende Käfer mit dunkelrother Bruſt.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1064.

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 144. No. 23. *Lepture à etuis bleues.*

L. *(violacea)* nigra; *elytris* violaceis nitidis; abdomine flavo-rufo.

16. *Collaris*, der *Rothhals.*

Müller l. c. S. 288. No. 16.

Füeßlins Verz. S. 14. No. 281. **)

Fabric.

*) Das hier angeführte *Schäfferſche* Citatum t. 29. f. 7. muſs wohl heiſſen: t. 39.

**) Im *Füeßlin* muſs es heiſſen: Schaeff. t. 58. f. 9.

Fabric. S. E. p. 198. No. 16.
Schaeff. Icon. t. 58. f. 9.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 228. *Stenocorus* 11. Le *Stencore noir à corcelet rouge.*
Niger, *thorace* rubro.
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 551. *Cicindela* atra; *thorace* rufo, *elytris* nigro-coeruleis.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 855. der *ſchwarze leuchtende Käfer mit rother Bruſt und ſchwarzblauen Flügeldecken.*
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 143. No. 22. *Lepture à corcelet rouge.*
L. *(ruficollis)* nigra; *thorace* abdomineque rubris.

17. *Ruſtica*, das *Baurenböcklein.*
Müller l. c. S. 288. No. 17.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 282.*)
Fabric. S. E. p. 193. *Callidium* 28.
Thorace globoſo, immaculato; *elytris* nigris; *faſciis* linearibus albis.
Raj. Inf. 83. 25. *Scarabaeus* niger, *elytris* lineis duabus albis.
Petiv. Gazoph. t. 63. f. 5.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1041.
Nigra; *thorace* globoſo; *elytris* fuſcis, lineis transverſis tribus albis, antica arcuata puncto medio.
Schaeff. Icon. t. 2. f. 7.
Geoffr. Inf. Tom. V. p. 215. *Leptura* 12. La *Lepture à rayes blanches.*
Nigra; *elytrorum* lineis transverſis punctisque albis.

18. *M.*-

*) Im *Füeßlin* muſs es bey *Schaeff.* Icon. nicht t. 11. ſondern t. 2. heiſsen.

18. *Mystica*, das *vielfarbige Böcklein.*

Müller l. c. S. 288. No. 18. der *Scheck.*
Füeßlins Verz. S. 14. No. 283. *Vierfarbigter.*
Fabric. S. E. p. 194. *Callidium* 34.
Thorace rotundato; *elytris* fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis.

Raj. Inf. p. 83. No. 26. *Scarabaeus* parvus; *elytris* triplici colore, rufo, albo, nigro.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1042.
Nigra; *thorace* globoso; *elytris* antice rufis, postice cinereis, medio nigro lineis arcuatis albis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 217. *Leptura* 15. La *Lepture arlequine.*
Nigra; *elytris* maculis testaceis, nigris, albidis, lineisque nigris, et albicantibus variegatis.
List. App. p. 386. No. 15. *Scarabaeus* niger, summis alarum thecis flavescentibus, iisdemque imis albicantibus, praeter alias quasdam lineolas albidas.
de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 82. No. 19. *Capricorne à rayes blanches courbées.**)
CERAMBYX *(albi-fasciatus)* niger, *thorace* mutico subgloboso, *elytris* lineis tribus arcuatis, fasciaque transversa griseis; *antennis* brevioribus.

19. *Alni*, das *Erlenböcklein.***)

Müller l. c. S. 289. No. 19.
Fabric. S. E. p. 195. *Callidium* 35.

20. *Detrita*, das *verblaßte Böcklein.*

Müller l. c. S. 289. No. 20. der *Queerstrich.*

*) Der Herr de *Geer* hat hierbey des *Geoffr.* Lept. 12. Tom. I. p. 215. angeführt, die *Fabric.* bey der vorigen, nämlich bey der *Rustica* citirt hat.

**) *Nicht abgebildet.*

Vddm. Diss. 31.
Schaeff. Elem. t. 76. f. 2. *Leptura*, *Afterholzkäfer.*
— — Icon. t. 38. f. 9. t. 64. f. 3.
Fabric. S. E. p. 194. *Callidium* 31.
Thorace rotundato, flavo, fasciato; *elytris* nigris; *fasciis* quinque flavis, pedibus ferrugineis.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1049.
Nigra; *thorace* globoso, fasciis duabus; *elytris* fasciis quinque luteis; antennis pedibusque rufis.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 216. *Leptura* 13.
La *Lepture noire à etuis gris tachés de jaune.*
Nigra; *elytris* pallido-fuscis, signaturis flavis.

21. *Arcuata*, der *Bogenstrich.*

Müller l. c. S. 289. No. 21. t. 6. f. 5.
Füeßlins Verz. S. 14. No. 284. *Bogenstrich.*
Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 980. No. 32. der *schwarze Baumkäfer mit gelben Queerstreifen, von welchen etliche bogenweise zurückgeschlagen sind.*
Frisch Ins. 12. Th. S. 31. No. 22. 3. Pl. t. 4. f. 1. der *schwarze mit gelb bezeichnete Holzkäfer.*
Fabric. S. E. p. 192. *Callidium* 26.
Thorace rotundato; *elytris* fasciis quatuor flavis, prima interrupta; reliquis retrorsum arcuatis.
Raj. Ins. p. 83. No. 23. *Scarabaeus* major, corpore longo, angusto, nigro, cum tribus in vtraque ala lineis transversis, lutescentibus.
Leche nov. ins. spec. diss. abo. sp. 30. *Cerambyx* niger, *elytris* fasciis quatuor flavis, arcuatis.
Müllleri Faun. Fridr. p. 14. No. 142.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1063.
Nigra; *thorace* globoso; *elytris* fasciis flavis, tribus recurvis, *antennis pedibus*que rufis.
Schaeff. Icon. t. 38. f. 6. t. 107. f. 2. 3.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 97. No. 58.

Stenocorus, niger; *elytro* basi et apice fasciisque tribus flavis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 212. *Leptura* 10.*) La *Lepture aux croissans dorés.*

Nigra; *elytrorum* lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis; pedibus testaceis.

Petiv. Gazoph. t. 63. f. 7.

22. *Verbasci*, das *Wollkrautböcklein.*

Müller l. c. S. 290. No. 22.

Füeßlin Verz. S. 14. No. 285.

Sulzers Gesch. S. 47. t. 5. f. 12. der *Wollblumkäfer.*

Fabric. S. E. p. 194. *Callidium* 32.

Thorace rotundato, nigro, maculato; *elytris* subviresccntibus, fasciis tribus nigris, prima lunari.

23. *Arietis*, der *Widder.*

Müller l. c. S. 290. No. 23. t. 6. f. 6. *holl.* Ouruſt; die *Unruhe.*

Füeßlins Verz. S. 14. No. 286. der *Widder.*

Frisch Ins. 12. Th. S. 32. No. 25. die *fünfte Art schwarzer mit gelb bezeichneter Holzkäfer.* 3. Pl. t. 5. f. 3.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 981. No. 33. der *schwarze gelb und queer gestreifte Baumkäfer, woran der zweyte Streif vorwärts in einen Bogen gehet.*

Acta Upsal. 1736. p. 20. No. 8. *Leptura* elytris nigris lineis flavis.

Fabric. S. E. p. 193. *Callidium* 27.

Mülleri Faun. Fridr. p. 14. No. 141.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 92. No. 1040.

Schaeff. Icon. t. 38. f. 7.

Scop.

*) Im *Linn.* stehet statt No. 10. No. 23.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 96. No. 57.

Stenocorus niger; *elytro* singulo apice fasciisque binis luteis, suprema obliqua.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 214. *Leptura* 11. La *Lepture à trois bandes dorées.*

Nigra; *elytrorum* lineis tribus transversis punctisque flavis; *pedibus* testaceis.

de *Geer* Ins. Tom. V. pag. 81. No. 18. *Capricorne à quatre bandes jaunes.* *)

CERAMBYX *(4-fasciatus)* niger; *thorace* mutico subgloboso; *elytris* fasciis flavo-citreis, secunda obliqua; *pedibus* ferrugineis; *antennis* brevioribus.

24. *Praeusta*, das *Zwergböcklein.*

Müller l. c. S. 290. No. 24.

Füeßlins Verz. S. 14. No. 287.

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 981. No. 34. der *braune gelbgeflügelte Baumkäfer.*

Fabric. S. E. p. 187. *Saperda* 16.

Nigra; *elytris* flavis, apice nigris.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1074.

Nigra; *thorace* cylindrico; *elytris* flavis, apice nigris, pedibus anticis luteis.

Schaeff. Icon. t. 52. f. 8.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 80.

Nigra; *elytris* testaceo-flavis, apice nigris.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 209. *Leptura* 4. La *Lepture noire à etuis jaunes.*

Nigra, *elytris* flavis, apice nigris.

*) Hierbey hat der Heer de *Geer* nach *Schaeff.* Icon. t. 107. f. 3. die ich in des Herrn Staatsrath *Müllers* Prodr. bey der *arcuata* finde.

25. *Linearis*, der *ostindische Schmalbauch.**)
Müller l. c. S. 291. No. 25. der *Schmalbauch.*

Unabgebildete Lepturen.

I. *Klasse.*

1. No. 6. *Revestita.*
2. No. 7. *Virens.*

II. *Klasse.*

1. No. 19. *Alni.*
2. No. 25. *Linearis.*

NEUE LEPTURENARTEN.

I. *Mit eyförmigem Bruststück, und abgestutzten Flügeldecken.*

1. *Plumipes*, der *Federfuß.*

Pallas Spicil. Zool. fasc. 9. p. 4. 5. t. 1. f. 2. 3.

Habitus gracillimus; moles infra *Melanuram;* corpus totum subtilissime punctatum; *thorax* teretiusculus muticus; *elytra* linearia, subattenuata, apice late praemorsa, pedes postici longissimi; eorumque *tibiae* extremitate laxo cinctae *flocco.*

Medium tenet inter *Lepturas* et *Cerambyces.*

Rozier Abhandl. 1. Th. S. 25. t. 1. f. A.

Leptura *americana*, tota nigra, *pedibus* posticis longissimis, *annulo pilorum* cinctis.

2. *Hastata*, der *Spießträger.*

Sulzers Gesch. S. 46. t. 5. f. 11.

Thorace

*) *Nicht abgebildet.*

Thorace ovato; *elytris* rubris subtus macula nigra, instar *spiculi hastae.*

Füeßlins Verz. S. 14. No. 273. *Cordigera;* der *Herzfleck.*

3. *Violacea*, das *sibirische Rosenböcklein.*

Pallas Reisen II. No. 64.

Magnitudo L. *aquaticae.* Caput, thorax, pectus atro-subaenea. *Elytra* latiuscula, obscure violaceo-coerulea; *abdomen* sanguineum.

Müllers S. B. S. 243. 1. a. der *Rosenbock.*

4. *Simplex*, der *englische Afterbockkäfer mit einfachen Hüftbeinen.*

Fabric. S. E. p. 195. *Donacia* 2.

Femoribus *simplicibus.*

5. *Atra*, der *deutsche Afterbockkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 228. *Stenocorus* 10. B. *Totus niger.*

Fabric. S. E. p. 197. *Leptura* 7.

Corpore toto nigro.

6. *Rufipes*, der *schwarze mit rothen Hüften.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 227. *Stenocorus* 10. Le *Stencore noir à cuisses rouges.*

Niger, *femoribus* clavatis *rufis*, apice nigris.

7. *Luticornis*, das *karolinische Gelbhorn.*

Fabric. S. E. p. 197. *Leptura* 9.

Lutea; *thorace* lineis duabus; *elytris* fasciis quatuor nigris.

8. *Sexguttata*, der *deutsche Sechstropf.*

Fabric. S. E. p. 198. *Leptura* 14.
Nigra; *elytris* maculis tribus flavis.

9. *Variegata*, die *neuholländische Buntschecke.*

Fabric. S. E. p. 199. *Leptura* 19.
Elytris abbreviatis, abdomine atro, fasciis fulvis.

10. *Dubia*, der *Zweifelhafte.*

Scop. Entom. carn. p. 47. No. 151.
Tota nigra, sed *stria rubra* per medium elytri longitudinaliter, a basi ad apicem vsque producta.
An vere diversa a *Sanguinolenta?* an proles hybrida *Melanurae* et *Vexillatae?*

11. *4-maculata*, der *Vierfleck.*

Scop. Entom. carn. No. 154.
Nigra, *elytro* sordide flavescente, maculis 4 nigris.

12. *Ruficrus*, der *Rothschenkel.*

Scop. Entom. carn. No. 155.
Fusca; antennis basi, oculis, femoribusque *rufis.*

13. *Testacea*, der *muschelbraune Afterbockkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 100. No. 72.
Abdomine et *thorace* postice marginato-rubris; *elytra testacea*, pellucida, attenuata, apice margineque infra medium nigris.

14. *Fasciata*, die *Vierstreife.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 93. No. 1046. Nigra; *thorace* conico, *elytris* attenuatis, *fasciis quatuor*, pedibusque flavis.
Schaeff. Icon. t. 39. f. 6.

15. *Verna*,

15. *Verna*, der *Frühlingsafterbockkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 94. No. 1055. Nigra; *thorace* cylindrico, tibiis anticis fulvis.

Schaeff. Icon. t. 55. f. 9.

16. *Maculicornis*, das *Fleckhorn.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 139. No. 16. *Lepture à antennes tachetées.*

Nigra; *elytris* teſtaceo lividis; *antennis* flavo-maculatis.

17. *Aquatica aenea*, der *erzfarbige Waſſerafterbock.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 143. No. 21. *Lepture aquatique bronzée.*

Aenea nitida, *femoribus* omnibus fere aequalibus.

18. *Aquatica mutica*, der *Waſſerafterbock mit ungedörnten Hüftbeinen.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 142. No. 19. *Lepture aquatique à cuiſſes ſans épines.*

Viridi-deaurata nitida, *capite* cinereo; *pedibus* ruſis; *femoribus* poſticis magnis muticis.

19. *Aquatica faſciata*, der *Waſſerafterbock mit der langen Purpurſtreife.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 142. No. 20. *Lepture aquatique à bande cramoiſi.*

Viridi-deaurata nitida; *elytris* faſcia longitudinali *purpurea* nitida; femoribus poſticis magnis vnidentatis.

20. *Nigripes*, der *Schwarzfuß.*

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 136. No. 12. *Lepture à pattes noires.*

Nigra; *elytris* obscure flavo-testaceis; *pedibus totis nigris.*

II. *Mit erhabener Brust und stumpfen Flügeldecken.*

1. *Massiliensis*, der *kleine portugiesische buntschecki*ge *Afterbock.*

Linn. Add. p. 1067. No. 8.
Müllers S. B. S. 243. 3. der *kleine Scheck.*

2. *Robiniae*, der *neuyorkische Robinien-Afterbock.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 43. No. 43. *Thorace* globoso fasciato nigra; *elytris* fasciis sex flavis, tribus prioribus antrorsum arcuatis, posticis vndulatis.
Drury Inf. Tom. I. t. 41. f. 2.

3. *Pilosa*, der *haarichte Afterbock bey Gibraltar.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 44. No. 44. *Elytris* fastigiatis, tota nigra, pilis cinerascentibus consita.

4. *Nitens*, der *amerikanische Schwarzglanz.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 45. No. 45. *Thorace* globoso, abdomineque nigris, flavescenti-tomentosis, nitentibus; *elytris* truncatis atris fasciis quatuor, latis transversis flavis; *pedibus* ferrugineis.

5. *Cantharoïdes*, der *Johannisfliegenartige Afterbock.**)

Scop.

*) An *Linn.* Cer. *Cantharinus* No. 82?

Scop. Entom. carn. No. 158.
Nigricans; *antennis*, *thorace* rotundato, pedibusque fulvis.

6. *Coeruleſcens*, der *himmelblaue Afterbock.*

Scop. Entom. carn. No. 160.
Thorax lineolis tribus pallidioribus.

7. *Octopunctata*, der *Achtpunkt.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 101. No. 73.
Tota viridi-coeruleſcens, *oculis* punctisque in ſingulo *elytro quatuor nigris.*

8. *Cardui*, der *Diſtelafterbock.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 101. No. 74.
Nigra; *thorace* lineis tribus longitudinalibus rufis; *antennae* longae, albido-faſciatae.
An haec ſit Cer. *Cardui Linn.?* dicere non poſſum; caret enim ſutura elytrorum lineata.

9. *Bilineata*, die *Doppellinie.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 102. No. 76.
Fuſco-nigricans; thorace *lineis binis* elytrorumque punctis ſparſis flaveſcentibus.

10. *Coerulea*, der *ganz blaue Afterbock.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 102. No. 78.
Coerulea tota; tibiis anticis rufis.

11. *Squalida*, der *Schmutzafterbock.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 102. No. 79.
Nigra, *elytris* baſi et margine interiore teſtaceis.

12. *10-punctata*, der *russische Zehnpunkt.*

Lepech. Tageb. 2. Th. S. 196. t. 10. f. 2.
Thorace subgloboso, corpore atro, vellere cano, vndique obducto; *elytris* punctis 10 nigris.

13. *Variegata*, der *scheckichte Holzkäfer.*

Lepech. Tageb. 2. Th. S. 197. t. 10. f. 4.
Thorace subgloboso; *corpore* subtus villoso, cano elytris nigris, punctis 8 atque fasciolis 4 interruptis, hamatis albis.

14. *Viridiuscula*, der *Grünling.*

Lepech. Tageb. 2. Th. S. 197. t. 10. f. 11.
Tota viridiuscula; *thorace* suborato lineolis duabus longitudinalibus obscurioribus dorso nigro.

15. *Aeruginosa*, der *Rostafterbock.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1071.
Nigra; *thorace* cylindrico, vndique pilis sive squamulis pallide-virentibus irrorata.

16. *Lineata*, die *Blaßlinie.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1072.
Nigra, villosa; *thorace* cylindrico; *linea* longitudinali pallida.

17. *Bimaculata*, der *Zweyfleck.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 95. No. 1073.
Rufa; *thorace* cylindrico, *elytris* punctatis, macula et striga, vndulata, alba.
Schaeff. Icon. t. 158. f. 1.

18. *Villoso-flavo-maculata*, der *wolligte Gelbgefleckte.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura* 7. La *Lepture à corcelet rond et taches jaunes.*

Nigra; *maculis villoso-flavis, thorace* globoso; *antennis* corpore dimidio brevioribus.

19. *Glabro-maculata*, der *Glattgefleckte.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura* 8. La *Lepture velours jaune.*

Nigra, villoso-flava; *maculis* duabus in elytro singulo *glabris* nigris.

20. *Rubro-punctata*, der *rothpunktirte Bruftschild.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura* 9. La *Lepture à corcelet rouge ponctué.*

Nigricans; *capite thoraceque rubro*, punctis nigris.

21. *Nigro-fasciata*, der *schwarzbandirte Afterbock.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 216. *Leptura* 14. La *Lepture jaune à bandes noires.*

Villoso-flava; *elytris* lineis tribus transversis nigris.

22. *Coerulea*, der *blaue Afterbock mit rothen Schenkeln.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 217. *Leptura* 16. La *Lepture bleue.*

Coerulea; *tibiis rufis;* thorace subgloboso.

23. *Crassipes*, der *Dickschenkel.*

Geoffr. Inf. Tom. V. p. 219. *Leptura* 20. La *Lepture noire à grosses cuisses brunes.*

Atra; *femoribus* crassis rufis.

24. *Tabaci-*

24. *Tabacicolor*, der *tobacksfarbige Afterbock.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 139. No. 17. *Lepture couleur de tabac.*

Nigra; *elytris* fuſco-teſtaceis apice nigris, pedibus flavis.

Schaeff. Icon. t. 39. f. 5.

25. *Viridi-aurea*, der *grüngoldne ausländiſche Afterbock.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 145. No. 1. *Lepture verte dorée.* t. 15. f. 1.

Nitida; *thorace* ſpinoſo; *elytris* faſciis binis longitudinalibus nigris; *femoribus* rufis.

26. *Lamda*, der *Lamdaholzkäfer.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgeſch. S. 67. §. 13. t. 3. f. 13.

Nigra; *elytris* albo trifaſciatis.

27. *Ferruginea*, der *roſtfarbene Holzkäfer.*

von *Paula Schrank* Beytr. zur Naturgeſch. S. 68. §. 14. t. 3. f. 14.

Nigra; *elytris* ferrugineis, extrorſum late nigris.

28. *Bipartita*, der *Holzkäfer mit getheiltem Rückenſchilde.*

von *Paula Schrank* Beyträge zur Naturgeſchichte. S. 68. §. 15.

Nigra; *thorace* ferrugineo; linea nigra longitudinali; *elytris* macula communi ferruginea.

206. GESCHLECHT. Necydalis; *Halbkäfer.*

Müllers Linn. Naturſ. 5. B. 1. Th. S. 292. *Baſtardböcke.*

Füeßlins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 14. *Halbkäfer.*

Sulzers Geſchichte der Inſekten. S. 47. der *Halbkäfer.*

— — Kennz. der Inſ. S. 89. *Afterholzbock.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. 22. der *Afterholzbock.*

Eberhards Thiergeſchichte S. 204. der *Fliegenkäfer.*

Börners Samml. I. Th. S. 472. *Afterholzbock.*

Swammerd. B. der N. S. 120. der *Verſchlinger.*

Neuer Schauplatz der Natur 1. B. S. 560. *Baſtardböcke; Afterholzböcke.*

Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 572. der *Fliegenkäfer; Afterholzbock.*

Bomar. Dict. P. VII. p. 341.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 372. *)

Scopoli Entom. carn. p. 56. **)

Fabric. S. E. p. 208.

de *Geer* Inſ. Tom. 5. p. 146. des *Necydales; Procapricornes.* †)

I. *Halb-*

*) Des *Geoffr.* Necydalis *individ.* iſt des Linn. CANTHARIS *minima* No. 12. Verſchiedene aber der *Linnéiſchen Necydal.* finden ſich beym *Geoffr.* unter den *Cicindel.* und *Canthar.* T. I. p. 169. 339.

**) Die meiſten *Linn. Necydal.* finden ſich auch beym *Scop.* unter den *Canthar.*

†) Mit Recht ſagt dieſer genaue Kenner, daſs die *Necydal.* zwiſchen den *Cerambyc.* und *Lepturis* ein Mittelgeſchlecht ausmachen.

I. *Halbkäfer mit kürzern Flügeldecken, als der Körper.*

1. *Major*, der *größte europäische Halbkäfer.*

Müller l. c. S. 293. No. 1. der *Riesenbastard.*
Onomat. hist. nat. P. 5. pag. 573. der *große Afterholzbock.*
Fabric. S. E. p. 199. No. 18. LEPTVRA *abbreviata.*
Schaeff. Elem. t. 88. *Fliegenkäfer.*
— — Icon. t. 10. f. 10. 11.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 148. No. 1. t. 5. f. 1. *Necydale ichneumon.*

NECYDALIS *(ichneumonea)* nigra; *elytris* abbreviatis rufo-fuscis; *pedibus* rufis; *antennis* corpore brevioribus.

2. *Minor*, der *kleine europäische Halbkäfer.*

Müller l. c. S. 293. No. 2. t. 8. f. 7. der *Zwergbastard.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 14. No. 288.
Linné Reise durch Oel. *Uebers.* S. 84.
Acta Upsal. 1736. p. 38. No. 16.
Cimex longus depressus, griseus, genubus globosis.
Onomat. hist. nat. P. 5. pag. 577. der *kleine Afterholzbock.*
Fabric. S. E. p. 199. No. 20. LEPTVRA *dimidiata.*
Müllleri Faun. Fridr. p. 22. No. 220.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1081.
Poda Mus. graec. p. 48.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 151. No. 2. *Necydale capricorne.*

NECYDALIS *(ceramboïdes)* fusca; *elytris* abbreviatis lineola obliqua alba; *capite thoraceque* nigris; *antennis* rufis corpore longioribus.
Schaeff. Icon. t. 95. f. 5.

3. *Umbel-*

3. *Umbellatarum*, der *Halbkäfer auf schirmtragenden Pflanzen.*

Müller l. c. S. 294. No. 3. der *Miniaturbastard.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 15. No. 289. der *Blumenfreund.*
Sulzers Gesch. S. 48. t. 6. f. 1. der *Blumenbewohner.*
Schaeff. Icon. t. 95. f. 4.
Fabric. S. E. p. 199. *Leptura* 21.
Onomat. hist. nat. P. 5. p. 579. der *Fliegenkäfer der schirmtragenden Blumen.*

II. *Halbkäfer mit spitzigen Flügeldecken, die so lang als der Körper sind.*

4. *Coerulea*, der *himmelblaue Halbkäfer.*

Müller l. c. S. 294. No. 4. der *Bläuling.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 15. No. 290. der *Bläuling.*
Sulzers Gesch. S. 48. t. 6. f. 2. der *Bläuling.*
Onomat. hist. nat. P. 5. p. 573. der *blaue Fliegenkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 94. f. 7.
Fabric. S. E. p. 209. *Necyd.* 6.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 342. *Cantharis* 3. La *Cantharide verte à grosses cuisses.*
Viridi-coerulea; elytris attenuatis, femoribus posticis globosis.*)

5. *Atra*, der *schwarze Halbkäfer.***)

Müller l. c. S. 294. No. 5. der *Schwärzling.*

Onomat.

*) Des *Scop.* E. C. No. 146. *Nobilis*, ist von der *Flavescente* Linn. No. 8. oder seiner *Femorata* No. 145. blos in der Farbe verschieden.

**) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 572. der *schwarze Fliegenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 209. *Necyd.* 3.

6. *Rufa*, der *röthliche Halbkäfer.*

Müller l. c. S. 295. No. 6. der *Röthling.*

Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 15. No. 291. der *Röthling.*

Schaeff. Icon. t. 94. f. 8.

Fabric. S. E. p. 209. *Necyd.* 5.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 220. *Leptura* 22. La *Leptura à etuis étranglés.*

Leptura nigra, *elytris* pedibusque rubescentibus lividis, *coleoptris* attenuatis.

7. *Glaucescens*, der *grauliche Halbkäfer.*

Müller l. c. S. 295. No. 7. der *Grauling.*

Füeßlings Verz. S. 15. No. 292. der *Grauling.**)

Schaeff. Icon. t. 94. f. 6.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 153. No. 2. t. 15. f. 2. *Necydale vernissée.*

NECYDALIS *(nitida)* nigra; *elytris* subulatis flavis nitidissimis; *abdomine* annulis albis; *femoribus* clavatis.

8. *Flavescens*, der *gelbliche Halbkäfer.***)

Müller l. c. S. 295. No. 8. t. 6. f. 4. der *Gelbling.*

Füeßlins

*) Obgleich *Linné* Surinam als ihr Vaterland angiebt; so findet sie sich doch auch, nach *Füeßlins* Zeugnifs, in der Schweiz, wiewohl selten.

**) Diese hält *Linn.* mit des *Scop.* E. C. No. 145. *femorata* für einerley; *Fabric.* aber S. E. p. 209. No. 7. diese *femor.* Scop. für die *Podagrariam* Linn. No. 9. Allein die femorata hat an den Hinterfüfsen ganz schwarzgelbliche Hüften; die *Podagraria* aber ist am Ende derselben muschelbraun.

Füeßlins Verz. S. 15. No. 294. der *Gelbling.*
Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 570.
THELEPHORVS *flavescens*, niger, *elytris* attenuatis testaceis; *femoribus* posticis clavatis, arcuatis.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 155. No. 4. *Necydale jaune.*
N. *flavescens*, nigra; *elytris* testaceis subulatis; *femoribus* posticis clavatis.

9. *Podagraria*, der *Halbkäfer auf der wilden Angelik.*

Müller l. c. S. 295. No. 9. der *Angelikbock.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 295.
Schaeff. Icon. t. 85. f. 7.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 343. *Canthar.* 4. La *Cantharide fauve à grosses cuisses.*
Nigra; *elytris* attenuatis fulvis; *femoribus* posticis globosis.

10. *Simplex*, der *Dünnschenkel.**)

Müller l. c. S. 296. No. 10.
Füeßlins Verz. S. 15. No. 296.
Fabric. S. E. p. 210. *Necyd.* 8.

11. *Brevicornis*, das *Kurzhorn.***)

Müller l. c. S. 296. No. 12. das *Stumpfhorn.*
Onomat. hist. nat. P. 5. p. 572. der *Fliegenkäfer mit kurzen Fühlhörnern.*

Unabgebildete Halbkäfer.

II. Klasse.

1. No. 5. *Atra.* 2. No.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

2. No. 10. *Simplex.*
3. No. 11. *Brevicornis.*

*Neue Halbkäferarten.**)

II. Klasse.

1. *Humuralis*, der *englische Halbkäfer.*

Fabric. S. E. p. 209. *Necyd.* 4.
Elytris subulatis, nigris, basi flavis.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 342. *Canthar.* 2. La *Cantharide à bande jaune.*
Nigra; *elytris* attenuatis, antice luteis.

2. *Collaris*, der *amerikanische punktirte Halsschild.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. 1. p. 46. No. 46.
Elytris subulatis, atra; *thorace bipunctato* testaceo, pedibus simplicibus.

3. *Ceramboïdes*, der *englische kupfergrüne Halskäfer.*

Forst. nov. sp. Ins. Cent. 1. p. 47. No. 47.
Elytris subulatis, *viridi-aenea*, pedibus simplicibus.

4. *Muralis*, der *Mauernhalbkäfer.*

Forst. nov. sp. Ins. Cent. I. p. 48. No. 48.
Elytris subulatis, fusca, humeris flavis, pedibus simplicibus.

*) Ich könnte dieses Register noch mit verschiedenen *neuen Arten* vermehren, da aber die meisten Schriftsteller sie nicht unter diesem, sondern unter andern Namen, bald *Cantharis*, bald *Leptura*, bald *Cicindela*, bald *Thelephorus* angegeben haben; so will ich sie an gehörigem Ort nicht vergessen, um aller Verwirrung vorzubeugen, die bey diesem, und den folgenden Geschlechtern so schon gros genug ist.

207. GESCHLECHT. Lampyris; *Leuchtkäfer.**)

Müllers Linn. Naturs. 5. Th. 1. B. S. 297. *leuchtende Käfer.*

Börners Samml. 1. Th. S. 473. *Johanniswürmchen.*

Eberhards Thiergesch. S. 149. *Leuchtkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. S. 97. *Cantharis, Johonniswürmchen.*

Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 15. *Scheinkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 65. *Cantharis, Scheinwurm; Johanniswürmchen.*

— — Gesch. S. 48. *Scheinkäfer.*

Bankroft N. G. von Guiana. S. 147.

Bresl. Samml. 5. B. 1721. Novemb. Class. IV. Art. VI. p. 492. *Cicindela* s. *Lampyris; Johannisfliege; Johanniskäferlein.*

— 7. B. 1723. Oktob. Class. IV. Art. 5. pag. 423. *Lichtwürmlein; Lichtfliege; Lampyris.*

— 8. B. 1724. Oktob. Class. IV. Art. 3. p. 404. *Lichtwürmer.*

— 8. B. 1724. Novemb. Class. IV. Art. 7. §. 2. p. 514. *Cicindelae* oder *Johanniswürmchen.*

Bonnets Insektol. Uebers. S. 17.

— — Consider. sur les corps organis. Tom. II. Art. 299. Uebers, S. 103. Le *Ver luisant.*

Lemery Mat. Lex. p. 307.

Merkl. Thierb. p. 556. *Johanniswürmchen; Johannisfliege; Licht-* oder *Nachtmücke.*

Charlet. Onom. p. 47. *Lampyris.*

*) Die Verwechselung dieses Geschlechts mit den *Cantharid.* oder Thelephoris (Warzenkäfern), *Cicindelis*, und andern mehr, ist so gros, dass man schwerlich zu völliger Gewisheit kommen wird, bevor man nicht alle Synonymen der Alten, Mittlern und Neuern gesammlet, und sorgfältig verglichen hat.

Lesſers Theol. der Inſ. p. 305. *Cicindelae; Flammides; Incendulae; Luciones; Luculae.*

Fabric. Syſt. Entom. p. 200. *Lampyris.* p. 202. *Pyrochroa.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 165. *Lampyris;* le *Ver-Luiſant.* p. 338. *Pyrochroa;* la *Cardinale.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 29. Les *Lampyres.*

Schwenkf. Theriotr. Sileſ. p. 523. *Lampyris; Pyrolampyr.* Ariſtot. Heſych. *Lampyris alata:* Vlyſſ. Aldrov. *Cantharis noctiluca; Nitidula, Noctiluca; Cicindela* Iunii. *Luciola* Italis; *Johannisfliege; Johanniskäferlein; Lichtmücke; Nachtmücke.*

Ocelli bituminis nigri modo ſplendent: Alvus annuloſa, multis ſegmentis diviſa, in cujus medio *guttulae duae* candidae, noctu ſeu tenebris, ignis modo lucentes, die non item.

Allgem. Magazin der Natur etc. 9. Th. S. 346. *Leuchtender Goldkäfer; Feuerkäfer; Lichtmücke; Cantharis lampyris.*

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 579. *Cantharis noctiluca terreſtris,* der *Johanniswurm.*

— — — P. 4. p. 647. der *Leuchtkäfer.*

Rivini diſſ. de Noctu lucentibus 1673.

Ionſton hiſt. nat. Inſ. cap. 9. p. 108. t. 16. *Cicindela, Johannisfliegen* f. 1. 2. 3. 4. *Cicindela; Lampyris; Lampouris; Pygolampis;*

Ariſtoteli Boſtrychus.

Suidae Pyrolampis.

Heſychio Pyrgolampis; *Pygolampis.*

Lampedon; Spinter; Cincindela; Noctiluca; Nitidula; Noctuvigila; Lucio; Lucula; Luciola; Flammis; Venus; Lucernuta; Incendula.

Katharis mas.

Scalig. de Subtil. p. 628. Exerc. 194. *Cicindela; Lucramba.*

Lyonet

Lyonet Remarqu. sur Lesser Tom. I. p. 94. *Ver-luisant.*

Swammerd. B. der N. S. 119. *Nachtmücke; Johanniswürmchen.*

Adanson Reise nach Senegall p. 135. 137. *Ver-luisant; Mouche à feu.*

1. *Noctiluca*, der *eigentliche Johanniswurm.*

Müller l. c. S. 296. No. 1. t. 6. f. 7-11. der St. *Johanniswurm* (ehedem Lampyris; Lucula; Cicindela.)

Franz. Ver-luisant.
Engl. Glowworm.
Holl. Glimworm.
Schwed. Lysmask.

Füesslins Verz. S. 15. No. 297. der *Scheinwurm.*

Pontopp. Nat. Gesch. v. D. S. 207. *Cantharis* noctiluca No. 1. St. *Hans-Orm.* (Johanniswurm;) *Fackelfluen*, (Fackelfliege).

Gleditsch Forstwiss. 2. Th. S. 1045. No. 2. *Cantharis noctiluca*, der *länglichte schwarzleibige, platte, leuchtende Baumkäfer.*

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Insektol. S. 348. *Leuchtwurm.*

Neue berlin. Mannichf. 2. Jahrg. S. 516.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 579. der *Johanniswurm.*

— — — P. 4. p. 650. der *Leuchtkäfer der Wacholderwäldchen.* Noctiluca terrestris; Cicendela; Cicendela impennis.

Fabric. S. E. p. 200. *Lampyris* 1.

Leche nov. spec. pag. 23. 47. *Cantharis mas coleopterus.*

Müllers Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 581. *Lampyris* noctiluca nigro-fusca. D. St. *Hans-Orm. Glands-Flue.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 166. *Lampyris* 1. t. 2. f. 7.
Le *Ver-luiſant à femelle ſans ailes.**)
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 31. *Lamp.* 1. t. 1. f. 19. 20.
Lampyre luiſante commune.

L. *(noctiluca - communis)* oblonga, ſupra nigro-fuſca, ſubtus albido-flava.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 699. *Cantharis noctiluca.*

Philoſ. Tranſact. abridged by Lowthorp. Vol. 2. p. 761. t. 10. f. 183. 184. 185. *mas.*

Mém. de Mathem. et de Phyſ. Tom. 2. p. 261. t. 9.

Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris 1766. p. 342. t. 10. f. 7. 8. 9.

2. *Corruſca*, der *ruſſiſche braune Leuchtkäfer.***)
Müller l. c. S. 300. No. 2. der *Schimmerkäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 4. pag. 648. der *finnländiſche Leuchtkäfer.*

3. *Splendidula*, der *Glanzkäfer.*
Müller l. c. S. 301. No. 3.
Onomat. hiſt. nat. P. 4. p. 651. der *Leuchtkäfer mit waſſerfarbigem durchſichtigen Bruſtſchilde.*
Scop. Entom. carn. No. 118. CASSIDA *noctiluca.*
Carn. *Kerſchnitza.*
— Annus 5. hiſt. nat. p. 92. No. 48. †)
— — *Fabric.*

*) Dieſes Citatum ſtehet im *Fabric.* pag. 200. nebſt den meiſten *Linneiſchen* Citatis bey deſſen No. 3, *Splendidula.* Die Synonymen und Beſchreibungen derer vom *Linné* angeführten Schriftſteller, im *Geoffr.*, de *Geer* und der *Faun. Suec.* 2. bey der gegenwärtigen *Noctiluca.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Scop.* hat aber unter den Noctilucis eben dergleichen mit durchſichtigem Schilde über den Augen gefunden, und ſchlüſst daraus,

Fabric. S. E. p. 200. *Lamp.* 2. Oblonga, fusca, *clypeo apice hyalino.*

4. *Pyralis*, der *amerikanische Feuerkäfer.*

Müller l. c. S. 301. No. 4. *Feuerkäfer.*

Fabric. S. E. p. 200. *Lamp.* 4.

Clypeo rufo, medio nigro; *elytris* nigris; marginibus abdomineque albis.

de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 52. No. 7. t. 17. f. 7. *Lampyre Pyrale.*

L. oblonga; *elytris* obscure fuscis margine rufescentibus, abdomine atro, postice flavissimo, pedibus fuscis.

5. *Marginata*, der *amerikanische Gelbrand.**)

Müller l. c. S. 301. No. 5. *Gelbrand.*

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 650. der *gerandete Leuchtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 5.

6. *Hesperа*, der *amerikanische Abendstern.*

Müller l. c. S. 301. No. 6. das *Nachtlicht.*

Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 648. der *amerikanische Leuchtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 6.

de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 48. No. 1. t. 17. f. 1. *Lampyre de Surinam.*

L. *(Surinamensis)* ovata; *elytris* fuscis, macula marginali triangulari flava, abdomine subtus fusco apice flavo.

 7. *Ignita*,

daraus, dass diese *Noctiluca* und des Linn. *Splendidula* vielleicht keine verschiedene Arten seyn möchten, welches *Fabric.* Citata ebenfalls zu beweisen scheinen.

*) *Nicht abgebildet.*

7. *Ignita*, die *amerikanische Kohle.*

Müller l. c. S. 302. No. 7. die *Kohle.*
Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 7.
de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 49. No. 2. t. 17. f. 2.
Lampyre ignée.

L. ovata; *elytris* fuscis, macula marginali ovata flava; abdomine subtus toto flavo.

8. *Lucida*, der *amerikanische blasse Scheinkäfer.*

Müller l. c. S. 302. No. 8. die *Feuergluth.*
Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 8.
Sulzer Kennz. t. 5. f. 32. CANTHARIS *lucida.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 51. No. 5. t. 17. f. 5.
Lampyre brillante.

L. *(lucida).*

9. *Phosphorea*, der *amerikanische Phosphoruskäfer.*

Müller l. c. S. 302. No. 9. der *Phosphorus.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 651. der *phosphorische Leuchtkäfer.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 51. No. 6. t. 17. f. 6.
Lampyre phosphorique.

L. oblonga; *elytris* fuscis, margine exteriore flavis, abdomine atro postice flavissimo, pedibus testaceis.
Fabric. S. E. p. 201. *Lamp.* 9.

10. *Mauritanica*, die *algierische Lampe.**)

Müller l. c. S. 302. No. 10. die *afrikanische Lampe.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 650. der *mauritanische Leuchtkäfer.*
Fabric. S. E. p. 202. *Lampyris* 13.

11. *Ita-*

*) *Nicht abgebildet.*

11. *Italica*, der *italiänische Leuchtkäfer.*

Müller l. c. S. 303. No. 11. die *römische Lampe.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 298. der *italiänische.*
Sulzers Gesch. S. 49. t. 6. f. 3. a. die *römische Lampe.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 649. der *italiänische Leuchtkäfer.*
Fabric. S. E. p. 202. *Lampyris* 12.
Müllers Faun. Fridr. p. 15. No. 143. CANTHARIS *italica.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 53. No. 9. t. 17. f. 9. 10. *Lampyre d'Italie.*
L. oblonga; *elytris* nigro-fuscis; *thorace* rufo; macula nigra in medio; *capite* nigro.
Voyage d'un François en Italie Tom. I. p. 38.
Mém. de l'Acad. des Sciences de Paris 1766. p. 343. t. 10. f. 4. 5. 6.

12. *Chinensis*, der *chinesische Leuchtkäfer.**)

Müller l. c. S. 303. No. 12. die *Götzenlampe.*
Onomatol. hist. nat. P. 4. pag. 648. der *chinesische Leuchtkäfer.*

13. *Minuta*, der *ganz kleine Leuchtkäfer.***)

Müller l. c. S. 303. No. 13. der *Funke.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 650. der *ganz kleine Leuchtkäfer.*

14. *Latissima*, der *ganz breite guineische Leuchtkäfer.*†)

Müller l. c. S. 304. No. 14. die *Flamme.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 649. der *guineische Leuchtkäfer.*
Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 5.

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

15. *Rostrata*, der *afrikanische geschnäbelte Leuchtkäfer.**)

Müller l. c. S. 304. No. 15. das *glimmende Tocht.*
Fabric. S.E. p. 203. *Pyrochroa* 7.
Rostrum exsertum, cylindricum.

16. *Bicolor*, der *zweyfarbige afrikanische Leuchtkäfer.***)

Müller l. c. S. 304. No. 16. das *Luftfeuer.*
Onomat. hist. nat. P. 4. pag. 648. der *zweyfarbige Leuchtkäfer.*
Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 3.

17. *Sanguinea*, der *blutfarbige Leuchtkäfer.*
Müller l. c. S. 305. No. 17. die *Abendröthe.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 299. der *Blutrothe.*
Sulzers Gesch. S. 49. t. 6. f. 4. die *Abendröthe.*
Frisch Ins. 12. Th. S. 40. 3. Pl. t. 7. No. 2. der *blutrothe flache Holzkäfer.*
Scop. Entom. carn. No. 19. CASSIDA *sanguinea.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 578. der *rothe glänzende Käfer mit einem schwarzen Fleck auf der Brust. (Cantharis).*
Act. Vpsal. 1736. p. 19. No. 3. CANTHARIS *elytris ruberrimis.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 587. *Cantharis* etc.
— — — — ed. 2. No. 704. CANTHARIS *sanguinea.*
Fabric. S. E. p. 202. *Pyrochroa* 2.
Schaeff. Icon. t. 24. f. 1.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 555. TELEPHORVS *sanguineus.*

Scop.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 93. No. 49. LAMP. *sanguinea.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 168. *Lamp.* 3. Le *Ver-luisant rouge.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 45. No. 2. t. 2. f. 1. *Lampyre rouge à corcelet rouge.*

L. *(sanguinea)* nigra; *thorace* rubro, maculis quinque nigris; *elytris* rubris; *venis* reticulatis.

18. *Coccinea*, der *scharlachrothe Leuchtkäfer.*

Müller l. c. S. 305. No. 18. die *Morgenröthe.*

Füeßlins Verz. S. 15. No. 300. der *Scharlachrothe.*

Onomat. hist. nat. P. 4. p. 648. der *Leuchtkäfer mit scharlachrothem Bruststück und Flügeldecken.*

Schaeff. Icon. t. 90. f. 4.

Fabric. S. E. p. 202. *Pyrochroa* 1.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 338. *Pyrochroa* 1. t. 6. f. 4. La *Cardinale.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 47. *Lampyris* 4. *Lampyre rouge velue.**)

L. *(villosa)* nigra; *thorace elytrisque* villosis rubris, medio thoracis nigro.

Unabgebildete Leuchtkäfer.

1. No. 2. *Corrusca.*
2. No. 5. *Marginata.*
3. No. 10. *Mauritanica.*
4. No. 12. *Chinensis.*

5. No.

*) Diese hält *de Geer* für die vorige *Sanguin.* Linn. und hat dabey den *Geoffr.* I. p. 168. Lamp. 3. angeführt.

Nach dem *de Geer* Tom. V. p. 20. gehören die Citata des *Geoffroy* und *Schäffer*, die *Fabric.* hieher gesetzet hat, zu Linn. Cantharis *pectinicornis* No. 20. p. 650.

5. No. 13. *Minuta.*
6. No. 14. *Latissima.*
7. No. 15. *Rostrata.*
8. No. 16. *Bicolor.*

Neue Leuchtkäferarten.

1. *Pilosa*, der *amerikanische haarichte Leuchtkäfer.*

Forster nov. sp. Ins. Cent. 1. p. 49. No. 49.
Oblonga nigra; *thorace* sanguineo, lineis duabus longitudinalibus nigris, *antennarum* articulis tribus extimis pectinatis.

2. *Obscura*, der *feuerländische dunkelschwarze Leuchtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 200. *Lampyris* 3.
Nigra, *clypeo* vtrinque macula rufa.

3. *Capensis*, der *kapensische grüngelbliche Leuchtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 10.
Livida; *thorace* flavescente; *abdomine* postice flavissimo.

4. *Australis*, der *neuholländische braungelbliche Leuchtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 201. *Lampyris* 11.
Flavicans, *capite elytrisque* fuscis.

5. *Reticulata*, der *neuyorkische Leuchtkäfer mit netzförmigen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 4.

Atra;

Atra; thoracis margine flavo, *elytris* flavis; fascia apiceque nigris.

6. *Palliata*, der *kapensische Leuchtkäfer mit den breitesten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 6.

Elytris coriaceis, *latissimis*, testaceis, apice nigris.

7. *Serraticornis*, das *neuholländische Sägenhorn.*

Fabric. S. E. p. 203. *Pyrochroa* 8.

Nigra; *thorace* elytrisque rufescentibus; *elytris* apice nigris; *antennis* valde compressis, *serratis*, nigris.

8. *Hemiptera*, die *Geoffroysche Halbdecke.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 168. *Lamp.* 2. Le *Ver-luisant à demi-fourreaux.*

9. *Nigro-rubra*, der *schwarzrothe Leuchtkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 46. No. 3. *Lampyre rouge à corcelet noir.*

Nigra; *thorace* toto nigro; *elytris* rubris; *venis reticulatis.*

10. *Nitens*, der *surinamische glänzende Leuchtkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 50. No. 3. t. 17. f. 3. *Lampyre luisante.*

Oblonga; *elytris* pallide-fuscis, macula marginali oblonga fusca, abdomine subtus rufo, postice flavo: segmento vnico nigro.

11. *Maculata*, der *gefleckte Leuchtkäfer.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 50. No. 4. t. 17. f. 4. *Lampyre tachetée.*

Ovata teſtacea; *thorace* faſcia *elytris*que macula nigris.

12. *Penſylvanica*, der *penſylvaniſche Leuchtkäfer mit zween röthlichen Flecken.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 52. No. 8. t. 17. f. 8. *Lampyre de Penſylvanie.*

Oblonga; *elytris* pallide-griſeo-teſtaceis; *thorace* intra marginem nigro: *maculis binis rufis.*

Brown Hiſt. of Jam. p. 431. t. 44. f. 9. a. b. *Pyralis* minor ſubcinerea longa, *alis et oculis* nigricantibus.

208. GESCHLECHT. Cantharis. *Warzenkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 306. *St. Johannisfliegen.*

Füeßlins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 15. *Afterſcheinkäfer.*

Eberhards Thiergeſch. S. 194. *Thelephorus, Warzenkäfer.* S. 197. *Cantharis, Pflaſterkäfer.*

Sulzers

*) *Cantharides* heiſſen bey den meiſten Schriftſtellern die ſogenannten *ſpaniſchen Fliegen*, die *Linné* ehemals hierunter begrif, nachmals aber unter ein eigenes Geſchlecht *Meloë* gebracht hat. Des *Geoffr. Cantharides* und *Proſcarabaei*, ſind des Linn. *Necydal.* und *Meloë.* Der Herr *de Geer* hat aus des Linn. *Canthar.* auch ein eigenes Geſchlecht mit Namen *Thelephorus* gemacht, und verſtehet unter ſeinen *Canthar.* Tom. 5. pag. 1. die *Meloë* Linn. Bey dem erſten iſt er dem D. *Schäffer* Elem. t. 123. gefolgt. In Anſehung der Schriftſteller wird man wohl thun, wenn man immer beyde Geſchlechter: *Cantharis* und *Meloë*, vergleicht.

Die

Sulzers Kennz. S. 65. 66.
— — Gesch. S. 49. *Afterscheinkäfer.*
Börners Samml. etc. I. Th. S. 474.
Martini Naturlexicon I. Th. S. 444. 451. *Aeschenbaumskäfer*, (Cantharides).
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 574. der *glänzende Käfer; Eselkäfer.*
Catholicon C. p. 71. *glänzender Käfer; Eselkäfer.*
Fabric. S. E. p. 204. *Lymexilon.* p. 205. *Cantharis.* p. 207. *Malachius.*
Scop. Entom. carn. p. 38. *Cantharis.*
Müller i Zool. Dan. Prodr. p. 61. *Thelephorus.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 169. *Cicindela.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 57. *Thelephores.*
Ionst. hist. nat. Inf. p. 102. *Cantharis.*
Schwenkfeld. Theriotr. Silef. p. 522. *Cantharis.*

I. *Mit plattem Bruststück.*

1. *Sanguinolenta*, der *russische blutrothe Afterscheinkäfer.*

Müller l. c. S. 307. No. 1. der *Doppelrand.*
Schröters Abhandlungen etc. I. S. 364. t. 3. f. 6.*)

2. *Fusca*,

Die Verwandlungsgeschichte dieser Insekten ist noch sehr dunkel, und die *Larven* derselben mehrentheils noch unbekannt. Doch hat der Herr *de Geer* dergleichen auf dem *Schnee* gefunden, die aber durch einen starken Sturm, der viele Bäume mit den Wurzeln aus der Erde gerissen, dahin geführet sind. S. Mém. des Inf. Tom. II. Part. I. p. 113. *Uebers.* I. Qu. S. 81. Abhandl. der schwed. Akad. der Wissensch. Ann. 1749. pag. 75. 78.

*) Daselbst findet man auch eine Vergleichung mit einem *Surinamischen*, der mit diesem viel ähnliches hat.

2. *Fusca*, der *schwarzbraune Afterscheinkäfer.*

Müller l. c. S. 307. No. 2. t. 6. f. 12. der *Räuber.*

Füeßlins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 15. No. 301. der *schwarzbraune.*

Frisch Ins. 12. Th. S. 36. No. 30. 3. Pl. t. 6. f. 5. der *schwarzbraune Holzkäfer mit dünnen Flügeln.*

Sulzers Gesch. S. 50.*)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 577. der *glänzende Käfer mit schwarzbraunen Flügeldecken.*

Schaeff. Elem. t. 123. f. 1. 2. *Thelephorus, Warzenkäfer.*

— — Icon. t. 16. f. 10. t. 26. f. 9-12.

Scop. Entom. carn. No. 120. Carn. *Schuster.*

Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis* 1.

Raj. Ins. p. 84. No. 29. *Cantharus* sepiarius major, elytris nigricantibus.

Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 144.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 61. *Thelephorus* No. 556.

Niger, marginibus thoracis lateralibus, abdomineque rufis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 170. *Cicindela* 1. t. 2. f. 8. La *Cicindele noire à corcelet maculé.*

Elytris nigricantibus; *thorace* rubro, nigra macula.

Ephemer. Nat. Curios. 1674. obs. 79.

Act. Upsal. 1736. p. 19. No. 2. *Cantharis* elytris fuscis.

de *Geer*

*) Diese Art frisst sich einander selbst auf. *Sulzer* meldet: der Herr *de Geer* habe die Larven derselben auf dem Schnee gefunden. Die in der Faun. Suec. ed. 2. pag. 201. angeführten Act. Holm. beziehen sich auf das Jahr 1749. In der Uebersetzung beyder Theile des Jahrs 1749 stehen auch des Herrn *de Geer* Abhandl. von den kleinen schwarzen auf dem Schneewasser angetroffenen *Poduren.*

de *Geer* Act. Holm. 1749. p. 77.
— — Inſ. Tom. IV. p. 60. *Theleph.* 1. t. 2. f. 12. *Telephore ardoiſé.*

THELEPHORUS *(fuſcus)*, thorace flavo rubro macula nigra; *elytris* obſcuris cinereo-nigris.

3. *Livida*, die *Bleyfliege.*

Müller l. c. S. 308. No. 3.
Füeßlins Verz. S. 15. No. 302. der *Gelbbraune.*
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 578. der *glänzende Käfer mit dem ganz rothem Bruſtſchilde.*
Act. Vpſal. 1736. p. 19. No. 1.
Act. Nidr. 4. 19. t. 16. f. 9?
Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis* 2.
Müllerі Faun. Fridr. p. 15. No. 145.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 566.
Thelephorus teſtaceus, femoribus apice, tibiisque nigris.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 171. *Cicindela* 2. *Cicindele à corcelet rouge.*
Thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 70. *Theleph.* 2. *Telephore jaune à corcelet rouge.*
T. *(flavus)*; thorace flavo-rufo, *elytris* teſtaceis, femorum poſteriorum apice nigro.

4. *Rufa*, der *Rothſchild.*

Müller l. c. S. 308. No. 4.
Schaeff. Elem. t. 123. f. 3.
Müllerі Faun. Fridr. p. 15. No. 146.
— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 564. *Thelephorus* rufus.
Scop. Entom. carn. No. 124. CANTHARIS *fulva.*

Rufo-ferruginea; *thorace* fulvo, *elytris* apice, oculisque nigris.

An eadem, quae *Rufa* Linn.?

5. *Obscura*, der *Rostrand.*

Müller l. c. S. 308. No. 5.

Fabric. S. E. p. 205. *Cantharis* 3.

Scop. Entom. carn. No. 121.

Tota *fusca*, sed thoracis abdominisque margo *ruber.*

Müllери Faun. Fridr. p. 15. No. 147.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 558.

THELEPHORVS (*obscurus*) niger, marginibus thoracis abdominisque lateralibus rufis.

Schaeff. Icon. t. 16. f. 8.

6. *Lateralis*, der *Gelbrand.*

Müller l. c. S. 309. No. 6.

Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 4.

7. *Aenea*, der *kupfergrüne Warzenkäfer.*

Müller l. c. S. 309. No. 7. der *Kupferfliegenkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 15. No. 303. der *Kupfergrüne.*

Sulzers Gesch. S. 51. t. 6. f. 5. a. der *Gestirnte.*

Schäffers neuentdekte Theile an Raupen und Zweyfaltern. Regensb. 1763. S. 26. t. 2. f. 10. 11. *Käfer mit weichen Flügeldecken.*

— — Icon. t. 18. f. 12. 13.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 580. der *grüne glänzende Käfer mit Kupferglanz.*

Fabric. S. E. p. 207. *Malachius* 1.

Müllери Faun. Fridr. p. 16. No. 154.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 568. *Thelephorus.*

Poda Mus. graec. p. 40.

Schwenk-

Schwenkfeld. Theriotr. Silef. p. 521. An *Cantharis formicaria latior?* Ein *Goldkäfer in Omeshaufen.*

Colore orichalcum refert, ſubrubeſcens nonnihil.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 174. *Cicindela* 7. La *Cicindele bedeau.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 73. No. 6. t. 2. f. 16. 17. *Telephore verd-bronzé.*

THELEPHORVS *(aeneus)*, viridi-aeneus; *elytris* extrorſum rubris, *capite* antice flavo.

8. *Bipuſtulata*, der *zweyblatterige Afterſcheinkäfer.*

Müller l. c. S. 309. No. 8. die *Rothſpitze.*

Füeßlins Verz. S. 15. No. 304. die *Rothſpitze.*

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 576. der *grüne kupferroth glänzende Käfer.*

Raj. Inſ. p. 101. No. 7. *Cantharis*, vix tres octavas vnciae longa.

Act. Vpſal. 1736. p. 19. No. 5. *Cantharis* elytris viridi-aeneis apice rubris.

Poda Muſ. graec. p. 40.

Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 2.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 10. 11. t. 19. f. 14.

Müllleri Faun. Fridr. p. 15. No. 148.

— — Zool. Dan. Prodr. pag. 62. No. 569. *Telephorus.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 175. *Cicindela* 8. La *Cicindele verte à points rouges.*

Aeneo-viridis; *elytris* apice rubris.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 75. *Theleph.* 7. *Telephore verd à deux points rouges.*

Viridi-aeneus, nitidus; *elytris* apice rubris.

9. *Pedicularia*, das *Afterscheinkäferchen in der Größe einer Laus.**)

Müller l. c. S. 309. No. 9. die *Lausefliege.*
Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 3.

10. *Fasciata*, der *rothbandirte Afterscheinkäfer.*

Müller l. c. S. 309. No. 10. der *Rothband.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 305. der *Rothband.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 577. der *glänzende Käfer mit schwarzen Flügeldecken und zweyen rothen Streifen.*

Act. Upsal. 1736. p. 19. No. 6.
Fabric. S. E. p. 208. *Malachius* 4.
Raj. Ins. p. 102. No. 22. *Cantharis* valde exigua.
Schaeff. Icon. t. 189. f. 3. a. b.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 61. N. 560. *Thelephorus* niger; *elytris* maculis quatuor rubris.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 12. La *Cicindele à bandes rouges.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 76. *Thelephorus* 9. *Telephore à bandes rouges.*
Thorace obscure-viridi aeneo, *elytris* nigris; fasciis duabus transversis rubris.

11. *Biguttata*, der *Zweytropf.***)

Müller l. c. S. 310. No. 11. die *Gelbspitze.*
Fabric. S. E. p. 207. *Cantharis* 12.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 561. *Thelephorus* niger; *elytris* apice; *abdomine* lateribus flavis.
Act. Nidr. 4. 19.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 176. *Cicindela* 11. La *Cicindele noire à points jaunes, et corcelet noir.*
Fusca; *elytris* apice flavis, *thorace* fusco.

de *Geer*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 77. *Thelephorus* 10. *Telephore à deux points jaunes.*

Niger, femoribus flavis; *elytris* apice luteis.

12. *Minima*, das *kleinſte Afterſcheinkäferchen.**)

Müller l. c. S. 310. No. 12. der *Eichenfliegenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 207. *Cantharis* 10.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 567. *Thelephorus* flavus; *elytris* nigricantibus, apice ſulphureis.

Act. Nidr. 3. 16.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 176. *Cicindela* 10. La *Cicindele noire à points jaunes et corcelet rouge.*

Fuſca; *elytris* apice flavis, *thorace* rubro nigra macula.

— — — p. 372. *Necydalis* 1. t. 7. f. 2. La *Necydale à points jaunes.*

13. *Cardiacae*, der *Wolfstrap-Afterſcheinkäfer.***)

Müller l. c. S. 310. No. 13. der *Wolfstrapfliegenkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 574. *Thelephorus* aeneo-ater, thorace, lateribus; *elytris* apice rubris.

14. *Albicans*, die *Gelbſtirn.*†)

Müller l. c. S. 310. No. 14.

*) Eine Varietät derſelben in des *Linn.* Faun. Suec. 2. No. 204.
B. Cantharis fuſca; *elytris* apice flavis; *thorace* rufo.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 580. der *glänzende Käfer mit braunen, an dem Ende gelben Flügeldecken.*

**) *Nicht abgebildet.* Der Staatsrath *Müller* rechnet ſie zu der zwoten Klaſſe: Thorace teretiuſculo.

†) *Nicht abgebildet.*

15. *Testacea*, der *muschelbraune Afterscheinkäfer.*

Müller l. c. S. 310. No. 15. das *Braunschild.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 306. der *bleyfarbichte.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 580. der *schwarze glänzende Käfer mit bleichen Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 207. *Cantharis* 11.
Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 149.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 562.
Thelephorus niger; *elytris:* thoracis margine laterali, pedibusque luteis.
Act. Nidr. 4. 20.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 173. *Cicindela* 6. Variat. b. La *Cicindele noire à étuis jaunes.*
Nigra; *thoracis* margine flavo, *elytris* pedibusque pallidis.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 71. *Theleph.* 4. *Telephore noir à étuis jaunes.*
Niger; *thorace* rufescente macula nigra; *elytris* testaceis; *femoribus* nigris tibiisque flavis.
Schaeff. Icon. t. 52. f. 8.

16. *Atra*, der *Mohr.*

Müller l. c. S. 311. No. 16.
Füeßlins Verz. S. 15. No. 307. der *Schwarze.*
Sulzers Gesch. S. 51. t. 6. f. 6. der *Mulate; Nigricans.**)
Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 5.

17. *Pecti-*

*) *Füeßlin* hat diese *Sulzersche* Canth. fragweise bey der Atra angeführt; da sie aber *Sulzer* selbst nur Nigricans nennt, und der Brustschild brennend roth ist, so zweifle ich, dass sie mit der Atra einerley sey. Ueberdem rechnet er sie zu denen mit Thor. *teretiusculo.*

17. *Pectinata*, das *amerikanische Kammhorn.*

Müller l. c. S. 311. No. 17. das *Kammhorn.*
Fabric. App. S. E. p. 824. LAMPYRIS *atra.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 57. *Lampyris* II. t. 17. f. 13. *Lampyre pectinée.*

LAMPYRIS *atra;* antennis *pectinatis;* thorace lateribus flavis, *elytris* striatis reticulatis.

18. *Serrata*, das *amerikanische Sägehorn.*

Müller l. c. S. 312. das *Sägehorn.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 55. *Lamp.* 10. t. 17. f. 12. *Lampyre dentelée.*

Lampyris flavo-testacea; *elytris* striatis reticulatis; fasciis tribus nigris, antennis longissimis *serratis* nigris.

19. *Tropica*, der *indianische Afterscheinkäfer unter dem Wendezirkel.*

Müller l. c. S. 312. No. 19. der *Wendezirkel.*

20. *Pectinicornis*, der *Federkamm.*

Müller l. c. S. 312. No. 20. t. 3. f. 3. die *Federkammsfliege.**)
Füeßlins Verz. S. 15. No. 308. der *Federkamm.*
Frisch Ins. 12. Th. S. 38. No. 32. 3. Pl. t. 6. f. 7. der *größere ziegelrothe Holzkäfer.*
Schaeff. Elem. t. 106. f. 1. *Pyrochroa*, *Feuerkäfer.*
— — Icon. t. 90. f. 4.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 338. *Pyrochroa;* La *Cardinale* t. 6. f. 4.**)

*) S. meine Anmerkung bey *Ptinus pectinicornis.*

**) Dieses Citatum findet sich im *Fabric.* nebst den *Schaeff.* Icon. t. 90. f. 4. bey des *Linn.* Lampyris *coccinea* No. 18. *De Geer* aber

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 20. *Cardinale* 1. t. 1. f. 14. *Cardinale rouge.*

PYROCHROA *(rubra)*, nigra; *thorace* orbiculato depresso, elytrisque rubris; *antennis pectinatis.*

II. *Mit rundem Bruſtſtück.*

21. *Violacea*, der *guineiſche violette Afterſcheinkäfer.**)

Müller l. c. S. 313. No. 21. der *Violetrücken.*

22. *Coerulea*, *der himmelblaue Afterſcheinkäfer.***)

Müller l. c. S. 313. No. 22. der *Blauſchatten.*
Fabric. S. E. p. 208. *Necydalis* 2. *coeruleſcens.*
Müllerі Faun. Fridr. p. 15. No. 150.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 572.
Thelephorus coeruleus, virens; *elytris* coeruleis; *antennis* nigris.
Scop. Entom. carn. No. 136.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 76. *Theleph.* 8. *Telephore bleu-violet.*
Villoſus, *violaceo-coeruleus*, antennis pedibusque nigris.

23. *Viridiſſima*, der *ganz grünglänzende Afterſcheinkäfer.*

Müller l. c. S. 313. No. 23. das *Seidenwams.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 309.
Fabric. S. E. p. 208. *Necydalis* 1.
Müllerі Faun. Fridr. p. 15. No. 151.

Geoffr.

aber rechnet ſolche zu dem gegenwärtigen Inſekt. S. meine Anmerk. bey L. *coccin.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 14. *La Cicindele verdeâtre.*

Viridi-coerulea.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 15. *Cantharis* 3. t. 1. f. 13. Viridi-aenea nitida; *antennis* nigris; *thorace* tereti elongato.

24. *Virescens*, der *grünliche Afterscheinkäfer.**)

Müller l. c, S. 313. No. 24. der *Jägerrock.*
Füeßlins Verz. S. 15. No. 310.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 571. *Thelephorus* opacus, *elytris* subattenuatis.

25. *Dermestoïdes*, der *speckkäferartige Afterscheinkäfer.***)

Müller l. c. S. 314. No. 25. die *Käferfliege.*
Füeßlins Verz. S. 16. No. 311.
Fabric. S. E. p. 204. *Lymexylon* 1.

26. *Navalis*, der *Schiffwerftskäfer.*

Müller l. c. S. 314. No. 26. der *Matrose.*
Frisch Inf. 13. Th. S. 24. 3. Pl. t. 20. der *schmalleibige kleine Holzkäfer mit gelben Füßen.*
Sulzers Gesch. S. 50.
Berlin. Samml. 8. Th. S. 20-26. f. c. f.

*) *Nicht abgebildet.*

Vielleicht ist No. 22. 23. 24. eine blosse Varietät von *Geoffr.* Cicindele verdeâtre No. 14. deren er drey angiebt:

1. Viridis.
2. Coerulea.
3. Viridi-coerulea.

**) *Nicht abgebildet.*

Linn. Reise durch Westgothl. *Uebers.* S. 152. t. 2. f. 4.
Schaeff. Icon. t. 59. f. 1.
Fabric. S. E. p. 204. *Lymexylon* 2.
Mülleri Faun. Fridr. p. 15. No. 152.

27. *Melanura*, der *Schwarzschwanz.*

Müller l. c. S. 314. No. 27.
Füeßlins Verz. S. 16. No. 312.
Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 9.
Raj. Ins. p. 84. No. 27. *Cantharis* sepiarius elytrorum apicibus nigris.
Schaeff. Icon. t. 16. f. 14.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 173. *Cicindela* 5. La *Cicindele à étuis tachetés de noir.**)
Rubra, *elytris* testaceis, apice nigris.
Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 153.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 871.
CANTHARIS *(melanura)* fulva, oculis antennis apiceque elytrorum nigris.

Unabgebildete Afterscheinkäfer.

I. Klasse.

1. No. 9. *Pedicularia.*
2. No. 11. *Biguttata.*
3. No. 13. *Cardiacae.*
4. No. 14. *Albicans.*

II. Klasse.

1. No. 22. *Violacea.*
2. No. 23. *Coerulea.*

3. No.

*) Nach *Fabric.* aber nach *de Geer* Tom. IV. p. 71. No. 3. *Thelephorus* biinaculatus. S. unter den *neuen* No. 14. *iste Kl.* wozu auch von dem *de Geer* Raji Citat. p. 84. No. 27. gerechnet wird.

3. No. 24. *Virescens.*
4. No. 25. *Dermestoïdes.*

Neue Afterscheinkäferarten.

I. Klasse.

Mit platt gedrücktem Brustschilde.

1. *Americana*, der *neuyorkische Schwarzfleck.*

Forsteri nov. sp. Ins. p. 50. No. 50.

Thorace marginato flavo, macula nigra; *elytris* flavis versus apicem macula *trientali* *) oblonga nigra.

2. *Bidentata*, der *zweyzähnichte Afterscheinkäfer.*

Müllerі Zool. Dan, Prodr. pag. 62. No. 563. *Thelephorus* niger; *thorace*, abdomine, tibiisque rubris.

3. *Marginata*, der *amerikanische Rothrand.*

Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 6.

Thorace marginato, nigra; *thoracis* elytrorumque marginibus rubris.

4. *Ruficollis*, der *englische Rothhals.*

Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 7.

Atra; thorace abdomineque rufis.

5. *2-punctata*, der *leipziger Zweypunkt.*

Fabric. S. E. p. 206. *Cantharis* 8.

Thorace marginato; punctis duobus nigris; *elytris* testaceis, apice nigris.

6. Cau-

*) Die den *dritten Theil der Flügeldecken* einnimmt.

6. *Caudata*, der *geschwänzte Afterscheinkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 125.

Abdomen terminatum *cauda brevi bifida;* circa aquas in vmbrosis.

7. *Marginata*, der *Schwarzrand.*

Scop. Entom. carn. No. 130.

Nigra; *elytris* fulvis; margine interno nigris, punctorum impressorum seriebus 9.

8. *Pilosa*, der *Haarichte.*

Scop. Entom. carn. No. 131.

Ist nach *Fabric.* S. E. p. 62. *Anobium* 4, oder *Linn.* DERMESTES niger No. 28.

9. *Squallida*, der *schmutzige Warzenkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 132.

Fusca, antennis basi tibiisque ferrugineis.

10. *Flava*, der *gelbliche Warzenkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 133.

Flava, culis palporumque articulo vltimo nigris.

11. *Fraxinea*, der *Aeschenwarzenkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 134.

Nigra, *elytris* subdiaphanis, striatis fulvis.

12. *Serraticornis*, das *Sägenhorn.*

Scop. Entom. carn. No. 135.

Nigra; *capite; thorace* orbiculato; *elytrisque* fulvo-rufis; *antennis* totis, vel apice vno latere *serratis.*

13. *Pal-*

13. *Pallida*, der *kleine blasse Warzenkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 173. *Cicind.* 4. La *petite Cicindele pâle.*

Elytris teſtaceis; *thorace* rubro immaculato; genubus omnibus rubris.

14. *Bimaculatus*, der *Zweygefleckte.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 71. *Theleph.* 3. *Telephore à étuis jaune à extremité noire.**)

Flavo-rufus; *elytris* teſtaceis apice nigris.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 565. *Thelephorus* rufus; elytris teſtaceis, apice nigris.

15. *Niger*, der *Schieferfarbige.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 72. *Theleph.* 5. *Petit Telephore ardoiſé.*

Thorace flavo-rufo; *capite* elytrisque nigris; pedibus totis flavis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 172. *Cicindela* 3. La *petite Cicindele noire.*

Elytris nigricantibus; *thorace* rubro immaculato; genubus omnibus rubris.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. THELEPHORVS *parvulus* No. 578.

Flavus; oculis fronteque nigris, *elytris* nigricantibus.

16. *Penſylvanica*, der *penſylvaniſche Warzenkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 78. *Telephore (exot.)* de Penſylvanie. t. 17. f. 15.

Thorace, elytrisque rufo-flavis, macula oblonga nigra in ſingulo elytro, antennis pedibusque nigris.

*) Den hierbey vom Herrn *de Geer* citirten *Rajus* und *Geoffroy* findet der Leſer nach *Fabric.* bey *Canth.* Linn. *Melanura* No. 27.

II. Klasse.

Mit rundlichtem Brustschilde.

1. *Fimbriata*, der *weißgesäumte russische Warzenkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 264. t. 16. f. 8.

Cantharis, corpore atro; *elytris albo-fimbriatis* cum linea alba longitudinali intermedia in singulo hemelytro.

2. *Parva viridis*, der *kleine russische Warzenkäfer.*

Lepechins Tageb. I. Th. S. 314. t. 16. f. 11.

Elytris ad apicem maculis duabus flavis rhombeis.

3. *Lignosa*, der *Warzenkäfer im Eichenholz.*

Müllери Faun. Fridr. p. 16. No. 155.

Thorace marginato corporeque nigro; *elytris* testaceis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 579.

Thelephorus (thorace teretiusculo) niger; *elytris* pedibusque luteis.

4. *Pulla*, der *rothbraune Waldwarzenkäfer.*

Müllери Faun. Fridr. p. 16. No. 156.

Tota atra; *thorace* marginato; *antennis* longitudine corporis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 577.

THELEPHORVS *(pullus)* thorace teretiusculo; nigro-coeruleus; pilosus.

5. *Lutea*, der *leimfarbige Warzenkäfer.*

Müllери Faun. Fridr. p. 16. No. 157.

Thorace teretiusculo; corpore atro; *elytris* luteis, apice nigris.

Müllери

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 870.
CANTHARIS *lutea*, subtus atra, supra fulva, elytrorum apicibus nigris.

6. *Sericea*, der *seidenglänzende Warzenkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 573. *Telephorus* viridissimus, *elytris* attenuatis, divaricatis.

7. *Arbustorum*, der *Strauchwarzenkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 575. *Telephorus* viridi-aeneus, ore apiceque elytrorum rubris.

8. *Plumbea*, der *Bleyfahle.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 576. *Telephorus* nigro-aeneus, pilosus, tibiis rufis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 179. *Cicindela* 17. La *Cicindele bronzée.*
Plumbeo-cuprea; tibiis pallidis, abdomine subrotundo.

9. *Quadripunctata*, der *Vierpunkt.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 63. No. 580. *Telephorus* testaceus, *fronte punctis quatuor;* thorace macula nigris.

10. *Spadicea*, der *Muschelbraune.*

Scop. Ent. carn. No. 137.
Nigra; *elytris* testaceis, pellucidis, pilosis.

11. *Fulvicollis*, der *Braunhals.*

Scop. Ent. carn. No. 138.
Nigra; *thorace* fulvo; *elytris* fuscis.

12. *Rufi-*

12. *Rufiventris*, der *Rothbauch.*

Scop. Ent. carn. No. 139.
Thorax rufescens, linea dorsali longitudinali nigra; abdomen rufum.

13. *Vstulata*, der *Rostrand.*

Scop. Ent. carn. No. 140.
Nigra; thorace rufo, linea dorsali nigra; *elytris* nigricantibus, interno margine *ferrugineo.*

14. *Tenebricosa*, der *Düstere.*

Scop. Entom. carn. No. 141.
Nigricans; *femoribus* anticis ferrugineis.

15. *Sericea*, der *Seidenglanz.*

Scop. Entom. carn. No. 142.
Fusca et *sericeo* prostrato brevi *villo* vbique adspersa; antennis basi femoribusque basi rufis.

16. *Parva*, das *kleine Warzenkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 143.
Aeneo-fusca, villosa, *antennis* elytro duplo brevioribus.

17. *Rubro-nigra*, der *Rothschwarze.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 177. *Cicindela* 13. La *Cicindele verte à corcelet rouge.*
Viridis; thorace *rubro* immaculato.

18. *Plumbeo-nigra*, der *bleyfahle Schwärzling.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 178. *Cicindela* 15. La *Cicindele plombée.*

19. *Vil-*

19. *Villoso-cinerea*, der *aschgraue wollichte.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 178. *Cicindela* 16. La *Cicindele cendrée.*

20. *Plumbeo-cuprea*, der *bleyfahle kupferfarbige.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 179. *Cicindela* 17. La *Cicindele bronzée.*

Tibiis pallidis; *abdomine* subrotundo.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 62. No. 576. THELEPHORUS *plumbeus*, nigro-aeneus; pilosus; *tibiis* rufis.

209. GESCHLECHT. Elater; *Springschnellkäfer.**)

Müller Linn. Naturs. 5. B. 1. Th. S. 315. *Springkäfer*; *griech.* Notopeda; *franz.* Taupin; *holl.* Kniptorren, Springkevers.

Börners Samml. I. Th. S. 474. *Springkäfer.*

Eberhards Thiergesch. S. 196. *Springkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 98. der *Springkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 67. *Springkäfer.*

— — Gesch. S. 51. *Schnellkäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 208. *norw.* Smälder (Knaller); *Springkäfer.*

Füeßlins schweiz. Inf. S. 16. *Schnellkäfer.*

Onomat.

*) Die Art, wie diese Käfer das *Schnellen* und den *Sprung* verrichten, hat Herr *Sulzer* in seiner Gesch. S. 52. beschrieben. *Linné* sagt: *Elateris Larvae* etiamnum latent; die neuesten Erfahrungen aber beweisen, dass sie im *faulen Holze*, besonders in fauler Holzerde, die man in den Gärten rotten läßt, leben, wo auch zuweilen noch die Käfer, am häufigsten aber auf den Blumen und niedrigen Obst- ingleichen auf alten Weidenbäumen gefunden werden.

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 716. der *Springkäfer; Heuschreckenkäfer.*

Fabric. S. E. p. 210. *Elater.*

Scop. Entom. carn. p. 91. *Elater.*

Act. Nidr. III. 357.

— Helvet. II. 250.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 129. *Taupin; Elater.*

de *Geer* Inf. T. IV. p. 138. *Taupin; Scarabé à ressort.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 59. 61. *Spring-Basse; Smaeller; Smelder* nom. gen.

1. *Flabellicornis*, das *indianische Fächerhorn.**)

Müller l. c. S. 316. No. 1. der *Wedeler.*

Fabric. S. E. App. p. 824.

2. *Speciosus*, der *schöne indianische weiß und schwarzgefleckte Springkäfer.***)

Müller l. c. S. 317. No. 2. der *Springer.*

Fabric. S. E. p. 210. No. 1. *Elater* albus, nigro-maculatus.

3. *Oculatus*, das *amerikanische Schwarzauge.*

Müller l. c. S. 317. No. 3. t. 6. f. 13. das *Schwarzauge.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 723. der *an seinem Brust-schilde mit zwey kleinen schwarzen Augen versehene Springkäfer.*

Schröters Abhandl. I. S. 330. t. 2. f. 1.

Fabric. S. E. p. 210. No. 2. Thorace oculis duobus atris, corpore nigro, albo-maculato.

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 159. exot. 1. t. 17. f. 28. *Taupin à deux taches en œil.*

Elater niger; thorace maculis binis ovatis villosis aterrimis.

4. *Nocti-*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

4. *Noctilucus*, der *amerikanische leuchtende Springkäfer.*

Müller l. c. S. 318. No. 4. die *Studierlampe.*

Fermins Beschr. der Kol. Surinam. 2. Th. S. 284. die *große leuchtende Fliege?*

Adans. Reis. nach Senegall. Mart. *Uebers.* S. 136. pp.

Bankrofts Naturg. von Guiana. S. 146. *Feuerfliege.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 722. der *bey Nacht leuchtende Springkäfer.*

Lesser Theol. der Ins. S. 306. *brasilianische Lichtmücke; Lichtkäfer;* Cocojus; Cucujo; Memoa; Kephalolampis.

Nieremb. H. N. Lib. 13. c. 3.

Ionston hist. nat. de Ins. p. 107. cap. 8. de *Cocujo.* t. 16. Cocujo A. B.

Aldrov. de Ins. lib. 4. c. 7. f. 491.

Catholicon A. p. 89. *Acudia* C. 381. *Cocujas.*

Fabric. S. E. p. 210. No. 3.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 160. Exot. No. 2. t. 18. f. 1. *Taupin-luisant.*

Elater fuscus, thoracis lateribus, macula flava glabra convexa nitida.

Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris 1766. pag. 339. t. 10. f. 1. 2. 3.

5. *Phosphoreus*, der *amerikanische phosphorisirende Springkäfer.*

Müller l. c. S. 318. No. 5. die *Nachtkerze.*

Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 724. der *phosphorescirende Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 210. No. 4.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 161. Exot. 3. t. 18. f. 2. *Taupin phosphore.*

Fusco-castaneus; thorace postice maculis duabus flavis glabris; antennis pedibusque rufo-fuscis.

6. *Porcatus*, der *amerikanische Furchenflügel.**)

Müller l. c. S. 319. No. 6. der *Afterflügel.*

Fabric. S. E. p. 211. No. 8. *Viridi-aeneus*; elytris sulcatis, sulcis villoso-albis.

7. *Ligneus*, der *amerikanische holzbraune Springkäfer.***)

Müller l. c. S. 319. No. 7. der *Holzspringer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 725. der *Springkäfer mit ausgerandeten und hinten zugespitzten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 211. No. 6.

8. *Striatus*, der *surinamische gestreifte Springkäfer.*†)

Müller l. c. S. 319. No. 8. der *Zotenafter.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 726. der *Springkäfer mit bartigem After.*

9. *Bipustulatus*, die *Blutblatter.*††)

Müller l. c. S. 320. No. 9. der *Blutpunkt.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 36.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 15. Le *Taupin noir à taches rouges.*

Niger; elytrorum basi *maculis rubris.*

10. *Brunneus*, die *Braundecke.*†††)

Müller l. c. S. 320. No. 10.

Füeßlins

*) Dieser Springkäfer wird künftig in des Herrn D. *Martini* allgem. Gesch. der Natur der *Furchenflügel* heissen.

Nicht abgebildet.

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

†††) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 16. No. 313. der *Braune.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 719. der *Springkäfer mit eisenfarbnen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 214. No. 28.

Thorace rufo, medio nigro —

11. *Syriacus*, der *syrische Springkäfer mit zwo weissen Streifen.**)

Müller l. c. S. 320. No. 11. der *Syrer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 725. der *syrische Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 212. No. 17.

12. *Cruciatus*, der *Kreuzträger.*

Müller l. c. S. 320. No. 12.

Füeßlins Verzeich. schweiz. Ins. S. 16. No. 314. der *Kreuzträger.*

Sulzers Gesch. S. 53. t. 6. f. 10. der *Gekreuzte.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720. der *mit einem Kreuz versehene Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 212. No. 16.

Müllerі Faun. Fridr. p. 16. No. 158.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 531.

Niger; thorace abdomineque vtrinque rubro; *elytris* fulvis; *cruce nigra.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 133. No. 6. Le *Taupin porte-croix.*

Thorace nigro, circulo rubro; *elytris* fulvis; *cruce nigra.*

de *Geer* Ins. T. IV. p. 149. No. 9. *Taupin porte-croix.*

Pedibus rufis; *thorace* nigro, lateribus rubro; *elytris* fulvis; *cruce* maculisque binis nigris.

 13. *Linea-*

*) *Nicht abgebildet.*

13. *Linearis*, der *schmale Springkäfer.*

Müller l. c. S. 320. No. 13. der *Streifschild.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 208. t. 16.
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 721. der *linienförmige Springkäfer.*
Fabric. S. E. p. 213. No. 20.
Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 159.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 552.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 154. No. 17. *Taupin variable.*

Elater *(variabilis)*; thorace rufo; capite corporeque nigris, elytris *mari* flavis; *feminae* fuscis flavo-marginatis.

14. *Ruficollis*, der *Rothhals.*

Müller l. c. S. 321. No. 14. der *Rothkragen.*
Füeßlins schweiz. Ins. S. 16. No. 316. die *Rothbrust.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 47. der *schwarze rothbrüstige Springkäfer.*
— — — P. 3. p. 725.
Acta Upsal. 1736. p. 19. No. 3. *Attelabus* oblongus niger, collari testaceo.
Schaeff. Icon. t. 31. f. 3.
Fabric. S. E. p. 214. No. 27. Niger, *thorace* postico rubro, nitido.*)
Raj. Ins. pag. 92. No. 8. *Scarabaeus* elytris nigris, scapulis rubris.

Geoffr.

*) *Fabric.* citirt hierbey des *Scop. graminicum* No. 290. da doch derselbe den Unterschied von dem *Ruficolli* ausdrücklich anzeigt, und hinzusetzt: Ill. *Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 724. (diese ist aber bey Rufic. angeführt) minime nostrum indicat. v. unter den *neuen* No. 16.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 132. No. 5. Le *Taupin noir à corcelet rouge.**)

Elater niger; thorace rubro.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 153. No. 16. *Taupin à collier rouge.*

Thorace rubro, nitido, antice nigro; *elytris corporeque* nigris.

15. *Lineatus*, der *Schreberſche lineirte Springkäfer.***)

Müller l. c. S. 321. No. 15. das *Roſtral.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. S. 16. No. 317.

16. *Meſomelus*, der *Springkäfer mit einer ſchwarzen Mitte.*†)

Müller l. c. S. 321. No. 16. der *Gelbafter.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. S. 16. No. 318.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 721. der *auf der Mitte ſeiner Bruſt ſchwarze Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 214. No. 25.

17. *Aterrimus*, der *ganz ſchwarze Springkäfer.*††)

Müller l. c. S. 321. No. 17. der *Punktirer.*

Füeßlins ſchweiz. Inſekt. S. 16. No. 319. der *Kohlſchwarze.*

Fabric. S. E. p. 211. No. 9.

Thorace atro, nitido; *elytris* nigris, ſtriatis.

*) Obgleich *de Geer* und *Linn.* den *Geoffr.* bey dieſem angeführt haben; ſo macht doch *Fabric.* S. E. p. 214. No. 26. aus dem *Geoffroyſchen* einen neuen: *thoracicum*, der dem Ruficollis nahe kömmt, aber etwas gröſser iſt. S. unter den *neuen* No. 5.

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 160.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 535.
Ater; *thorace* opaco; *pedibus* fuscis. *Variat* antennis tarsisque rufis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 13. Le *Taupin en deuil.**)
Totus niger nitidus.

18. *Castaneus*, der *kastanienbraune Springkäfer.*

Müller l. c. S. 322. No. 18. der *Braunrock.*
Füeßlins schweiz. Inf. S. 16. No. 320. der *Kastanienfarbe.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 719. der *kastanienfarbne Springkäfer.*
Poda Mus. graec. p. 41. No. 1.**)
Act. Nidr. IV. p. 21.
Schaeff. Icon. t. 2. f. 6. t. 11. f. 9. t. 31. f. 4.
Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 161.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 534.
Gronov. Mus. 2. No. 482.
Fabric. S. E. p. 213. No. 18.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 132. No. 4. Le *Taupin à corcelet velouté.*†)
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 153. No. 15. *Taupin jaune à antennes barbues.*

Elater

*) Nach dem *de Geer* T. IV. p. 151. No. 12. *Linn.* No. 33. *Niger.* v. No. 28.

**) Dies ist eigentlich der, den *Poda* meynt; aber nicht des *Linn.* pectinic. No. 32. wie *Scop.* Entom. carn. No. 286. angemerkt hat.

†) Hiervon zwo Varietäten:
1. Elytris *flavescentibus*, apice nigris.
2. Elytris *rubescentibus*, apice nigris.

Elater *(flavo-pectinicornis) thorace* fusco pilis rufis; *elytris* flavis apice nigris, corpore subtus nigro; *antennis pectinatis.*

19. *Livens*, der *grüngelbe Springkäfer.*

Müller l. c. S. 322. No. 19. der *Blaurock.*
Füeßlins schweiz. Inf. S. 16. No. 321.
Fabric. S. E. p. 213. No. 19.*)
Schaeff. Icon. t. 11. f. 8.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 543.

20. *Ferrugineus*, der *schwedische rostfarbige Springkäfer.*

Müller l. c. S. 322. No. 20. der *Pompadur.*
Füeßlins Verz. S. 16. No. 321. der *Rostfarbe.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720. der *an seinem Leibe ganz und gar eisenfarbne Springkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 19. f. 1.
Fabric. S. E. p. 211. No. 7.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 130. No. 1. t. 2. f. 4. Le *Taupin rouge.*
Thorace, elytrisque rubris.

21. *Sanguineus*, der *blutrothe Springkäfer.*

Müller l. c. S. 322. No. 21. die *Hoftrauer.*
Füeßlins Verz. S. 16. No. 322. der *Blutrothe.*
Sulzers Gesch. S. 53. t. 6. f. 9. der *Rothrock.***)

*) Wo er vermuthlich durch einen Druckfehler *lucens* heisst.

*) Das vom *Linné* beygefügte Citatum: *Schaeff.* Icon. t. 2. f. 6. hat *Füeßlin* zu seinem *neuen* No. 323. a. *Elater Scopoli* No. 289. gesetzt; allein ob bey diesem letzrern *Sulzers* Gesch. t. 2. f. 6. richtig angeführt sey, zweifle ich fast, weil daselbst ausdrücklich l. c. auf *Linn.* No. 21. *Sanguin.* verwiesen ist.

Schäffers neuentdeckte Theile etc. S. 26. t. 2. f. 9. der *hellrothe Springkäfer.*

— — Elem. t. 60. f. 2.

— — Icon. t. 11. f. 8. 9. (alleg. *Müllero*).

— — — t. 31. f. 7. fem. (cit. *Füßl.* et *Sulzero*).

Poda Muſ. graec. p. 41.

Fabric. S. E. p. 214. No. 29.

Ater, *elytris* ſanguineis.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 725. der *blutrothe Springkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 162.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 532.

Niger, *elytris* rubris.

Geoffr. Inſ. Tom. I. pag. 131. No. 2. Le *Taupin à étuis rouges.*

de *Geer* Inſ. Tom. V. p. 151. No. 13.

Niger, *elytris* rubris.

22. *Balteatus*, der *gegürtelte Springkäfer.*

Müller l. c. S. 323. No. 22. t. 6. f. 14. der *Gürtelſpringer.*

Füeßlins Verz. S. 16. No. 323. b.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 719. der *Springkäfer mit ſchwarzen und röthlichen Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 30.

Act. Nidr. IV. 22.

Mülleri Faun. Fridr. p. 16. No. 163.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 542.

Niger; *elytris*, antice denudatis, rubris.

Schaeff. Icon. t. 31. f. 5. (teſt. *Füeßl.*)

— — — t. 77. f. 2. (— de *Geer*).

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 152. No. 14. *Taupin à ceinture.*

Niger, *elytris* antice dimidiato-rufis, poſtice nigris.

23. *Mar-*

23. *Marginatus*, der *Schwarzrand.*

Müller l. c. S. 323. No. 23.

Füeßlins Verz. S. 16. No. 324.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 721. der *Springkäfer mit einem dunklen Brustschild, und mit schaalichten Flügeldecken, die an ihrem Rand überall schwarz sind.*

Fabric. S. E. p. 213. No. 24.

Act. Nidr. III. 16. Uebers. p. 357. t. 6. f. 6.

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 548.

Rufo-fuscus; *pedibus elytrisque* flavis; *margine* suturaque fuscis.

Variat margine elytrorum minus fusco; thorace pubescente, et alius longior elytris immaculatis.

24. *Sputator*, der *Spritzer.**)

Müller l. c. S. 323. No. 24.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 725. der *Springkäfer mit schwarzen Fühlhörnern und Füßen.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 31.

Schaeff. Icon. t. 19. f. 5.

Müllери Faun. Fridr. p. 17. No. 162.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 553.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 151. No. 11. *Taupin brun à pattes jaunes.*

Elater *(fuscus flavipes)*, capite thoraceque nigris; elytris rufo-fuscis, pedibus flavis, antennis rufis.

25. *Obscurus*, der *dunkelbraune Springkäfer.*

Müller l. c. S. 323. No. 25. der *Nachtschatten.*

Füeßlins Verz. S. 16. No. 326.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 723. der *dunkle Springkäfer.*

Act.

*) Dieser Käfer hat die Eigenschaft, wenn man ihn plagt, dass er knirscht, und eine Feuchtigkeit aus dem Munde spritzt.

Act. Nidr. IV. 24. t. 16. f. 10?
Fabric. S. E. p. 213. No. 21.
Piceus; *thorace elytrisque* obscure nigris.
Müllerі Faun. Fridr. p. 17. No. 165.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 546.
Fuscus; *thorace* elevato; *elytris* striato-punctatis, intervallis rugolosis.

Variat corpore nigro et fusco, glabro vel pubescente, supra opaco, vel subnitente; elytris castaneis, lividis, fuscis vel nigris; antennis fuscis et rufis.

26. *Tristis*, der *Trauerspringkäfer.*

Müller l. c. S. 324. No. 26. das *Trauerkleid.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 726. der *traurige Springkäfer.*
Fabric. S. E. p. 213. No. 23.
Schaeff. Icon. t. 194. f. 1.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 158. No. 20. *Taupin à suture noire.*

E. *(lineatus)*, *thorace* nigro; *margine* flavo-fusco; *elytris* pallide flavo-fuscis; *sutura nigra.*

27. *Fasciatus*, die *weisse Wasserwelle.**)
Müller l. c. S. 324. No. 27. die *Wasserwelle.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720. der *mit einem weissen Band versehene Springkäfer.*
Fabric. S. E. p. 212. No. 12.
Scop. Entom. carn. No. 281.
Niger, opacus; *thorace* sulco medio, *elytro fascia* undata, albida.

28. *Mu-*

*) *Nicht abgebildet.*

28. *Murinus*, der *mausefarbige Springkäfer.*

Müller l. c. S. 324. No. 28. die *Wasserwolke.*
Füeßlins Verz. S. 16. No. 327. der *Mausfarbige.*
Onomatol. hist. nat. P. 3. p. 722. der *mausfarbene Springkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 4. f. 6.
Fabric. S. E. p. 211. No. 10.*)
Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 135. No. 10. Le *Taupin gris-de souris.*
Niger; *elytris* villoso-murinis.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 150. No. 16.
*Taupin à tarses roux.***)
E. *(rufipes)*, nigro-fuscus; *maculis* nebuloso-villosis, viridi-griseis; *plantis* rufis.

29. *Tessellatus*, der *gewürfelte Springkäfer.*

Müller l. c. S. 324. No. 29. der *Hanswurst.*
Füeßlins Verz. S. 16. No. 328.
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 725. der *gewürfelte Springkäfer.*
Fabric. S. E. p. 211. No. 11.
Scop. Ent. carn. No. 282. ELATER *thoracicus.*†) (alleg. *Fabric.*)
Schaeff. Icon. t. 4. f. 7.

Müllers

*) Nach *Fabric.* ist es *Geoffr.* No. 10.

**) Nach *de Geer* des *Geoffr.* No. 8. p. 134. Tom. I. Le *Taupin brun nebuleux*, welchen *Linn.* mit seinem *Niger* No. 33. für einerley hält, wobey aber *de Geer* des *Geoffr.* No. 13. *en deuil* angeführet hat, den *Fabric.* zu *Linn.* No. 17. *aterrimus* setzet. Es scheinet also *Linn. niger* und *aterrimus* einerley mit *Geoffr.* N. 13. *en deuil* zu seyn.

†) *Scop.* sagt nur: conf. Elat. *tessell.* L. hält ihn also nicht mit demselben völlig für einerley. v. unter den *neuen* No. 12.

Mülleri Faun. Fridr. p. 17. No. 166.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 547.
Villoso-murinus; *antennis tarsisque* rufis. (*Schaeff.* Icon. t. 4. f. 6. 7.)
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 135. No. 9. (alleg. *Fabric.*) Le *Taupin à plaques velues.*
Niger, villoso-vndulatus.
de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 148. No. 7. *Taupin à ongles roux.*
E. *(rufo-vnguiculatus)*, fusco aeneus nitidus; *maculis* villosis viridi-griseis; *antennis* nigris; *vnguibus* rufis.

30. *Germanus*, der *Teutsche.**)
Müller l. c. S. 324. No. 30.
Füeßlins Verz. S. 17. No. 329.

31. *Aeneus*, der *kupferfarbige Springkäfer.*
Müller l. c. S. 325. No. 31. der *Kupferschild.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 330. der *Kupferfarbige.*
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 719. der *kupferfarbne Springkäfer.*
Fabric. S. E. p. 212. No. 13.**)
Mülleri Faun. Fridr. p. 17. No. 167.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 549.
Coerulescenti-aeneus; *thorace* viridi; *vnguibus* pedum rubris.
Pedes in *mare* nigri, in *foemina* ferruginei.
Act. Nidr. III. *Uebers.* p. 358. t. 4. f. 6.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 149. No. 8. *Taupin cuivreux à pattes rousses.*
E. (*aeneus*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Fabric.* hat zwar dabey *Scop.* E. *nitens* No. 279. angeführet, woraus aber *Füeßlin* No. 325. einen *neuen* gemacht hat. v. No. 10.

E. *(aeneus rufipes)* viridi-aeneus, seu violaceus nitidus; *pedibus* fulvis.

32. *Pectinicornis*, der *Springkäfer mit kammförmigen Fühlhörnern.**)

Müller l. c. S. 325. No. 32. der *Kopfkamm.*

Füeßlins Verz. S. 17. No. 331. das *Kammhorn.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 724. der *strahlförmige Springkäfer.*

Act. Upsal. 1736. p. 15. No. 3. *Notopeda* nigro-aenea, *antennis simplicibus. (femina.)*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 541.

Aeneo-viridis; *antennis* nigris.

Schaeff. Icon. t. 2. f. 5. t. 5. f. 36. (alleg. *Müllero*).

Acta Nidr. V. 23.

Fabric. S. E. p. 212. No. 14.

Raj. Inf. p. 92. No. 7. SCARABAEVS *antennis articulatis* septimus.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 133. No. 7. Le *Taupin brun cuivreux.*

Fusco-viridi aeneus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 145. No. 2. t. 5. f. 3. *Taupin bronzé à antennes barbues.*

E. *(aeneo-pectinicornis)* viridi aeneus obscurus nitidus; *antennis* pectinatis.

33. *Niger*, der *schwarzbraune Springkäfer.*

Müller l. c. S. 325. No. 33. der *Schwarzrock.*

Füeßlins Verz. S. 17. No. 333.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 722. der *ganz schwarze Springkäfer.*

Raj.

*) Der vom *Linné* hierbey angeführte *Podaische* ist nicht dieser; sondern der *castaneus* No. 18.

in *Raj.* Inſ. p. 92. No. 1. *Scarabaeus* antennis articulatis primus, maxime vulgaris.

— — — No. 2. — antennis articulatis tertius.

Act. Vpſal. 1736. p. 15. No. 4. *Notopeda* atra, antennis ſimplicibus.

— — — — No. 5. *Notopeda* fuſca, antennis ſimplicibus.

Müllleri Faun. Fridr. p. 17. No. 168.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 536. Niger, nitidus, pubeſcens.

Variat thorace vndique pubeſcente, ſtriis elytrorum ſubpunctatis, et *vnguibus* rubris; *haec iterum* pedibus fuſcis, margine et apice abdominis rufis.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 136. No. 13. Le *Taupin en deuil.* (alleg. *de Geer.*)

Elater totus *niger* nitidus.*)

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 151. No. 12. *Taupin noir.*

Elater totus *ater* nitidus.

Schaeff. Icon. t. 174. f. 4.

34. *Minutus*, das *ganz kleine Springkäferchen.***)

Müller l. c. S. 325. No. 34. der *Kleinſpringer.*

Onomat. hiſt. nat. Part. 3. pag. 721. der *ganz kleine Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 33.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 554.

35. *Pulchellus*, das *Solandriſche Gelbfüßchen.*†)

Müller l. c. S. 325. No. 35. der *Gelbfuß.*

Füeßlins Verz. S. 17. No. 332.

Fabric. S. E. p. 215. No. 34.

36. *Tetra-*

*) v. No. 17. LINN. *aterrimus.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

36. *Tetrastichon*, der *afrikanische Springkäfer mit vier Reihen gelber Punkte.**)

Müller l. c. S. 326. No. 36. die *Punktstirn.*

37. *Bupreſtoïdes*, der *ſtinkkäferartige Springkäfer.***)

Müller l. c. S. 326. No. 37. der *Stinkſpringer.*

38. *Dermeſtoïdes*, der *ſpeckkäferartige Springkäfer.*†)

Müller l. c. S. 326. No. 38. der *Kleinſpringer.*

Unabgebildete Springkäfer.

1.	No.	1.	*Flabellicornis.*
2.	No.	2.	*Specioſus.*
3.	No.	6.	*Porcatus.*
4.	No.	7.	*Ligneus.*
5.	No.	8.	*Striatus.*
6.	No.	9.	*Bipuſtulatus.*
7.	No.	10.	*Brunneus.*
8.	No.	11.	*Syriacus.*
9.	No.	15.	*Lineatus.*
10.	No.	16.	*Meſomelus.*
11.	No.	17.	*Aterrimus.*
12.	No.	27.	*Faſciatus.*
13.	No.	30.	*Germanus.*
14.	No.	34.	*Minutus.*
15.	No.	35.	*Pulchellus.*
16.	No.	36.	*Tetraſtichon.*
17.	No.	37.	*Bupreſtoïdes.*
18.	No.	38.	*Dermeſtoïdes.*

Neue

*) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Neue Springkäferarten.

1. *Socialis*, der *gesellschaftliche Springkäfer.*

Linn. Add. p. 1067. No. 9.
Fuscus; *antennis elytrorumque* marginibus ferrugineis.
Müllers Suppl. B. S. 244. 39. der *Gesellschafter.*

2. *Fuscipes*, der *ostindische Braunfuß.*

Fabric. S. E. p. 211. No. 5.
Ater; *antennis pedibusque* fuscis.

3. *Cupreus*, der *englische kupferfarbige Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 212. No. 15.
Rufo-aeneus; *elytris* dimidiato-flavis.

4. *Flavipes*, der *amerikanische Gelbfuß.*

Fabric. S. E. p. 213. No. 22.
Thorace obscure-nigro; *elytris* striatis, fuscis, *pedibus* testaceis.

5. *Thoracicus*, der *englische Rothschild.*

Fabric. S. E. p. 214. No. 26.*)
Niger; *thorace* toto rufo.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 132. No. 5. Le *Taupin noir à corcelet rouge.*

6. *Striatus*, der *schwedische gestreifte Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 32.
Niger; *elytris* fuscis, lineatis.

7. *Festi-*

*) *Fabric.* frägt hierbey: An mera varietas E. *ruficollis* Linn.? No. 14. S. No. 14.
Von des SCOP. *thoracico* No. 282. verschieden. S. No. 29.

7. *Festivus*, der *aegyptische kleine Staats-Springkäfer.*

Fabric. S. E. p. 215. No. 35.

Thorace ferrugineo; *elytris* atris, *fasciis* duabus flavis.

8. *Luscus*, der *amerikanische Springkäfer mit zwey schwarzen Augen auf dem Brustschilde.*

Fabric. S. E. App. p. 824. 2-3.

Thorace *ocellis* binis atris; *corpore* nigro, immaculato.

9. *Sanguinolentus*, der *blutig eingesäumte Springkäfer.**)

Fr. Paula von Schrank Beyträge zur Naturg. S. 69. §. 16. t. 3. f. 15.

Ater; *elytris* sanguineis, margine interiori macula ovata magna atra communi.

10. *Nitens*, der *glänzende Springkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 279.**)

Totus nitens, aeneus, subtus fusco-virescens; *pedibus* aeneis *elytris* striatis.

Füeßlins Verz. S. 16. No. 325.

11. *Serraticornis*, das *Sägehorn.*

Scop. Ent. carn. No. 280.

Fuscus, *abdomine* supra *pedibusque* fulvis.

*) Keine Spielart des E. *sanguin.* Linn.

**) *Aeneum* LINN. dicerem, si *pedes* essent *sanguinei.*

12. *Thoracicus*, der *Eckschild.**)

Scop. Ent. carn. No. 282.
Fuscus, albidis punctulis variegatus; thorace *angulis* posticis exstantibus obtusis.

13. *Montanus*, der *Bergspringkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 283.
Villosulus, niger, nitens; *antennis* basi, *tibiisque* fulvis.
Füeßlins Verz. S. 17. No. 334.

14. *Advena*, der *seltene braungestreifte Springkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 288.**)
Niger; *elytris* testaceis, fasciis binis latis, castaneis.

15. *Istriacus*, der *istrisch-oesterreichische Springkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 289.
Niger; *thorace elytrisque* rubris.
Füeßlins Verz. S. 16. No. 323. a. †) *Scopolis Schnellkäfer.*

16. *Gramineus*, der *Grasspringkäfer.* ††)

Scop. Ent. carn. No. 290.
Niger; thorace vtrinque fulvo.

17. *Ferrugineus*, der *rostfarbige Springkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 291.
Caput fuscum; *thorax, corpus pedesque* ferruginei.
Elytrum testaceum; apice fasciaque fuscis.

18. *Dege-*

*) v. No. 29. *Tessellatus.*
**) Proximus Elat. *Syriaco* Linn.
†) v. No. 21. *Sanguineus.*
††) v. No. 14. *Ruficollis.*

18. *Degener*, der *abartende Springkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 292.

Niger; *aureis punctis*, variegatus, *thorace* postice edentato.

19. *Subfuscus*, der *bräunliche Feldspringkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 17. No. 169.

Thorace nigro; *elytris* rufo-fuscis, punctis striatis, abdomine rufo.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 538.

Niger; *elytris* fuscis; *abdomine* rubro.

Variat totus pubescens, *abdomine toto* rubro.

20. *Siaelandicus*, der *Glanzschild.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 17. No. 170.

Thorace nitido; *elytris* aeneis; *punctis* striatis; nebula maculatis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 550.

Purpureo-aeneus; *pilis* griseis vndique adpressis.

21. *Sex-maculatus*, der *Sechsfleck.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 17. No. 171.

Thorace nigro; *margine elytrisque* testaceis, maculis sex subfuscis glabris.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 544.

Niger, obscurus villo griseo; *pedibus* fuscis.

22. *Badius*, der *braungraue Springkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 17. No. 172.

Thorace abdomineque nitido nigro; *elytris* striatis, pedibusque castaneis.

— Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 540.

Niger; *elytris*, *antennis pedibusque* castaneis.

Variat corpore nitido, thorace subtus abdominisque apice et lateribus rufis: *alia varietas* thorace toto rufo, elytrorum futura nigra.

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 147. No. 5. t. 5. f. 19. *Taupin brun à corps court.*

ELATER *(obtusus)*, corpore obtuso subtus nigro; *thorace* nigro; *elytris* fuscis griseo-villosis; *antennis* rufis.

23. *Pullus*, der *schwarzbraune Springkäfer.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 537.

Niger, nitidus, pubescens, *elytris* punctatis; *pedibus* brunneis.

24. *Chrysomelinus*, der *chrysomelenartige Springkäfer.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 539.

Niger; *thorace* rubro sulcato; *elytris* tarsisque flavis.

25. *Lugubris*, der *Trauerspringkäfer.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 60. No. 545.

Supra ater, opacus, *subtus* niger.

26. *Flavipes*, der *Gelbfuß.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 61. No. 551.

Rufus, pubescens; *pedibus* luteis.

27. *Tuberculatus*, der *höckrichte Springkäfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 208. No. 13. t. 16.

Magnitudine *pectinicornis*, totus niger, opacus; *thorax* in medio ex duobus *tuberculis* gibbus; *elytra* laevissime striata; *plantis* ferrugineis.

28. *Ameri-*

28. *Americanus*, der *amerikanische schwarzglänzende Springkäfer.*

Gronov. Mus. 2. p. 153. No. 481.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 719.

29. *Gracilis*, der *amerikanische hagere Springkäfer.*

Gronov. Mus. No. 478.
Testaceus; *thorace capiteque* linea longitudinali macula laterali atra; *elytris* laevissimis, margine atris.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 720.

30. *Viridi-aeneus*, der *kupferfarbige Springkäfer aus Guinea.*

Gronov. Mus. 2. p. 153. No. 476.
Thorace subpubescente; *antennis* nigris; *elytris* striatis.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 727.

31. *Maximus*, der *amerikanische größte Springkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 52. t. 6. f. 7.
Totus niger; vbique *aureo pulvere* conspersus, *squamulis* Papilionum aequante; *antennis* serratiformibus; *caput* breve; *oculis* nigris; *thorace* magno, antice rotundato, postice lato, *duobus angulis* exstantibus.

32. *Latus*, der *schweizerische breite Springkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 53. t. 6. f. 8.
Thorace elytrisque viridi-coerulescentibus; *capite ventreque* metallico, punctis excavatis; *antennis* gracilibus serratiformibus; *elytris* latis, arcuatis, aureo-coerulescentibus, longitudinaliter sulcatis.
Füeßlins Verz. S. 16. No. 315. der *Breite.*

33. *Rubro-marginatus*, der *Rothrand in der jaikischen Steppe.*

Lepech. Tageb. I. Th. S. 311. t. 16. f. 12.

Elater niger; thorace *marginibus rubris;* elytris ad futuram lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis.

34. *Auratus*, der *chinesische goldene Springkäfer.*

Drury Inf. II. p. 65. t. 35. f. 3.

Capite; thorace; elytrisque aureo-viridibus; *pedibus* nigris.

35. *Nigro-flavus*, der *schwarzgelbe Springkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 131. No. 3. Le *Taupin à etuis jaunes, et corcelet lisse.*

Niger; *elytris* flavis. *Variat*

1. elytris omnino flavis,
2. elytris flavis apice nigris,
3. elytris testaceo-fuscis.

36. *Bicolor*, der *zweyfarbige Springkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 135. No. 11. Le *Taupin bédeau.*

Niger; *elytris* fuscis, singulo fascia longitudinali fulva.

Raj. Inf. p. 78. No. 13. *Scarabaeus* minor longe et angusto corpore; elytris *bicoloribus* e fulvo et nigro, *saltatrix.*

37. *Brunneus*, die *braune Flügeldecke.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 12. Le *Taupin noir à étuis bruns.*

Niger; *elytris* fuscis.

38. *Rufi-*

38. *Rufipes*, der *Rothfuß.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 136. No. 14. Le *Taupin noir à pattes fauves.*

Niger, pedibus rufis.

39. *Clavatus*, das *Keulhorn.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 137. No. 16. Le *Taupin à antennes en masse.*

Fuscus; antennis *serrato-clavatis.*

40. *Rufus*, der *Fuchs.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 144. No. 1. t. 5. f. 18. *Taupin roux.*

Totus rufus; *oculis* nigris.

41. *Fuscus major*, der *große Braune.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 146. No. 3. *Grand Taupin brun.*

Nigro-fuscus nitidus, *pedibus* fusco-castaneis; *abdomine* supra rubente.

42. *Fuscus minor*, der *kleine Braune.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 147. No. 4. *Petit taupin brun.*

Elongatus; *capite thoraceque* nigris; *elytris* obscure fuscis; *pedibus antennisque* fuscis.

43. *Inaequalis*, der *ungleiche Brustschild.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 148. No. 6. *Taupin à corcelet inegal.*

Niger; *maculis* villosis griseis; *elytris* scabris, *thorace* cavitatibus impressis.

44. *Vndulatus*, der *gewässerte Springkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 155. No. 18. t. 5. f. 26. *Taupin à bandes ondées noires.*

Griseo-murinus villosus; *elytris* fasciis tribus vndulatis transversis nigris.

45. *Nigro-maculatus*, der *Schwarzgefleckte.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 158. No. 19. *Taupin à corcelet tacheté.*

Capite nigro; *thorace* rufo; *maculis tribus* oblongis nigris; *elytris* pallide fuscis.

46. *Aeneo-niger*, der *erzfarbige Schwarze.*

de *Geer* Ins. T. IV. p. 159. No. 21. *Taupin bronzé.* Nigro-viridi-aeneus nitidus; *pedibus* nigris.

47. *Piceus*, der *pensylvanische Pechschwarze.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 162. *exot.* No. 4. t. 18. f. 3. *Taupin couleur de poix.*

Totur ater, nitidus; *elytris* laevissimis.

48. *Lividus*, der *pensylvanische Bleyfahle.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 162. *exot.* No. 5. t. 18. f. 4. *Taupin livide.*

49. *Flavipes*, der *surinamische Gelbfuß.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 163. *exot.* No. 6. t. 18. f. 5. *Taupin à pattes fauves.*

Nigro-fuscus; *pedibus antennisque* flavo-testaceis.

50. *Maculatus*, der *surinamische Gefleckte.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 163. *exot.* No. 7. t. 18. f. 6. *Taupin tacheté.*

Obscure-testaceus; *thorace* antice nigro; singulo elytro *maculis binis* irregularibus nigris.

210. GESCHLECHT. Cicindela; *Sandkäfer; Sandläufer.**)

Straſs. Magaz. 1. B. S. 234. *Glimmerkäfer.*

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 327. *Sandläufer; holl.* Zandloopers.

Börners Samml. etc. I. Th. S. 461. *Zangenkäfer.*

Eberhards Thiergeſchichte, S. 194. *Zangenkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 98. Th. 18. der *Zangenkäfer; leuchtende Käfer.*

Sulzers

*) Verſchiedene unter den *Alten*, als *Mouffet*, verſtehen darunter die *Cantharides*, worinn ihnen einige *Neuere*, als *Geoffroy*, gefolget ſind. Man muſs ſie daher mit *ſeinen Cicindelis* nicht verwechſeln, welches die *Cantbar.* Linn. oder des SCHAEFF. und DE GEER *Thelephori* ſind.

Sulzer nennt ſie in ſeinen *Kennzeichen* noch *leuchtende Käfer*, welche Eigenſchaft aber ihnen gar nicht zukömmt: richtiger hat er ſie in ſeiner Geſchichte *Sandkäfer* genennet.

Von ihrer *Oekonomie* ſagt LINN. *Cicindelae* inſectorum Tigrides veloces; *larvae etiammum latent*, worinn ihm Hr. M. *Börner* beypflichtet; allein nach *Sulzers* Geſch. S. 54. iſt nunmehro bekannt:

1. daſs ſich dieſe Inſekten als Käfer, oder in ihrem vollkommenen Zuſtande, mehrentheils in wilden, trockenen, ſteinichten, und hauptſächlich *ſandichten* Orten aufhalten, und rechte privilegirte *Inſektenräuber* ſind;

2. die *Larven* aber, als lange, weiſse, weiche, ſechsbeinige Würmer, in runden, tiefen, cylindriſchen Löchern unter der Erde ſtecken. Wenn ſie hungrig ſind, ſteigen ſie herauf, und lauren in dem runden Loche, worein ihr mit einem Schilde bedeckter Kopf akkurat paſst, auf ein vorüberlaufendes Inſekt, welches ſie mit ihren Zangen faſſen, und in die Höhle herunterziehen, worinn ſie ſich auch in Käfer verwandeln. Wenn man dieſe Käfer zwiſchen die Finger nimmt, geben ſie, wie die *Carabi*, einen braunen Saft von ſich. Dieſe letztern begreift auch *Geoffr.* nebſt den *Cicindelis* unter ſeinen *Buprestidibus.*

Sulzers Kennz. S. 69. *leuchtender Käfer.*
— — Gesch. S. 53. *Sandkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 208. XIV. *Cicindela.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 17. *Glimmkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 854. das *leuchtende Käfergeschlecht.*
Schaeff. Elem. t. 43. *Zangenkäfer.*
Comment. Lipsi. Dec. I. Vol. V. 607. IV. 580. III. 216. V. 606.
Fabric. S. E. pag. 224. *Cicindela.* p. 227. *Elaphrus* (die *kleinern* dieser Art).
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 210.
Scop. Entom. carn. p. 57.
Mülleri (Ott. Fr.) Faun. Fridr. p. 17.
— — Zool. Dan. Prodr. pag. 79. *Skov-Tigger,* nom. gen. *Bobbe.* APH. I. 407.
Catholicon C. p. 325. *Glimmerkäfer; Glanzkäfer; leuchtende Käfer.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 137. *Bupreste.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. préf. VI. p. 108. *Cicindeles.*
Bom. Dict. III. p. 160.

1. *Campestris,* der *Feldläufer.*

Müller l. c. S. 328. No. 1. t. 6. f. 15. der *Courier.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 335. der *Courier.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 208. No. 1.
Sulzers Kennz. t. 5. f. 37.
Neuer Schauplatz der Nat. 2. B. S. 272.
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 856. der *grüne leuchtende Käfer mit weißen Flecken auf den Flügeldecken.*
Schaeff. Icon. t. 34. f. 8. 9.
Act. Nidr. III. p. 358.
Fabric. S. E. p. 224. No. 1.
Mülleri Faun. Fridr. p. 17. No. 173.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 862.

Geoffr.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 153. *Bupreſtis* 27. Le *Velours vert à douze points blancs.*

BVPRESTIS *inauratus*, ſupra viridis; *coleoptris* punctis 12 albis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 113. No. 1. t. 4. f. 1. *Cicindele champêtre.*

Viridis nitida; *elytris* ſingulis *punctis ſex* albis.

2. *Hybrida*, der *gefleckte Sandkäfer.*

Müller l. c. S. 328. No. 2. der *Läufer.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 336. der *Läufer.*
Schaeff. Icon. t. 35. f. 10.
Fabric. S. E. p. 224. No. 2.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 863.

Supra fuſco-viridis; elytris faſcia vndulata; lunulisque *quatuor* albis.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 155. *Bupreſtis* 28.*) Le *Bupreſte à broderie blanche.*

B. *inauratus*, ſupra fuſco-viridis, *coleoptris* faſciis ſex vndulatis albis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 115. No. 3. t. 4. f. 8. *Cicindele tachetée.*

Maculata, *ſupra* viridi-griſea nitida, *ſubtus* viridi-aurea; *elytris* ſingulis faſcia lunulisque duabus albis.

3. *Capenſis*, der *kapenſiſche Sandkäfer.*

Müller l. c. S. 328. No. 3. der *afrikaniſche Bothe.*
Sulzers Geſch. S. 54. t. 6. f. 11. der *Kapläufer.*
Fabric. S. E. p. 225. No. 5.

4. *Ger-*

*) alleg. *de Geer*; nach *Fabric.* aber No. 8. *ſylvatica.*

4. *Germanica*, der *teutsche Sandkäfer.**)

Müller l. c. S. 329. No. 4. der *Postknecht.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 337. der *Postknecht.*
Fabric. S. E. p. 225. No. 6.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 155. *Bupr.* 29. Le *Bupreste vert à six points blancs.*

B. *inauratus*, supra fusco-viridis, *coleoptris* punctis sex albis.

5. *Virginica*, der *virginische Sandkäfer.***)

Müller l. c. S. 329. No. 5. die *Estaffette.*
Fabric. S. E. App. p. 825.

6. *Carolina*, der *karolinische Sandkäfer.*

Müller l. c. S. 329. No. 6. der *Fußgänger.*
Fabric. S. E. p. 226. No. 13.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 120. *exot.* No. 2. t. 17. f. 24. *Cicindele de la Caroline.*

7. *Aequinoctialis*, der *surinamische Sandkäfer.*†)

Müller l. c. S. 329. No. 7. der *Wanderer.*
Fabric. S. E. p. 226. No. 14.

8. *Sylvatica*, der *Waldsandkäfer.*

Müller l. c. S. 329. No. 8. t. 6. f. 16. der *Waldjäger.*
Schröters Abhandl. I. Th. S. 340. t. 2. f. 5. der *kleine Zangenkäfer.*††) CICINDELA *sylvatica surinamensis.*

Onomat.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) Die vom Herrn D. *Schröter* angeführte *Schäfferische* Elem. t. 43. hat *Linné* bey No. 2. *hybrida.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 855. der *schwarze leuchtende Käfer mit weissen Flecken.*

Act. Vpsal. 1736. p. 19. No. 1. *Cicindela* atra, punctis quatuor fasciaque albis.

Pet. Gaz. p. 77. t. 50. f. 5. *Cantharis* chusan. viridis, elegantissime variegatus.

Fabric. S. E. p. 224. No. 3.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 155. *Bupr.* 28. *)

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 114. No. 2. t. 4. f. 7. *Cicindele des forêts.*

Supra nigra, subtus viridis nitida; *elytris* singulis fascia punctisque tribus albis.

9. *Maura*, der *algierische Sandkäfer.* **)

Müller l. c. S. 330. No. 9. der *Tiger.*
Fabric. S. E. p. 226. No. 15.

10. *Riparia*, der *Ufersandkäfer.*

Müller l. c. S. 330. No. 10. der *Ufersteiger.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 339. *Strandläufer.*
Sulzers Gesch. S. 55. t. 6. f. 13. der *Gestadekäfer.*
Linn. Reisen durch Oeland. *Uebers.* S. 133.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 857. der *grüne kupferglänzende leuchtende Käfer mit breiten vertieften Punkten auf den Flügeldecken.*

Act. Vpsal. 1736. pag. 19. No. 3. *Cicindela* aenea; punctis excavatis.

Schaeff. Icon. t. 86. f. 4.

Fabric.

*) alleg. *Fabric.* nach *de Geer* aber No. 2. *hybrida.*

**) *Nicht abgebildet.*

Schwerlich möchte die im *Fermin* II. 284. beschriebene *leuchtende Fliege* diese CICINDELA *maura*; eher ELATER *noctilucus* seyn.

Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 1.
Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 174.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 864.
Aeneo-fusca; *elytris* scarificatis.
Geoffr. Ins. Tom. 1, p. 156. *Bupr.* 30. Le *Bupreste à mammelons.*
B. viridi-aeneus; *elytris* punctis latis excavatis mammillosis.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 117. No. 4. t. 4. f. 9. *Cicindele de rivage.*
Viridi-aenea; maculis rotundis, excavatis griseo-viridibus.

11. *Flavipes*, der *Gelbfuß.**)
Müller l. c. S. 330. No. 11. der *Bothenschild.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 340. der *Gelbfuß.*
Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 2.
Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 175.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 868.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 119. No. 6. *Cicindele à pattes jaunes.*
Capite, *thoraceque* viridi-aeneis, *elytris* pallide fuscis, nigro-maculatis, *antennis pedibusque* flavescentibus.

12. *Rupestris*, der *Felsensandkäfer.***)
Müller l. c. S. 330. No. 12. der *Felsenkletterer.*
Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 3.

13. *4-maculata*, der *Vierfleck.*†)
Müller l. c. S. 331. No. 13. der *Expresse.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 176.

14. *Aqua-*

*) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*

14. *Aquatica*, der *Wasserufersandkäfer.**)

Müller l. c. S. 331. No. 14. *Wasserschwimmer.*

Acta Upsal. 1736. p. 19. No. 20. *Cicindela* minima aurea laevis.

Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 4.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 355. der *kupferglänzende ganz glatte Stinkkäfer; der kleine goldfarbigte Stinkkäfer.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 177.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 865.

Nigra, nitida; supra fusco-aenea; *elytrorum* striis aequaliter distantibus; pedibus rufo-fuscis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 157. *Bupr.* 31. Le *Bupreste à tête canelée.*

B. fusco-aeneus; capite profunde striato; *elytrorum* stria prima remotissima.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 118. No. 5. *Cicindele à tête canelée.*

C. *striata*, aenea, nitidissima, *capite* striato; *elytris* dimidio striatis punctatis: intus laevibus.

Unabgebildete Sandkäfer.

1. No. 4. *Germanica.***)
2. No. 5. *Virginica.*

3. No.

*) Ich habe sie lieber den *Wasserufersandkäfer* nennen wollen, weil Herr *de Geer* mit Recht zweifelt, dass sie sich wirklich im Wasser aufhalten sollte.

**) Dass der sel. *Müller* geglaubt haben muss: alle vom Linn. angeführte *Schreberische* Insekten, aus dessen nov. sp. Ins. Hafae 4. 1759, wären gestochen, abgebildet und illuminirt, erhellet daraus, weil er die *german.* Linn. *Schreb.* obscurior. No. 5. in dem, des 6. B. 2. Th. beygefügten Verzeichniss unter den *illuminirten* aufgeführet hat, welches der Augenschein widerleget.

3. No. 7. *Aequinoctialis.*
4. No. 9. *Maura.*
5. No. 11. *Flavipes.*
6. No. 12. *Rupestris.*
7. No. 13. *4-maculata.*

Neue Sandkäferarten.

1. *Interrupta*, der *Sierra Leonische Sandkäfer.*

Fabric. S. E. p. 225. No. 4.
C. *elytris* fuscis puncto baseos; *fasciis* tribus interruptis, *lineolaque* apicis flavis.

2. *Tuberculata*, der *neuseeländische zweyhökrichte Sandkäfer.*

Fabric. S. E. p. 225. No. 7.
Thorace fusco, bituberculato; *elytris* fusco viridique variis; *margine* tridentato, albo.

3. *Vnipunctata*, der *amerikanische Einpunkt.*

Fabric. S. E. p. 225. No. 8.
Subpurpurascens, *labio elytrisque* puncto albo.

4. *Sexpunctata*, der *malabarische Sechspunkt.*

Fabric. S. E. p. 226. No. 9.
Viridi-aenea; *elytrorum* disco obscuriore, *punctis tribus albis.*

5. *Sexguttata*, der *virginische Sechspunkt.*

Fabric. S. E. p. 226. No. 10.
Viridis, nitida; *elytris* punctis tribus marginalibus, albis.

6. *Catena*,

6. *Catena*, die *ostindianische Punktkette.*

Fabric. S. E. p. 226. No. 11.

Viridi-aenea; *elytris* albidis, *punctis* sex viridibus, *concatenatis.*

7. *Marginata*, der *virginische Weißrand.*

Fabric. S. E. p. 226. No. 12.

Viridis; *elytris* margine fascia vndata, punctisque duobus albis.

8. *Semipunctata*, der *hallische halbpunktirte Sandkäfer.*

Fabric. S. E. p. 227. *Elaphrus* 5.

Aeneus, nitidus; *elytris* punctatis, dorso glabertimo.

9. *Tristis*, der *Druryische schwarze Sandkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 825. 3-4.

Nigra; *elytris* macula media flava.

10. *Littorea*, der *aegyptische Ufersandkäfer.*

Forskähl Descr. Animal. p. 77. t. 24. A.

Violaceo-aenea; *elytris* lunulis quatuor, cum margine confluentibus, albis.

11. *Sexmaculata*, der *russische sechsgefleckte Glanzkäfer.*

Lepech. Tageb. II. Th. S. 203. t. 10. f. 12.

Capite virescente; *thorace* rubro; *elytris* testaceis; *maculis* sex nigris.

12. *Austriaca*, der *oesterreichische Glanzkäfer.*

Fr. von Paula Schrank Beytr. zur N. G. S. 69. §. 17.

Viridis; pectore abdominisque basi subtus rubro-aeneis; *elytris margine aureo* tenuissimo, punctis aliquot albis.

13. *Literatus*, der *bündtische Gelehrte.*

Sulzers Gesch. S. 55. t. 6. f. 12.

Thorace, *capite pedibusque* metallicis albo-villosis; *elytris* cupreis coeruleo-punctatis, striis argenteis, *litteris* aequantibus.

Füeßlins Verzeichn. S. 17. No. 338. *Arenaria, Sandläufer.*

14. *Danica*, der *dänische messingfarbige Sandläufer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 18. No. 178.
Orichalcica; dorso speculifero.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 865.
Nigra, supra fusco-aenea; *elytrorum* striis lateralibus remotis; dorso speculifero.

15. *Punctata*, der *punktirte Sandkäfer.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 18. No. 179.
Subaenea; *elytris* nitidis; punctis plurimis albis.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 867.
Nigra, supra subaenea; *elytris* striatis, punctis impressis quatuor; *pedibus* flavo-fuscis.

16. *Lacteola*, der *Milchrand.*

Pallas Reis. I. *Ausz.* App. No. 41.
Magnitudo et nitor *hybridae*; *elytra* margine lateral vndique late lacteo. E Lacu *Inderiensi.*
Müllers Suppl. B. S. 245. t. 15.

17. *Atrata*,

17. *Atrata*, der *ganz schwarze Sandläufer.*

Pallas Reis. I. *Ausz.* App. No. 42.

Magnitudo et forma *germanicae.* Tota quanta sine vllo nitore *atra.*

Müllers S. B. S. 245. t. 16. der *Trauerrock.*

18. *Coerulea*, der *sibirische himmelblaue Sandläufer.*

Pallas Reis. II. App. No. 65.

Magnitudo *Sylvaticae;* os album; reliqua corporis tota *coerulea.*

Müllers S. B. S. 245. t. 17. das *Weißmaul.*

19. *Gracilis*, der *dünne schmale Sandläufer.*

Pallas Reis. II. App. No. 66.

Omnibus congeneribus *gracilior;* fusco-nigra tota et subaenea. In arenis ad *Schultam.*

Müllers S. B. S. 246. t. 18. der *Schmalbauch.*

20. *Chinensis*, der *chinesische Sandkäfer.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 119. *exot.* No. 1. t. 17. f. 23. *Cicindele chinoise.*

Capite corporeque subtus coeruleo-violaceis nitidis; *elytris* viridibus: *maculis* nigris punctisque quatuor albis.

Da *Geoffroy* die *Carabos* und *Cicindelas Linn.* unter ein Geschlecht, nämlich unter seine *Buprestides* gebracht hat; so fürchtete ich zu fehlen, wenn ich darunter die *neuen Cicindelas* herausuchen wollte: Bey den *Carabis* aber werde ich sie lieber *zusammen* nehmen.

211. GESCHLECHT. Bupreſtis; *Stinkkäfer; Gleißkäfer;**) Schaarbuyter; *franz.* Richard.

Müllers Linn. Naturſ. 5. Th. 1. B. S. 332. *Stinkkäfer.*
Holl. Agret-Torren.
Börners Samml. I. Th. S. 475. *Stinkkäfer.*

Beck-

*) Des GEOFFR. *Bupreſtides* ſind, wie ſchon erinnert worden, des LINN. *Carabi* und *Cicindelae.*

Skopoli nennet dieſe *Linn. Bupr. Mordellas*, und verſtehet unter ſeinen eigenen *Bupreſt.* des LINN. *Chryſomelas.*

Sonſt heiſst auch noch eine kleine rothe Art ſchwimmender Waſſermilben *(Reitläuſe)*, die dem Vieh, wenn es ſie verſchluckt, ſchädlich ſeyn ſollen, *Bupreſte*, wohin z. E. LINN. *Acarus aquaticus* gehört.

Schwerlich iſt es auszumachen, ob dieſes das nämliche Inſekt ſey, welches die Alten *Bupriſtis*, auch *Budapi* genennet, und behauptet haben, daſs es dem Hornvieh, wenn es ſolches verſchlucke, eine Entzündung verurſache.

Der Name *Stinkkäfer* ſchickt ſich beſſer für die *Coprides* (Miſtkäfer), *Silphas* (Todtengräber) und *Carabos* (Erdkäfer), welche an ſich ſelbſt übel riechen, als für dieſe, welche gar keinen Geruch von ſich geben, ſondern, vorzüglich die groſsen ausländiſchen, mit ſo prächtigen Farben gezieret ſind, daſs ihre Flügeldecken zum Kopfputz des amerikaniſchen Frauenzimmers angewendet werden. Daher der holländiſche Name *Agret-Torren.* Ich würde ſie lieber PRACHTKAEFER nennen.

Die Käfer ſelbſt gehören unter die ſeltenern Geſchlechter, und wohnen meiſtens in Moräſten und ſchlammichten Gegenden. Von ihrer *Verwandlung* weiſs man noch zur Zeit gar nichts, und was man als wahrſcheinlich vermuthet, iſt dieſes: daſs ſich auch ihre *Larven im Schlamm aufhalten.*

Aldrov. et *Ionſt.* Brupreſtides, v. *Ionſt.* hiſt. Inſ. p. 106. t. 16. ſcheinen die *Cimices* perſon. Linn. die *ſtinkenden Baumwanzen; Qualſter* zu ſeyn. cf. *Hanovs* Seltenh. der Nat. I. p. 350. *Bupreſtis, Baumwanze.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. gen. 19. *Stinkkäfer.*
Eberhards Thiergesch. S. 196. §. 28. *Stinkkäfer.*
Lessers Theol. der Ins. S. 71. §. 43. 1.
An *Qualsters*, oder *Erdhühnerchen? Bupreſtes.* Swammerd. p. 107.
Sulzers Kennz. S. 71. *Stinkkäfer.*
— — Gesch. S. 55. der *Gleißkäfer.* Le *Richard.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 17. *Gleißkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. S. 208. *Stinkkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 352. *Stinkkäfer.*
Catholicon B. p. 419. *Bupreſte*; *Stinkkäfer.*
Lemery p. 19. 3.
Bomar. Dict. II. p. 220.
Charlet. Onom. pag. 47. The *Burn-Cow*; *Burſt-Cow.*
Fabric. S. E. p. 216. *Buprestis.*
Brünnichii Entom. p. 54. DAN. *Bobbe.*
Scop. Entom. carn. p. 60. *Mordella.*
— Ann. 5. hist. nat. p. 104.
Müllers Faun. Fridr. p. 18. *Buprestis.*
— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. *Buprestis.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 212. *Buprestis.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 123. *Cucujus*; Le *Richard.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 122. Des *Bupreſtes.*

I. ELYTRIS FASTIGIATIS.

*Mit bauchigen Flügeldecken, welche dachförmig gegen einander in die Höhe ſteigen.**)

1. *Gigantea*, der *größte ausländiſche Prachtkäfer.* (der Rieſe.)

*) Ich würde lieber ſagen: mit hinten *geſpitzten Flügeldecken.*

Müller l. c. S. 333. No. 1. t. 7. f. 1. der *Goldharnisch.*
Fabric. S. E. p. 216. No. 2.
Seba Mus. 3. t. 84. f. 12.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 134. *exot.* No. 1. *Bupreste géant.*

Viridi-aenea, nitidissima; *elytris* rugoso-sulcatis; *thorace* maculis binis nigro-aeneis.

Sloane Hist. of Jam. Tom. II. p. 210. t. 236. f. 13. *Cantharis* maxima.

Grew Mus. pag. 165. t. 13. The *great Gogle Eyed Beetle.*

Scop. ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 84. MORDELLA *gigantea.*

Elytra lineata, et punctis confluentibus, scrobiculata.

2. *8-guttata*, der *Achttropf.*

Müller l. c. S. 334. No. 2. der *Fleckenschild.*
Pallas Reisen I. p. 26. *Ausz.* I. p. 14. *)
Lepechins Tageb. II. Theil, S. 200. t. 10. f. 5. 6. pag. 201. **)
Schaeff. Icon. t. 31. f. 1.
Fabric. S. E. p. 220. No. 23.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 126. *Cucujus* 2. Le *Richard à points blancs.*

Viridi-aeneus; *punctis quatuor* impressis albis.

Leche nov. Ins. spec. p. 21. No. 42.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 132. No. 5. t. 4. f. 20. *Bupreste à points blancs.*

B. (*albo-*

*) Bey *Kamschtka* schwärmte an allen liegenden Fichtenstämmen die sonst *höchstseltene* BVPRESTIS *octoguttata* herum.

**) *Varietas* B. *8-guttatae* minor 6-guttata;
— B. *Nigerrima tota.* An *Varietas* praecedentis?

B. *(albo-punctata)* coeruleo-violacea nitida; *thoracis* lateribus albis; *elytris* striatis; *maculis* quinque albis.

II. ELYTRIS VERSUS APICEM SERRATIS.

Mit Deckschilden, die hinten an der Spitze gezähnelt sind.

3. *Ignita*, der *ostindianische goldglühende Prachtkäfer.*

Müller l. c. S. 335. No. 3. die *Feuergluth.* (Bey den Einwohnern *Dias; Giao; Lanibao; Salibat.)*

Sulzers Gesch. S. 56. t. 6. f. 14.*)

Fabric. S. E. p. 217. No. 9.

4. *Stricta*, der *ostindianische Schmalbauch.***)

Müller l. c. S. 335. No. 4. der *Schmalbauch.*

5. *Sternicornis*, das *ostindianische Brusthorn.* a.

Müller l. c. S. 336. No. 5. das *Brusthorn.*

Fabric. S. E. p. 218. No. 12. †)

Elytris serrato-tridentatis; viridibus; *punctis* cinereis impressis, *sterno* porrecto, conico.

de *Geer* Ins. T. IV. p. 136. *exot.* No. 2. t. 17. f. 25. *Bupreste à pointe.*

B. *viridi-aurata; elytris* fusco castaneis, serrato-tridentatis; *thorace* punctato; *sterno* porrecto.

Grew Mus. pag. 166. t. 13. The *thik Gogle-Eyed Beetle.* Carabus orientalis crassus.

*) Nach *Sulzers* Gesch. S. 57. das *Weibchen* von B. *Bimaculata* No. 16.

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Fabric.* hat hieraus zwo besondere Arten gemacht.

Sloane Hist. of Jam. Tom. II. p. 110. t. 236. f. 8. *Cantharis* major; *capite* et *thorace* cavitatibus donatis; *elytris* laevibus.

b. *Chrysis*, der *Goldglanz.*

Fabric. S. E. p. 218. No. 13.

Elytris ferrato-tridentatis, castaneis; *sterno* conico porrecto.

Simillimus *Sternicorni;* differt tamen *elytris totis castaneis*, immaculatis, laevibus. Subtus *viridiaurea*, immaculata.

6. *Mariana*, der *maryländische Prachtkäfer.*

Müller l. c. S. 336. No. 6. der *Maryländer.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 354. der *braune Stinkkäfer mit Goldflecken.**)

Petiv. Gaz. t. 2. f. 2.

Fabric. S. E. p. 219. No. 15.

Schaeff. Icon. t. 49. f. 1. (all. *Fabric.*)

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 128. No. 1. t. 4. f. 18. *Buprestе mariane.*

B. nitida, supra fusco-aenea, subtus rubro-cuprea; *elytris* rugosis postice dehiscentibus.

7. *Chrysostigma*, der *Goldpunkt.*

Müller l. c. S. 336. No. 7.

Füesslins

*) In der *Onom.* hist. nat. l. c. ist dieser mit dem folgenden No. 7. *Chrysostigma* verwechselt, und zu diesem, die vom *Linn.* zu dem *Chrysost.* gesetzte Beschreibung aus dessen Faun. Suec. ed. 1. No. 556. gesetzt, und zugleich *Petiv.* citirt worden; aber aus der in der Faun. Su. ed. 1. No. 557. befindlichen, und vom *Linné* selbst diesem B. *marian.* beygefügten Beschreibung, hat man p. 355. einen besondern gemacht, und den *aschfarbigten, graugelbglänzenden Stinkkäfer* genennet.

Füeßlins Verz, S. 17. No. 341. der *Goldpunkt.*
Schaeff. Elem. t. 31. f. 1. 2.
Fabric. S. E. p. 219. No. 18.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 125. *Cucujus* 1. Le *Richard à foſſettes.*

Aureus; *elytrorum* foſſulis quatuor impreſſis nitentibus.

de *Geer* Inſ. Tom. IV, pag. 129. No. 3. *Bupreſte à points dorés.*

B. fuſca; *elytris* ſingulis maculis tribus rubro-aureis impreſſis; *abdomine* ſubtus viridi-aureo; *margine* purpureo nitido.

8. *Ruſtica*, der *Bauer.*

Müller l. c. S. 337. No. 8.
Füeßlins Verz. S. 17. No. 342.
Lepechins Tageb. I. S. 232. der *Baurenſtinkkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 2. f. 1.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. pag. 354. der *grüne Stinkkäfer.*
Act. Vpſal. 1736. pag. 19. No. 4. *Cicindela* aenea; *elytris* ſtriatis.
Fabric. S. E. p. 221. No. 28.
Elytris emarginatis, ſtriatis, obſcure aeneis.
Poda Muſ. graec. p. 43. *Bupr.* 1.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 126. *Cucujus* 3. t. 2. f. 2. Le *Richard doré à ſtries.*

Viridi-auratus, oblongus; *thorace* punctato; *elytris* ſtriatis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 130. No. 4. t. 4. f. 10. *Bupreſte azuré.*

B. *(violacea)*, viridi-aenea, ſeu coeruleo-nitida; *elytris* ſtriatis.

III. ELYTRIS INTEGRIS.

Mit Deckschilden, deren Rand rings umher glatt ist.

9. *Austriaca*, der *oesterreichische Prachtkäfer.**)

Müller l. c. S. 337. No. 9. der *Oesterreicher.*
Fabric. S. E. p. 221. No. 26.
Elytris integris, sulcatis, aeneis, *capite thoraceque* viridibus.
Scop. Ent. carn. No. 187. MORDELLA *gigantea.*

10. *Aurulentus*, der *karolinische Goldrand.***)

Müller l. c. S. 337. No. 10. der *Goldrand.*

11. *Tenebrionis*, der *schwarze mehlkäferähnliche Prachtkäfer.*

Müller l. c. S. 338. No. 11. der *Schwarze.*
Sulzers Gesch. S. 57. t. 6. f. 16. der *Schwarze.*
Fabric. S. E. p. 221. No. 29.
Atra, *elytris* integris, truncatis; *thorace* variolosо, dilatato.

12. *Fasciculatis*, der *kapensische Bürstenschild.*

Müller l. c. S. 338. No. 12. t. 7. f. 2. der *Bürstenschild.*
Fabric. S. E. p. 220. No. 24.

13. *Hirta*, der *kapensische Rauhrücken.*†)

Müller l. c. S. 338. No. 13. der *Rauhrücken.*
Fabric. S. E. p. 221. No. 25.

14. *Rubi*,

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

14. *Rubi*, der *Brombeer-Prachtkäfer.**)
Müller l. c. S. 339. No. 14.
Fabric. S. E. p. 221. No. 30.

15. *Nitidula*, der *Glanzschild.*
Müller l. c. S. 339. No. 15.
Füeßlins Verz. S. 17. No. 343.
Schaeff. Icon. t. 50. f. 7.
Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 180.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 526.

16. *Bimaculata*, der *ostindianische Doppelspiegel.*
Müller l. c. S. 339. No. 16. t. 7. f. 3. der *Doppelspiegel.*
Sulzers Gesch. S. 57. t. 6. f. 15. das *Männchen* zu B. *ignita* No. 3.
Fabric. S. E. p. 222. No. 31.

17. *9-maculata*, der *afrikanische Neunfleck.*
Müller l. c. S. 339. No. 17. der *Gelbfleck.*
Sulzers Gesch. S. 57. t. 6. f. 17. *Gelbfleck.*
Fabric. S. E. p. 223. No. 44.
Elytris integerrimis, nigris; *maculis* tribus flavis.

18. *Tristis*, der *indianische Prachtkäfer, mit zehnpunktirtem Bauche.***)
Müller l. c. S. 340. No. 18. der *Schmutzschild.*
Fabric. S. E. p. 222. No. 32.

19. *Aenea*, der *kupferfarbige Prachtkäfer mit grübigen narbigen Punkten auf den Flügeldecken.*†)
Müller l. c. S. 340. No. 19. das *Messingschild.*

20. *Cuprea*,

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

20. *Cuprea*, der *indianische kupferfarbige Prachtkäfer.**)

Müller l. c. S. 340. No. 20. das *Kupferschild.*
Fabric. S. E. p. 222. No. 33.
Scop. Entom. carn. No. 191. MORDELLA *cuprea.*
Pod. Mus. graec. p. 43.

21. *Nobilis*, der *indianische Edelmann.***)

Müller l. c. S. 340. No. 21. der *Junker.*
Fabric. S. E. p. 222. No. 34.

22. *4-punctata*, der *Vierpunkt.*†)

Müller l. c. S. 340. No. 22. der *Bruſtpunkt.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 344. *Bruſtpunkt.*
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 356. der *ſchwarzbraune Stinkkäfer.*
Fabric. S. E. p. 222. No. 35.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 527.
Atra; *thorace* punctis quatuor transverſim impreſſis.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 134. No. 8. *Buprefte à points enfoncés.*
B. ſubviridi-nigra; *thorace* punctis quatuor impreſſis.

23. *Minuta*, der *kleine erzfarbige Glattſchild.*††)

Müller l. c. S. 341. No. 23. das *Miniaturſchild.*
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 528.
Minuta? nigro-aenea; *thorace* ſubtrilobo; *elytris* faſciis vndulatis, villoſo-argenteis.

24. *Minuta*,

*) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

24. *Minuta (ovato-nigra)*; der *kleine schwarze Eyförmige.**)

Müller l. c. S. 341. No. 24. *Contractilis*, das *Ey.*

25. *Viridis*, der *grüne Birkenprachtkäfer.*

Müller l. c. S. 341. No. 25. der *grüne Birkennager.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 345. der *Grünling.*
Schaeff. Icon. t. 67. f. 9.
Fabric. S. E. p. 223. No. 39.
Müllerí Faun. Fridr. p. 18. No. 181.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 529.
Aeneo-virescens; *elytris* linearibus, *corpore* elongato.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 127. *Cucujus* 5. Le *Richard vert allongé.*
Viridi-cupreus, laevis oblongus.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 133. No. 6. t. 5. f. 1. *Buprefte verd allongé.*
B. viridis nitida; *corpore* elongato; *elytris* linearibus scabris integerrimis.

26. *Atra*, der *Schreberſche schwarze Prachtkäfer.***)

Müller l. c. S. 341. No. 26. der *schwarze Birkennager.*
Fabric. S. E. p. 223. No. 40.

27. *Festiva*, der *afrikanische Staatsprachtkäfer.*†)

Müller l c. S. 342. No. 27. die *Braut.*
Fabric. S. E. p. 223. No. 41.

28. *Linea-*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

28. *Linearis*, der *sehr schmale amerikanische Prachtkäfer.*

Müller l. c. S. 342. No. 28. die *Parallele.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 137. *exot.* No. 3. t. 17. f. 26. *Bupreste noir allongé.*

B. lineari-oblonga, nigro-aenea, cinereo-maculata; *elytris* carinatis; *thorace* rugoso, postice trilobo.

29. *Granularis*, das *Körnchen.**)

Müller l. c. S. 342. No. 29. das *Kleinkorn.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 356. der *dunkelkupferfarbige Stinkkäfer.*

Unabgebildete Prachtkäfer.

II. Klasse.

1. No. 4. *Stricta.*

III. Klasse.

1. No. 9. *Austriaca.*
2. No. 10. *Aurulentus.*
3. No. 13. *Hirta.*
4. No. 14. *Rubi.*
5. No. 18. *Tristis.*
6. No. 19. *Aenea.*
7. No. 20. *Cuprea.*
8. No. 21. *Nobilis.*
9. No. 22. *4-punctata.*
10. No. 23. *Minuta.*
11. No. 24. *Minuta* (ovato-nigra).
12. No. 26. *Atra.*
13. No. 27. *Festiva.*
14. No. 29. *Granularis.*

*) *Nicht abgebildet.*

NEUE PRACHTKAEFERARTEN.

I. *Mit hinten zugespitzten Flügeldecken.*

1. *Manca*, der *portugiesische halbverguldete Prachtkäfer.*

Linn. Add. p. 1067. No. 10. Aurata; *thoracis* lineis duabus *elytrisque* fuscis.

Müllers Suppl. B. S. 247. 2. a. *Aurata*, der *Goldbauch.*

2. *Vnidentata*, der *Bankische Einzahn.*

Fabric. S. E. p. 216. No. 1.

Elytris vnidentatis aeneis; *margine* aureo.

3. *Vittata*, die *indianische Goldbinde.*

Fabric. S. E. p. 216. No. 3.

Elytris bidentatis, punctatis; *lineis* elevatis quatuor, viridi-aeneis, *vitta* lata, *aurea.*

4. *Fastuosa*, die *amerikanische Goldnaht.*

Fabric. S. E. p. 216. No. 4.

Elytris truncatis, bidentatis, variolosis, viridibus; *sutura aurea.*

5. *Punctatissima*, der *afrikanische Vielpunkt.*

Fabric. S. E. p. 217. No. 5.

Elytris bidentatis, cupreis; *punctis* violaceis *numerosis.*

6. *Decora*, der *americanische zierliche Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 217. No. 6.

Elytris truncatis, bidentatis, viridibus; *vitta* coerulescente; *marginibusque* aureis.

7. *Lurida*, der *amerikanische Schwarzgelbe.*

Fabric. S. E. p. 217. No. 7.
Elytris bidentatis, obscura; *ano* tridentato.

8. *Striata*, der *pensylvanische gestrichte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 217. No. 8.
Elytris truncatis, subbidentatis, cupreis; *lineis* elevatis quatuor.

9. *Lineata*, der *amerikanische lineirte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 217. No. 10.
Elytris truncatis, subtridentatis, nigro-aeneis; *vittis* duabus ferrugineis.

10. *Ocellata*, der *indianische Augenspiegel.*

Fabric. S. E. p. 218. No. 11.
Viridi-nitens; *elytris* tridentatis; *maculis* duabus aureis, *ocellarique* flava.

11. *Bicolor*, der *amerikanische Zweyfarbige.*

Fabric. S. E. App. p. 825. 1-2.
Elytris acuminatis, viridi-aeneis; *maculis* flava; *pectore abdomineque* flavis.

12. *Varicornis*, das *Scheckhorn.*

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 59. No. 530.
Nigricans, villosus; *thorace* vtrinque lobato; *elytris acutis.*

13. *Acuminata*, der *Spitzflügel.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 133. No. 7. *Buprefte à etuis pointus.*

B. *(acuminata)* nigris; *elytris* punctatis pone acuminatis; *thorace* laevi.

II. *Mit Deckschilden, die an der Spitze gezähnelt sind.*

1. *Depressus*, der *americanische Plattschild.*

Linn. Mant. p. 533.

Elytris subserratis, aeneo-ferrugineis, nervoso-punctatis; *thorace depresso.*

Sloan hist. p. 206. t. 237. f. 9.

Scarabaeus minor e viridi nigricans, alarum vaginis striatis.

Müllers Suppl. B. S. 247. 8. a. der *gedruckte Stinkkäfer.*

2. *Splendida, Schröters surinamischer Prachtkäfer.*

Schröters Abhandl. über verschiedene Gegenst. der N. G. I. p. 335. t. 2. f. 3.

Subtus totus aureo-viridis; *elytris* castaneis fusco-testaceis, nitidis, apice subserratis. Pedum femora nitide-coerulea, crura tarsique testacea.

3. *Depressa*, der *morgenländische Forskählische platte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 219. No. 14.

Elytris serratis, sulcatis, *corpore depresso*, obscuro.

4. *Farinosa*, der *neuholländische bestäubte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 219. No. 16.

Elytris serratis, viridibus, sulco abbreviato suturali impresso; *corpus* aeneum, *polline ferrugineo* adspersum.

5. *Porcata*, der *Forskählische morgenländische gefurchte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 219. No. 17.
Elytris serratis, *porcatis; thorace* angulato; *corpore* fusco, nitido.

6. *Impressa*, der *indianische Dreypunkt.*
Fabric. S. E. p. 220. N. 19.
Elytris serratis aeneis; *punctis tribus impressis.*

7. *Ornata*, der *pensilvanische Weißfleck.*
Fabric. S. E. p. 220. No. 20.
Elytris serratis, obscuris, *albo maculatis.*

8. *Cylindrica*, der *Forskählische morgenländische Walzenprachtkäfer.*
Fabric. S. E. p. 220. No. 21.
Elytris serratis, striatis; *corpore cylindrico*, nigro.

9. *Variegata*, der *russische schwarz- und weißgescheckte Prachtkäfer.*
Lepechins Tageb. I. p. 232. t. 17. f. 7.
Atra; *thorace* albo- et nigro *variegata.*

10. *Serraticornis*, das *Sägehorn.*
Scop. Entom. carn. No. 189. MORTELLA *serraticornis;* tota punctata, supra punctis prominulis; *corpore* cylindraceo colore metallico; *elytris* apice serrulatis.

11. *Cupreo-maculatus*, der *Drurysche virginische Kupferfleck.*
Drury Inf. Tom. I. p. 66. t. 30. f. 3.
Thorace lato, fusco-cupreo punctato; *elytris* serratis atris, *cupreo-maculatis*, sutura metallica.

12. *Flavo-*

12. *Flavo-punctata*, der *Gelbpunkt.*

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 129. No. 2. *Bupreſte à taches jaunes.*

Nigra; *thorace* margine flavo; *elytris* punctis abdomineque ſubtus maculis flavis quadruplici ordine.

III. *Mit Deckſchilden, deren Rand rings herum glatt iſt.*

1. *Scabra*, der *indianiſche hökrichte Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 220. No. 22.

Elytris integris; *fronte* ſulcato; corpore *ſcabro*, aureo.

2. *Splendens*, der *chineſiſche Goldrand.*

Fabric. S. E. p. 221. No. 27.

Elytris integris, viridibus; *margine omni aureo*, lineisque tribus elevatis.

3. *Cruciata*, der *neuholländiſche Prachtkäfer mit dem ſchwarzen Kreuz.*

Fabric. S. E. p. 222. No. 36.

Elytris integerrimis, aureis, *punctis* duobus, *cruceque* poſtica nigris.

4. *Biſtriata*, der *pariſiſche Zweyſtrich.*

Fabric. S. E. p. 222. No. 37.

Elytris integris, obſcuris; *thorace* aureo; ſtriis duabus nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 127. *Cucujus* 4. t. 2. f. 3. Le *Richard rubis.*

Cucujus aeneus; *elytris* fuſcis, *thorace* rubro; *faſciis* fulcis.

5. *Laeta*, der *hallische hellgrüne Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 223. No. 42.

Elytris integris, linearibus, viridibus; *capite thoraceque* aureis.

6. *Cyanea*, der *hallische hellblaue Prachtkäfer.*

Fabric. S. E. p. 223. No. 43.

Elytris integerrimis, rugosis; *corpore cyaneo.*

7. *Fuliginosa*, der *englische rostfarbige haarichte Prachtkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. 1. p. 51. No. 51.

Elytris integerrimis, sublinearibus, glabris, pilosis; *thorace* deflexo; *corpore fuliginoso.*

8. *Marginata*, der *dänische Gelbrand.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 182.

Elytris integerrimis nigris; *margine* flavo.

9. *Nigra*, der *dänische Mohr.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 18. No. 183.

Thorace elytrisque nigris; *abdomine* subtus tomentoso-albo.

10. *Rosacea*, der *Skopolische Blumenprachtkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 190. MORDELLA *rosacea*; *thorax* pone marginatus; *elytra* marginata, apice rotundata. *Abdomen* supra aeneo-fuscum.

11. *Hungarica*, der *ungarische Prachtkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 85.

Mordella viridissima, subtus, fronte et *thoracis* lateribus aurato-rubris.

12. *Nebu-*

12. *Nebulosa*, der *neblichte ungarische Prachtkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 104. No. 86.

Supra nigra; *subtus* albicans; *elytra* albidis tenuissimis striis et punctulis nebulosa.

13. *Pygmaea*, der *surinamische Zwerg.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 137. *exot.* No. 4. t. 17. f. 27. *Bupreste nain.*

Nigra, nitida; *elytris* coeruleo-violaceis nitidissimis.

14. *Variolaris*, der *inderienfische Warzenschild.*

Pallas Reis. I. *Ausz.* App. No. 9.

Totus nigro-aeneus; *thorax* scaberrimus.

Müllers S. B. S. 248. t. 30. a. der *Warzenstinker.*

15. *Tatarica*, der *tatarische Prachtkäfer.*

Pallas Reis. I. *Ausz.* App. No. 10.

Magnitudo BVPR. *marianae*, sed brevior, crassior et obtusior congeneribus omnibus. *Subtus* aeneus; *supra* nigrior.

Müllers S. B. S. 248. t. 31. der *tatarische Stinkkäfer.*

16. *Aurata*, der *Goldrücken.*

Pallas Reis. II. App. No. 45.

Magnitudo B. *ignitae*, sed latior. *Corpus* viridi auratum, nitidissimum. *Elytra* obtusa, integerrima, decem striata, cupreo-viridula.

Müllers S. B. S. 249. t. 32. der *Goldrücken.*

17. *Picta*, der *gemahlte Prachtkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 46.

B. *octoguttatae* subaequalis, sed latior. *Corpus atque thorax* nitidula, aenea. *Elytra* violaceo-nigra, *maculis* symmetricis flavescentibus picta.

Müllers S. B. S. 249. t. 33. das *Mahlerschild.*

212. GESCHLECHT. Dytiscus; *Wasserkäfer; Tauchkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 343. *Wasserkäfer; holl.* Water-Torren.

Von andern *Hydrophili; Dytici; Gyrini.*

Eberhards Thiergesch. S. 193. *Dyticus; Schwimmkäfer.* S. 195. *Hydrophilus, Wasserkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. gen. 20. der *Wasserkäfer, Dytiscus.*

Hanovs Seltenh. der N. I. S. 646. von den *Wasserkäfern.* p. 352.

Derhams phys. Theol. S. 591.

Lessers Theol. der Ins. S. 70. o. *Wasserkäfer;* Hydrocanthari.

Wochenblatt für Kinder. VI. p. 16.

Pontopp. N. G. v. D. pag. 209. gen. 16. *Dytiscus; Vand-Kalve; Wasserkäfer.*

Börners

*) Von diesem Geschlecht giebt es vielerley Arten, darunter der Herr Staatsr. *Müller* Zool. Dan. Prodr. p. 69. sq. sehr viele *neue* entdecket hat. Ihre Naturgeschichte ist bekannt. Wir wollen nur dreyerley bemerken:

1. Das *Falsche:* dass die *Larven* dieser Käfer die *Füße auf dem Rücken* haben sollen (*Onomat.* hist. nat. pag. 671. *Börners* Samml. I. pag. 476.), welches aber *Lyon.* fur Lesser Tom. II. p. 54 55. gründlich widerlegt hat. S. *Neue berlin. Mannichf.* 4. Jahrg. 166. Woche p. 145.

2. Das *Zweifelhafte:* ob nur die *Männchen* an den Vorderfüsen die *Kniescheiben* mit den Kläbebläschen zum Ansaugen auf dem glatten Rücken des Weibchens haben, da der Herr Staatsrath *Müller* viele Männchen auch *ohne dieselben* gefunden hat. S. *Naturforscher* 7. St. p. 99. Zool. Dan. Prodr. p. 70. 71.

3. Das *Besondere* in der Struktur ihrer *Kniescheiben:* Neue berlin. Mannigf. 1. Jahrg. S. 81. ff. und *Gespinnste*, oder Verwandlungshülsen. S. *Lyonet* fur Lesser Tom. I. p. 300. *Neue berlin. Mannigf.* 3. Jahrg. p. 729.

Börners Samml. I. S. 476. *Wasserkäfer; Dytiscus.*
Frisch Ins. II. S. 26. ff.
Füeßlins Verzeichn. schweiz. Ins. S. 17. *Dytiscus; Tauchkäfer.*
Sulzers Kennz. S. 72. *Wasserkäfer.*
— — Gesch. S. 58. *Tauchkäfer.*
Olaffs Reise d. Isl. I. p. 319. d. *Brunkluka; Dytiscus.*
Bresl. Samml. ann. 1719. Novemb. Cl. IV. Art. IX. p. 593. *Wasser-* oder *Fischkäfer.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 668. *Dytiscus; Hydrocantharus; Scarabaeus aquaticus; Wasserkäfer.*
Catholicon D. p. 416. *Dytiscus; Wasserkäfer.*
Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. V. p. 607.
Fabric. S. E. p. 228. *Hydrophilus.* p. 230. *Dytiscus.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 215.
Scop. Entom. carn. p. 96.
Müllers Faun. Fridr. p. 18.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. seq. *Hydrophilus; Dytiscus.*
Swammerd. B. d. N. p. 120. 136. *Hydrocanthari.*
Ionst. hist. Ins. p. 100. *Hydrocanthari; Scarabaei aquatici.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 180. *Hydrophilus. L'Hydrophile.* p. 185. *Dyticus;* le *Ditique.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. préf. VIII. No. 51. 52. p. 365. des *Hydrophiles.* p. 381. des *Ditisques.*
Brünnichii Entom. p. 56. Dan. *Vandkalv.*

I. *Mit durchblätterten Fühlhörnern.*

1. *Piceus*, der *große schwarze Tauchkäfer.**)

Müller loc. cit. S. 344. No. 1. t. 7. f. 4. der *große Schwimmer.*

*) Wenn man diese Käfer in etwas tiefe mit Wasser gefüllte Gefäse setzt, und ihnen Mehl giebt, kann man sie lange erhalten.

Sobald

Füeßlins Verz. S. 17. No. 346. der *Pechschwarze.*
Frisch Ins. 2. Th. S. 26. t. 6. der *große ganz schwarze Wasserkäfer.*
Sulzers Gesch. S. 58. t. 6. f. 18. der *große Schwimmer.*
Schaeff. Elem. t. 71. *Hydrophilus.*
— — Icon. t. 33. f. 1. 2.
Lyonet Notes sur la Theol. des Ins. de Lesser. T. I. p. 158. t. 12. 13. 15. Tom. II. p. 55. 56. 57.
Neue berlin. Mannigf. 3. Jahrgang. S. 129. 4. Jahrg. p. 145. ff.
Onomat. hist. nat. P. 3. pag. 699. der *große ganz schwarze Wasserkäfer.*
Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 549.
Petiv. Gazoph. t. 74. f. 11. *Hydrocantharus* maximus striatus.
Fabric. S. E. p. 228. *Hydroph.* 1.
Niger; *sterno* canaliculato, postice spinoso.
Müllери Faun. Fridr. p. 19. No. 184.
Antennis perfoliatis; *corpore* piceo laevi acuminato.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. No. 653. HYDROPHILVS *piceus.*
Niger; *antennis* fuscis. *Store-Vand-Torbist.*
Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 182. *Hydroph.* 1. t. 3. f. 1. Le *grand Hydrophile.*
Niger; *elytris* sulcatis; *antennis* fuscis.
de *Geer* Ins. T. IV. p. 371. *Hydroph.* 1. t. 14 f. 1. 2. *Hydrophile à antennes rousses.*
HYDROPHILVS *(ruficornis)*, niger, *capitulo antennarum* rufo; *elytris* laevibus; *abdomine* postice acuminato.

2. *Cara-*

Sobald es Abend wird, fliegen sie heraus, und geben im Fluge einen so tiefen Ton, dass man glaubt, in der Ferne ein Orgelwerk zu hören.

2. *Caraboïdes*, der *laufkäferartige Wasserkäfer.*

Müller l. c. S. 346. No. 2. der *kleine Schwimmer.*
Füeßlins Verz. S. 17. No. 347. der *Laufkäferartige.*
Frisch Ins. 13. Th. pag. 24. No. 25. 3. Pl. t. 21. der *glänzende schwarze Wasserkäfer der mittlern Größe.*
Röfels Insektenbel. II. B. Wasserins. 1. Kl. S. 25. t. 4. f. 1. 2. der *schwarze Wasserkäfer von mittlerer Größe.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 678. der *schwarze Wasserkäfer mit einer runderhabenen Oberfläche.*
Schaeff. Icon. t. 53. f. 10.
Fabric. S. E. p. 228. *Hydrophilus* 2.
Niger, nitidus; *elytris* substriatis.
Raj. Ins. 95. No. 7. *Hydrocantharis* aquaticus, niger, subrotundus.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 183. *Hydroph.* 2. *L'Hydrophile noir picoté.*
Niger; *elytrorum* punctis per strias digestis; *antennis* nigris.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 376. *Hydroph.* 2. *Hydrophile à antennes noires.*
H. *(Nigricornis)* niger; *capitulo antennarum* nigro; *elytris* laevibus; *abdomine* postice rotundato.
Müller Faun. Fridr. p. 19. No. 185.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 68. *Hydroph.* No. 654.
Niger, nitidus; *antennarum* caule luteo.

3. *Scarabaeoïdes*, der *kolbenkäferartige Wasserkäfer.**)

Müller l. c. S. 346. No. 3. der *Segler.*

Füeßlins

*) Bey uns selten, sagt *Füeßlin;* also hat er ihn nicht als eine Varietät des vorigen angesehen. Mithin kann es auch nicht noch einmal eben derselbe *Röfelsche* seyn, den *Linné* bey diesem und dem vorigen angeführet hat.

Nicht abgebildet.

Füeßlins Verz. S. 18. No. 348. der *Kolbenkäferartige.*
Fabric. S. E. p. 228. *Hydroph.* 4.
Niger; *elytris* striatis; *pedibus* piceis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 85. No. 26. Le *Scarabé noir des marais.*

SCARABAEVS *piceus.*

4. *Fuscipes*, der *Braunfuß.*

Müller l. c. p. 346. No. 4. der *Taucher.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 688. der *Wasserkäfer mit dunkeln Füßen.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 655. *Hydroph.*
Variat totus niger, palpis et tarsis fuscis.
Schaeff. Icon. t. 8. f. 10.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 184. *Hydroph.* 4. *L'Hydrophile noir strié.*
Niger; *elytris* striatis; *pedibus* fuscis.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 377. *Hydroph.* 3. *Hydrophile à pattes brunes.*
Niger; *capitulo antennarum* nigro; *elytris* striatis; *pedibus* fusco-castaneis.

5. *Luridus*, der *grüngelbe Tauchkäfer.*

Müller l. c. S. 347. No. 5. die *Nymphe.*
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 656.
HYDROPHILVS *lividus; capite* aeneo; *thorace* vtrinque flavo; *elytris* striatim punctatis; maculis, *abdomineque* nigris.
Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 52. No. 52.
DYTISCVS *lividus; antennis* perfoliatis; capite, thorace, elytris et pedibus *lividis;* ventre nigro.
Fabric. S. E. p. 229. *Hydrophilus* 7.
Elytris striatis; *corpore* cinereo-fusco.

Geoffr.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 184. *Hydroph.* 5. *L'Hydrophile fauve.**)

Hydrophilus fulvus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 378. *Hydroph.* 4. t. 15. f. 1. 2. *Hydrophile brun.*

HYDROPHILVS *fuscus*; corpore convexo *supra* fusco, *subtus* nigro; *capitulo antennarum* oblongo; *elytris* striatis.

II. *Mit borstenförmigen Fühlhörnern.*

6. *Latissimus*, der *breiteste Wasserkäfer.*

Müller l. c. S. 347. No. 6. der *Breitflügel.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 350. der *Breitschild.*

Frisch Inf. II. p. 33. No. 8. t. 7. f. 1. 2. der *große schwarze Wasserkäfer mit dem gelben Saum.*

Sulzers Gesch. S. 59. t. 6. f. 19. der *Breitflügel.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 689. der *große Wasserkäfer mit dem gelben Saum.*

Act. Upsal. 1736. p. 14. No. 1. *Dytiscus* maximus; *elytris* margine prominentibus.

Fabric. S. E. p. 230. *Dytiscus* 1.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 661. DYTICVS *latissimus* niger, *marginibus* luteis; *elytris* dilatatis, glabris.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 390. *Dytiscus* 1. *Grand Ditisque large.*

D. Nigro-fuscus; *thorace* margine flavo; *elytrorum* marginibus dilatatis, linea transversa flava.

7. *Marginalis*, der *Gelbsaum.*

Müller l. c. S. 347. No. 7. t. 7. f. 5. 6. 7. der *Gelbsaum.*

Füeßlins

*) Dies ist *Müllers Obscurus* v. Zool. Dan. Prodr. No. 657. S. unter den *neuen* 1. Kl. No. 9.

Füeßlins Verz. S. 18. No. 351. a. der *Gelbsaum.* (das *Männchen des Semistr.*)

Derhams Phys. Theol. 8. B. 4. K. p. 915. No. 2.

Lessers Theol. der Ins. S. 273.

Neue berlin. Mannigf. 1. Jahrg. S. 81. ff. *) f. 1. 2. 3.

Rösels Insektenbel. II. Wasserins. 1. Kl. pag. 1. t. 1. f. 9. 11. der *Wasserwurm mit dem großen linsenförmigen Kopf, und desselben wunderbare Verwandlung zum Wasserkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 691. der *schwarze Wasserkäfer mit einem gelben Brustschild und Flügeldekkenrand.*

Schaeff. Icon. t. 8. f. 8.

Raj. Ins. p. 93. No. 1. *Hydrocantharus* nostras.

Fabric. S. E. p. 230. *Dytiscus* 3.

Niger; *thoracis* marginibus omnibus; *elytrorumque* exteriori flavis.

Scop. Entom. carn. No. 294. **)

Fuscus, seticornis; *thorace* luteo margine cincto; *elytris* margine exteriore flavis.

Poda Mus. graec. p. 43.

Müllleri Faun. Fridr. p. 19. No. 186.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 663. †)

Flavicans; supra nigro-virescens, marginibus *thoracis* omnibus, *elytrorumque* extimis flavis.

Geoffr.

*) Am angezogenen Orte ist aus Versehen D. *latissimus* gesetzt worden. Eigentlich aber ist es dieser *marginalis*, dessen Kniescheibe daselbst beschrieben ist.

**) Der R. *Skopoli*, wie auch der Staatsrath *Müller* haben ihn am richtigsten beschrieben. Denn das Niger ohne Einschränkung passt gar nicht.

†) Letzterer sagt: Hujus invidua *patellis* pedum primorum *destituta et instructa* invenio; hinc D. *semistriatus*, quod volunt auctores, *vix femina marginalis* est.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 186. *Dyticus* 2. Le *Ditique noir à bordure.*

Niger, margine *coleoptrorum; thoracisque* flavo.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 391. *Dyt.* 2. t. 16. f. 2. *Mas* · *Grand Ditisque à bordure complette.**)

D. *(toto*

*) Die *Patellen* oder *Kniescheiben* der Männchen hat der Herr *de Geer* so wenig, als der sel. *Rösel* recht genau beobachtet; sonst würden ihnen die artigen gestielten birnförmigen Körperchen in der Höhlung des Schüsselchens nimmermehr verborgen geblieben seyn. Denn die sind es eben, die an ihren Stielen durch einen gleichen Druck niedergedrückt werden, und insgesamt mit ihren Bläschen oben eine gerade Fläche, wie ein nasses Leder, formiren, wodurch das Ansaugen an dem glatten Rücken des Weibchens, an den Fischen, und an andern Körpern im Wasser, ungemein befördert wird. S. *Kleemanns* Anm. zur neuen Ausgabe des *Rösels* bey der Beschreibung dieses Käfers. S. 8.

Noch eine *besondere Merkwürdigkeit* an diesen Käfern. Das *zweyte Gelenke* am zweyten Paar Füse von Fusblatt an gerechnet, ist ebenfalls inwendig flachhohl, und mit unzähligen *Klebebläschen* angefüllt, die aber eine ganz andere Struktur, als die ersteren haben. Eine Bemerkung, die ich dem genauen Beobachter, dem Herrn Leibarzt *Wagler* zu Braunschweig zu danken habe. Sie finden sich auch nur bey dem *Männchen.*

Beyde Organen verdienen eine nochmalige genauere Untersuchung und Abbildung. Man mus aber dazu keine aufgetrocknete, sondern im Weingeist conservirte Käfer nehmen, oder am besten lebendige, die leicht zu haben sind. Denn bey diesen zeigt sichs offenbar, dass die beyden strahlenförmigen Sonnen oder Muskeln, wie man sie nennen will, bey dem Anfange der Knieschneibe nicht rundlicht erhaben, sondern *wahre vertiefte hohle Schüsselchen* sind. Durch die Lupe erscheinen die gestielten Kolben als vertiefte hohle Punkte, welches *Röseln* betrogen hat. Schon die schwächste Linse des *Kompositi* zeigt ihre wahre Gestalt.

D. *(toto marginalis)*, nigro-fuscus nitidus; *thorace* vndique *elytrorumque* margine flavis; *elytris feminae (semistr.)* sulcatis.

8. *Semistriatus*, der *halbgestreifte Wasserkäfer.*

Müller l. c. S. 347. No. 8. der *Halbstrich.*
Füeßlins Verz. S. 18. No. 352. b.*)
Röfels II. B. Wasserinf. 1. Kl. t. 1. f. 10.
Frisch Inf. II. p. 35. t. 7. f. 4.**)
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 704. der *halbgestreifte Wasserkäfer.*
Schaeff. Icon. t. 8. f. 7.
Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 188.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 665.†)

Flavi-

*) Unstreitig, sagt Herr F. das *Weibchen* des *marginalis*, indem ich sie fast immer mit einander gepaart gefunden.

**) Obgleich *Linné*, *Füeßlin* und *Fabric.* hierbey obiges Citatum des *Frisch* angeführet haben; so hat doch der Herr Staatsrath *Müller* daraus eine eigene Art gemacht. S. Zool. Dan. Prodr. No. 666. D. *semisulcatus.* S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 21.

†) Von *diesem* sowohl, als dem *semisulcato* heisst es daselbst: pedes primores *absque patellis* reperi.

Ein *Semistriatus* hatte in meinem Kasten über drey Jahr gesteckt. Im Jänner dieses Jahrs bey ziemlicher Kälte sahe ich einmal nach, und fand hin und wieder Staubhäufchen unter einigen Mistkäfern und Silphen, welches gemeiniglich eine Anzeige ist, dass ein Dermestes oder Ptinus darinn logirt. Bey genauerer Nachsicht fand ich, dass dieser Semistr. ganz weiss, wie mit Schimmel, überzogen war, und die Staubhäufchen von ihm herrührten. Unter der Lupe regten sich die letztern, und bestanden aus einem Gewühle von *Acaris Dysent.* Linn. womit auch der ganze Käfer bedeckt war. Also *eine neue Art von Insektenfeinden der Kabinete.* Diese Milben sollen auch sehr gut skeletiren.

Flavicans; supra niger; marginibus *thoracis* omnibus; *elytrorumque* extimo flavis; sulcis *(striis)* viginti dimidiatis.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 5.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 187. *Dit.* 3. t. 3. f. 2. Le *Ditique demi-sillonè.*

Elytris striis viginti dimidiatis.

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 391. *Dyt.* 2. t. 16. f. 1. *Femina.*

9. *Striatus*, der *Queerstrich.*

Müller l. c. S. 348. No. 9.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 7.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 773.

Ater; *elytris* gilvis, transversim striatis; *margine* flavo.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 399. *Dyt.* 5. t. 15. f. 16. *Ditisque à stries transverses.*

D. *(transverse striatus) supra* nigro-fuscus, *subtus* niger; *elytris* transverse subtilissime striatis.

10. *Fuscus*, der *Braune.**)

Müller l. c. S. 348. No. 10. die *Brunette.*

11. *Cinereus*, der *Aschgraue.*

Müller l. c. S. 348. No. 11. t. 7. f. 8. 9. der *Gelbfleck.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 352. a. (das *Männchen* von D. *sulcatus* No. 13.)

Röfels II. B. Wasserinf. 1. Kl. p. 17. t. 3. f. 6. 8. der *kleinere Wasserwurm mit dem langen Hals, und seine Verwandlung zum Wasserkäfer.* (das *Männchen.*)

Onomat.

*) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 683. der *aschgraue Wasserkäfer mit einem gelben Flügeldeckenrand, und einem gelben Queerfleck auf dem Brustschild.*

Schaeff. Icon. t. 90. f. 7. *Mas.*

Act. Nidr. IV. 25. t. 16 f. 11.

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 9.

Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 187.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 667.

Nigricans; *thoracis* medio; margineque omni; *elytrorumque* extimo flavis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 188. *Dit.* 4. Le *Ditique à corcelet à bandes.*

Cinereus; margine coleoptrorum flavo; *thoracis* medietate flava.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 397. *Dit.* 4. *Ditisque à corcelet à bandes.*

D. *(fasciatus); elytris* fuscis; *thorace* fulvo: *fasciis* duabus transversis nigris latere connatis; *abdomine* subtus fulvo lineis nigris.

12. *Stictícus*, der *afrikanische punktirte Wasserkäfer.**)

Müller l. c. S. 348. No. 12. das *Merkmal.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus* 10.

13. *Sulcatus*, der *gefurchte Wasserkäfer.*

Müller l. c. S. 348. No. 13. das *Rippenschild.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 352. b. (das *Weibchen* von No. 11. *cinereus.*)

Frisch Inf. XIII. p. 13. t. 7. eine *Mittelart gelbgesäumter Wasserkäfer.*

Röfels II. B. Wasserinf. 1. Kl. t. 3. f. 7. (das *Weibchen des cinerei.*

Onomat.

*) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 705. der *gefurchte Wasserkäfer.*

Schaeff. Elem. t. 59. *Schwimmkäfer.*

— — Icon. t. 3. f. 3. (Femina).

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 6.

Müllеri Faun. Fridr. p. 19. No. 189.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 667.*)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 189. *Dit.* 5. Le *Ditique sillonné.*

Elytris sulcis decem longitudinalibus; *thoracis* medietate flava.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 397. No. 4.

14. *Erythrocephalus*, der *Rothkopf.***)

Müller l. c. S. 349. No. 14.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 688. der *Wasserkäfer mit röthlichem Kopf und Füßen.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 18.

Ovato-oblongus; *capite pedibusque* rufis.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 776.

Niger; *capite pedibusque* rufis. *Variat* margine elytrorum exteriore rufo, ac *elytris* pubescentibus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 404. *Dit.* 12. *Ditisque à tête rousse.*

*) Der Staatsrath *Müller* sagt daselbst: der unsterbliche *Rösel* habe den Streit entschieden, dass No. 11. *cinereus* das *Männchen*, zu No. 13. *Sulcatus*, als dem Weibchen sey, und setzt hinzu: Quotquot ego *elytris glabris* vidi, *patellis* instruebantur, quos vero *elytris sulcatis*, absque *patellis* visi sunt. Ein neuer Beweis, dass doch mehrentheils die *Männchen* aller Arten mit diesen sonderbaren Organen an den Vorderfüßen versehen sind.

**) *Nicht abgebildet.*

15. *Maculatus*, der *Weißfleck.**)

Müller l. c. S. 349. No. 15.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 691. der *gefleckte Wasserkäfer.*

Gronov. Mus. 2. No. 554.

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 17.

Niger; *thorace* nigro; *fascia* pallida, *elytris* albo-nigroque variis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 192.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 775.

Flavicans; *capite thoraceque* postice; striis maculisque elytrorum nigris.

16. *Ferrugineus*, der *Roſtfarbige.***)

Müller l. c. S. 349. No. 16. der *Roſtbuckel.*
Füeßlins Verz. S. 18. No. 353. der *Roſtfarbene.*

17. *Bipustulatus*, die *Zweyblatter.*†)

Müller l. c. S. 349. No. 17. der *Punktnacken.*
Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus* 12.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 672.

Ater; *antennis* palpisque ferrugineis. *Variat* pedibus totis piceis, punctisque binis ferrugineis in capite juxta thoracem; haec pluribus communia sunt.

18. *Ovatus*, der *Eyrunde.*

Müller l. c. S. 350. No. 18. die *Rothbrust.*
Füeßlins Verz. S. 18. No. 354. der *Eyrunde.*
Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 22.

Caput et thorax picea, aut minus nigra. *Subtus* ferrugineus.

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 191. *Dyt.* 10. Le *Ditique ſphérique.* (alleg. *Müllero* et *de Geer.*)

Ovatus fuſcus; *capite thoraceque* rubicundis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 777.

DYTISCVS *groſſus*, ſubgloboſus, rufus; oculis nigris.*)

de *Geer* Inſ. T. IV. p. 402. *Dyt.* 9. t. 15. f. 17. 18. 19. *Ditisque ſphérique.*

DYTISCVS *(ſphaericus)* rufo-fuſcus, *corpore* ovato gibbo.

19. *Paluſtris*, der *Sumpfſchwimmkäfer.***)

Müller l. c. S. 350. No. 19. der *Sumpfpatſcher.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiſcus* 21.

Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 190.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 774.

20. *Vliginoſus*, der *Rußrücken.*†)

Müller l. c. S. 350. No. 20.

Füeßlins Verz. S. 18. No. 355.

Scop. Ent. carn. No. 296.

Caput rufum; *oculis* et macula lunata poſtica nigri coloris, cavitate caput ſpectante. *Elytrum* fuſcum, punctatum: *margine* exteriore ferrugineo. Nihilo major GYRINO *natatore.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiſcus* 15.

*) Hierbey frägt der Staatsr. M. An D. *ferrugineus*, *ovatus*, *minutus* Linn.? *Variat* elytris fuſcis, nitidis, ac rufis, opacis.

Bey dieſer Gelegenheit merke ich an, daſs in *Müllers* Prodr. von p. 70. nach No. 677. die folgenden Numern durch einen Druckfehler in ganz falſcher Ordnung fortgehen, wodurch ſich der Leſer im Nachſchlagen und Vergleichen nicht wolle irre machen laſſen.

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 19. No. 191.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 675.
Ater; antennis pedibus elytrorumque *margine extimo* flavo. *Variat* margine thoracis exteriore lutescente.

21. *Bimaculatus*, der *französische Zweyfleck.**)
Müller l. c. S. 350. No. 21. der *Deckfleck.*

22. *Granularis*, das *Kornschwimmerchen.***)
Müller l. c. S. 350. No. 22. das *Kornschild.*
Fabric. S. E. p. 234. *Dytiscus* 24.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 769.

23. *Minutus*, der *kleine Schwimmkäfer.*
Müller l. c. S. 351. No. 23. das *Punktschild.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 696. der *gar kleine Wasserkäfer.*
Fabric. S. E. p. 234. *Dytiscus* 26.
Flavescens; *elytris* fuscis; *margine* flavo, maculato.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 191. *Dyt.* 12. (alleg. *de Geer.*) Le *Ditique strié à corcelet jaune.*
Cinereus; *capite* nigro; *thorace* luteo; *elytris* nigro-maculatis, punctato-striatis.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 404. *Dyt.* 18. t. 16. f. 9. *Ditisque strié à corcelet roux.*
DYTISCVS *(ruficollis)* rufus; *elytris* striatis flavo-griseis, maculis nigris.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 787.
D. *Curculinus* flavicans; *thorace* punctato; *elytris* pallidis nigro-maculatis, striato-punctatis.

Unab-

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Unabgebildete Wasserkäfer.

I. Klasse.

1. No. 3. *Scarabaeoïdes.*

II. Klasse.

1. No. 10. *Fuscus.*
2. No. 12. *Stictícus.*
3. No. 14. *Erytrocephalus.*
4. No. 15. *Maculatus.*
5. No. 16. *Ferrugineus.*
6. No. 17. *Bipustulatus.*
7. No. 19. *Palustris.*
8. No. 20. *Vliginosus*
9. No. 21. *Bimaculatus.*
10. No. 22. *Granularis.*

NEUE WASSERKAEFERARTEN.

I. *Mit durchblätterten Fühlhörnern.*

1. *Lateralis*, der *amerikanische Gelbrand.*

Fabric. S. E. p. 228. *Hydroph.* 3.
Niger, nitidus; *thoracis elytrorumque* marginibus flavis.

2. *Orbicularis*, der *rundlichte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 229. *Hydroph.* 5.
Subrotundus; *corpore* glabro, atro.

3. *Collaris*, das *amerikanische Halsband.*

Fabric. S. E. p. 229. *Hydroph.* 6.
Niger, ore; *thoracis* lateribus lineisque *elytrorum* ferrugineis.

4. *Bipunctatus*, der *upsalische Zweypunkt.*

Fabric. S. E. p. 229. *Hydroph.* 9.

Thorace atro; *margine* griseo; *elytris* fuscis; *puncto* postico albido.

5. *Dermestoïdes*, der *speckkäferartige Wasserkäfer.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 53. No. 53. *Antennis* perfoliatis; haemisphaerico-ovatus, luridus, *capite thoraceque* nigris. Habitat in *Anglia* inter *Lemnam* in aquis stagnantibus.*)

6. *Rufus*, der *braunrothe Wasserkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 298.

Antennae clavatae. *Elytra* laevissima obscuriora; *margine* exteriore albido binis dentibus antice instructo.

7. *Pusillus*, das *Wasserhühnchen.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 658.

Hydrophilus, niger; *elytris* laevissimis; *antennis tarsisque* fuscis.

8. *Punctatus*, der *Geoffroische punktirte.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 184. *Hydroph.* 3. L'*Hydrophile lisse à points.*

Niger; *elytris* laevibus, dense punctatis..

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 659. HYDROPHILVS *Pilula.*

Ater, *supra* nitidus, dense punctatus.

9. *Obscu-*

*) *Diesen*, und Linn. D. *granularem*, et *minutum*, hab' ich in meinen Gegenden oft in meinen mit *Meerlinsen* gefüllten Gläsern gefunden. Ihre *Kunst zu schwimmen* ist bewundernswürdig. Gegen Abend geben sie einen besondern Ton von sich.

9. *Obscurus*, der *dunkelgrüngelbliche.*

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 657.

Hydrophilus; lividus, *abdomine* nigro; *elytris* nitidis, confertim punctatis.*)

II. *Mit borstenförmigen Fühlhörnern.*

1. *Roeselii*, *Röfels Tauchkäfer.*

Röfels Insektenbel. II. B. *Wasserins.* 1. Kl. S. 9. t. 2. der *Wasserwurm mit dem breiten Rückenstreif, ohne Schwanzspitzen, nebst dessen Verwandlung zum Wasserkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 349.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 673. der *oberhalb grüne, und unten ockergelbe Wasserkäfer.*

Müllери Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 664.

Virens; flavicans; *supra* obscure virens; *margine thoracis elytrorumque* extimo flavo.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 396. *Dyt.* 3. *Grand Ditisque à bordure laterale.*

DYTISCVS *(laterali-marginalis) supra* viridi-niger, *subtus* rufus; *capite* thoracis marginibus elytrisque flavo-marginatis.

Schaeff. Elem. t. 7.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 185. *Dyt.* 1. Le *Ditique brun à bordure.*

Fulcus; margine *coleptrorum thoracisque* flavo.

2. *Vndulatus*, der *wellenförmig gemahlte Wasserkäfer.*

*) Hierbey hat der Staatsr. M. des *Geoffr. Hydroph.* 5. pag. 184. Tom. I. angeführt, der vom *de Geer* bey *Linn.* D. *Luridus* No. 5. citirt ist.

Des *Müllers* HYDROPH.? *chrysomelinus* Prodr. No. 660. ist bey *Linn.* CHRYSOMELA *minuta* No. 50. beschrieben.

Franz von Paula *Schrank* Beyträge zur Naturgesch. S. 70. §. 18.

Antennis setaceis, niger; *elytris* ad basin fascia *undulata* abrupta ferruginea.

Fabric. S. E. p. 232. *Dyt.* 14. *Hermanni.* Gibbus; *elytris fascia undata* baseos ferruginea. In aquis stagnantibus *Alsatiae.*

3. *Sterno-muticus*, der *zeylonische schwarze Wasserkäfer mit einem abgestuztem Brustbein.*

Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 552.

D. niger; *thorace elytrorumque* margine flavo; *sterno* mutico.

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 699.

4. *Rubro-bimaculatus*, der *Gronovische zweyfach rothgefleckte Kopf.*

Gronov. Mus. 2. p. 164. No. 555.

Dytiscus niger, laevis; *antennis setaceis* ferrugineis; *capite* postice *rubro-bimaculato.*

Onomat. hist. nat. P. 3. p. 699.

5. *Punctatus*, der *Skopolische Wasserkäfer mit punktirten Flügeldecken.*

Scop. Entom. carn. No. 295.

Niger, *seticornis;* thoracis margine toto lineaque media transversa, frontisque linea trigona, rufis; *elytris* testaceis, subpellucidis: postice fascia abrupta, *punctisque* plurimis atris.

6. *Minimus*, das *kleinste Wasserkäferchen.*

Scop. Entom. carn. No. 297.

Statura CHRYSOMELAE *Nemorum*, ovatus, niger; *elytris* apice lineisque tribus albidis.

Füesslins Verz. S. 18. No. 356.

7. *Gla-*

7. *Glaber*, der *englische glatte Wasserkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 55. No. 55.

Antennis setaceis compressis, fuscus; *elytris* glabris, ventre pedibusque ferrugineis.

8. *Nebulosus*, der *englische neblichte Wasserkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 56. No. 56.

Lividus, nigro-nebulosus; *antennis pedibusque* ferrugineis, *ventre* atro; *margine* ferrugineo.

9. *Exsoletus*, der *englische verblaßte Wasserkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 57. No. 57.

Antennis setaceis, lividus; *antennis*, *capite*, *thorace*, *abdomine*, *pedibusque* pallidis.

10. *Costalis*, die *surinamische Braunstreife.*

Fabric. S. E. p. 230. *Dytiscus* 2.

Niger; *capitis* fascia; *thoracis* margine; *elytrorumque* stria *costali* ferrugineis.

11. *Limbatus*, der *chinesische gesäumte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 230. *Dytiscus* 4.

Niger; *thoracis elytrorumque* margine exteriore flavo.

12. *Lanio*, der *maderische Blutpunkt.*

Fabric. S. E. p. 231. *Dytiscus* 8.

Niger, *ore verticis* punctis duobus, *thoracisque* marginibus rufis; *elytris* fuscis.

13. *10-punctatus*, der *neuholländische Zehnpunkt.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus*.

Ater, glaber; *elytris* punctis albis quinque.

14. *Cin-*

14. *Cinctus*, der *amerikanische gegürtelte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 232. *Dytiscus* 13.
Capite thoraceque flavis; *elytris* nigris; *margine* omni albo.

15. *Irroratus*, der *amerikanische bethauete Wasserkäfer.**)

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 16.
Testaceus, *nigro irroratus; capite pectoreque* nigris.

16. *Varius*, der *patagonische gescheckte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 19.
Thorace rufo; *elytris* striis numerosissimis approximatis, nigris cinereisque *variegatis.*

17. *Depressus*, der *schwedische platte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 233. *Dytiscus* 20.
Thorace ferrugineo; *punctis* duobus baseos nigris; *elytris* fuscis, ferrugineo-maculatis.

18. *Signatus*, der *patagonische Zeichenwasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 234. *Dytiscus* 23.
Niger; capite thoraceque rufis; *signaturis nigris.*

19. *Lineatus*, der *elsassische lineirte Wasserkäfer.*

Fabric. S. E. p. 234. *Dytiscus* 25.
Ferrugineus; *coleoptris* fuscis; lineis quatuor flavescentibus.

20. *Am-*

*) v. No. 32. MÜLL. *roridus?*

20. *Amplissimus*, der *sehr breite und ansehnliche Wasserkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 69. No. 662.
Niger; marginibus luteis; *elytris* dilatatis, *sulcatis.*

21. *Semisulcatus*, der *halbgefurchte Frischwasserkäfer.* (v. No. 8.)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 70. No. 666.
Fuscus, supra niger; margine *thorace elytrorumque* extimo flavo, *sulcis* viginti dimidiatis.
Frisch Ins. II. p. 35. t. 7. f. 4.

22. *Transversalis*, die *gelbe Queerstreife.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 668.
Niger; *thorace* vtrinque fasciaque antica; *elytris* margine, lineaque *transversa* baseos flava.
Pontopp. D. Atlas I. t. 29.
— — N. G. v. D. p. 209. No. 14. *Transversalis.* Antennis setaceis; *caput* postice nigrum; *thorax* antice et ad latera ferrugineus, postice vna cum *elytris* niger; *elytrorum* margo exterior flavescens, linea concolor *transversalis* ante basin elytrorum, abrupta in medio dorso.

23. *Cinctus*, der *Gelbgürtel.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 669.
Niger; *margine* extimo thoracis et elytrorum *flavo.*
Individua simillima *patellis instructa et destituta* cepi.

24. *Bipunctatus*, der *Zweypunkt.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 194.
Niger; *elytris* acuminatis glabris apice *bipunctatis.*

Mülleri

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 670.
Niger; *pedibus punctisque* duobus apice *elytrorum* ferrugineis.

25. *Lacustris*, der *Moraſtkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 671.
Flavicans; *margine* thoracis flavo; *elytris* punctis ſparſis.

26. *Piceus*, der *Pechſchwarze.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 673.
Niger; *corpore* ſubtus margineque thoracis elytrorumque ferrugineo.

27. *Foetidus*, der *ſtinkende Waſſerkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 674.
Ferrugineus; ſupra niger; *margine thoracis elytrorumque* extimo flavo.

28. *Comma*, das *Comma.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 676.
Flavicans, ſupra nigro-aeneus, margine exteriore *lineolaque* elytrorum luteſcente.

29. *4-punctatus*, der *Vierpunkt.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 71. No. 677.
Ferrugineus; *elytris* nigris, faſcia, macula, *punctisque quatuor albis.*

Variat ſtriis quatuor punctatis, in ſingulo elytro, piloque griſeo, e quovis puncto procumbente.

30. *Biocellatus*, das *Zweyauge.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 768.*)

Rufus; *elytris* aeneis, in longitudinem albo-maculatis.

31. *Bilineatus*, die *Zweylinie.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 770.

Niger; *antennis tarsisque* rufis.

32. *Roridus*, der *gelbliche schwarz bethauete Wasserkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 771.

Flavus; *thorace* macula media; *elytris atomis nigris irroratus.***)

Specimen cum *patellis*, et aliud absque iisdem dedit experientiss. *Askow.*

33. *Impressus*, der *Eingedrückte.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 772.

Nigro-aeneus nitidus; *antennis*, *pedibus*, *punctisque duobus*, apice elytrorum ferrugineis.

34. *Punctatus*, der *Gelbpunkt.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 780.

Ovatus, rufus; *thoracis* medio nigro, *elytris* fuscis; margine inferiore *punctoque baseos flavis.*

35. *Cimicoïdes*, der *wanzenartige Wasserkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 781.

Virens; *elytris* virescentibus, margine inferiore et maculis albis.

36. *Velox*,

*) Hier gehet die *Verwirrung in den Numern* an. v. No. 18. *Linn.*

**) Aller Wahrscheinlichkeit nach des FABRIC. *irroratus* No. 15.

36. *Velox*, der *geschwinde Wasserkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 783.

Ovatus rufus; *elytris* striis octo fuscis.

37. *Parvulus*, der *Kleinling.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 784.

Niger; *thorace* antice flavo; *elytris* sulco abrupto; *pedibus piceis.*

38. *Rufifrons*, die *Rothstirn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 785.

Niger; *thorace* vtrinque; *elytris* basi lateribusque flavis; capite pedibusque rufis.

Act. Nidr. IV. p. 26. t. 16. f. 12.?

39. *Punctulatus*, der *mattpunktirte Wasserkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 786.

Rufus; *elytris* luteis disco macula communi nigra, sinuata.

40. *Pusillus*, das *Brunnenkäferchen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 788.

Ovatus niger; *antennis* basi *pedibusque* ferrugineis; *elytris* absque punctis.

An *Brunnkluka.* Isl. R. 688. d?

Olaffs R. Ueberf. I. p. 319. d.

Dytiscus e nigro brunneus, extremo abdominis albido.

41. *Quadripustulatus*, die *Vierblatter.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 789.

Niger; *elytris* maculis quatuor flavis, *pedibus* rufis.

42. *Linea-*

42. *Lineatus*, der *Lineirte.*

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 790.

Ater, supra flavicans; *thorace* postice, *elytris* striis maculisque nigris. *)

43. *Ater*, der *ganz schwarze Wasserkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 189. *Dytiscus* 6. Le *Ditisque en deuil.*

Totus *niger*, laevis.

Schaeff. Icon. t. 8. f. 9.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 401. *Dytiscus* 8. *Ditisque tout noir.*

DYTISCVS *(ater)*; *corpore* convexo nigro toto; *pedibus antennisque* rufo-fuscis.

44. *Nigro-maculatus*, der *Schwarzfleck.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 189. *Dytiscus* 7. Le *Ditique fauve à taches noires.*

Fulvus; *maculis* sparsis nigris.

45. *Cristato-marginatus*, der *Federbuschrand.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 190. *Dytiscus* 8. Le *Ditique à bordure panachée.*

Fuscus; *elytris* antice et externe flavis.

46. *Nigro-fuscus*, der *Schwarzbraune.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 190. *Dytiscus* 9. Le *Ditique noir à étuis bruns.*

Ater; *elytris* fuscis.

Müllleri

*) Der Staatsrath *Müller* hat die *Dytiscos* von den *Hydrophilis* abgesondert, und in zwo Klassen getheilet: 1. *Scutellatos*; 2. *exscutellatos.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 73. No. 782. DYTISCVS *rufipes.**)

Ovatus ater; *pedibus antennarumque* basi ferrugineis; *elytris* punctatis subpubescentibus.

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 568.

Supra fuscus, *subtus* ater.

— — — ed. 2. p. 216. *Variatio semistriati:* No. 772. b.

Est inter *minores*, totus laevissimus; *Apex sterni* bifurcus, obtusus.

47. *Gilvus*, der *wachsgelbe Wasserkäfer.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 191. *Dytiscus* 11. Le *Ditique aux yeux noirs.*

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 778.

Flavicans; capite thoraceque virente; *elytris* obscure laevibus.

48. *Quadrimaculatus*, der *Vierfleck.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 192. *Dytiscus* 13. Le *Ditique panaché sans stries.*

Niger; *thorace* flavo; *elytris* laevibus, maculis limboque luteis.

49. *Vnistriatus*, die *Einstreife.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 192. *Dytiscus* 14. Le *Ditique à une seule strie.*

Niger; *elytris* maculis et limbo luteis; *stria unica.*

50. *Clavicornis*, das *Keulhorn.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 193. *Dytiscus* 15. Le *Ditique à grosses antennes.*

Fuscus;

*) Er frägt nur, ob es dieser *Geoffr.* sey.

Fuscus; *capite thoraceque* fulvo, *antennis subclavatis*, scutello nullo.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 402. *Dyt.* 10. *Ditisque à antennes en massue.*

D. *(clavicornis)* viridi-griseus; antennis *subclavatis;* abdomine subtus nigro-fusco.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 72. No. 779.

D. *(crassicornis)*, fulvus; antennis *subclavatis;* elytris fuscis.

51. *Bilineatus*, die *Degeerische Zweylinie.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 400. *Dytisc.* 6. *Ditisque à corcelet roux bordé de noir.*

Elytris fuscis; corpore subtus fulvo, *thorace* fulvo; *linea duplici nigra.*

52. *Semi-niger*, der *Halbschwarze.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 401. *Dytisc.* 7. *Ditisque noir en dessous.*

Thorace elytrisque obscure fuscis, rufo-marginatis; *corpore* subtus toto nigro.

53. *Griseo-striatus*, der *Graugestreifte.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 403. *Dytisc.* 11. *Ditisque noir à rayes grises.*

Niger, supra maculis striisque griseis; *pedibus* rufo-fuscis.

54. *Hyalinus*, der *Durchsichtige.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 406. *Dytisc.* 14. *Ditisque transparent.* t. 15. f. 21. 22. 23.

Virescens; *elytris hyalinis* maculis lateralibus albidis.

213. GESCHLECHT. Carabus; *Lauf- Rennkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 352. *Erdkäfer; holl.* Aard-Torren.

Börners

*) Nach *Sulzers* Meynung könnte dieswohl am erſten der Alten *Bupreſtis* geweſen ſeyn, weil dieſe Käfer einen ſtinkenden, braunen und ſehr ſcharfen Saft von ſich geben, der leicht in dem Magen des Viehes, das dergleichen verſchluckt hätte, eine Entzündung verurſachen könnte.

Ihre Oekonomie betreffend: ſo ſind von ihren Larven kaum die Hälfte bekannt. Sie wohnen in faulem Holz, im Moos, und unter der Erde, und ſind ſowohl als die Käfer die gröſten *Inſektenräuber* und *Raupenmörder*.

Die Käfer halten ſich mehrentheils an der Erde auf, und laufen ſehr geſchwind. Einige ſind *geflügelt*, andere *ungeflügelt*, wornach ſie der Herr *de Geer* eingetheilet hat. Des Ritters Eintheilung in groſse und kleine iſt eben nicht die bequemſte. *Geoffroi* hat ſeine *Bupreſtides* (Carabos et Cicindelas Linn.) in drey Familien eingetheilet:

1. Thorace cordato, capite latiore; elytris anguſtiore.
2. Thorace, capite elytrisque anguſtiore.
3. Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.

Müllers Eintheilung iſt vielleicht die *beſte:*

1. *Thorace quadrato:* antice et poſtice ſubaequali.
2. *Thorace cordiformi:* poſtice anguſtiore.
3. *Thorace triangulari:* poſtice latiore.
4. *Thorace orbiculato.*

Uebrigens ſind dieſe Käfer, da ſie ſich gemeiniglich in der Erde, unter den Steinen, und an feuchten Oertern aufhalten, der *Milbenplage* ſehr unterworfen. Auch freſſen ſie einander ſelbſt auf. Der Zweykampf des *Sycophanta* und *Crepitans*, beſonders die Art des leztern, ſich zu vertheidigen, iſt eine der poſſirlichſten. Dieſe Käfer ſind wieder ein Leckerbiſſen für verſchiedene *Vögel*, *Mäuſe*, *Kröten*, ſonderlich für die *Eidexen*.

Börners Samml. I. Th. S. 477. *Laufkäfer; Erdkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 99. gen. 21. *Erdkäfer.*

Eberhards Verſ. einer Thiergeſch. S. 193. §. 215. *Laufkäfer.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. S. 1513. No. 3. der *Laufer; Rennkäfer: große und kleine Harzkäfer;* Carabus.

Glaſer von ſchädlichen Raupen der Obſtbäume. S. 73. *Raubkäfer; Raupenjäger.* S. 136. *Raupentödtende Käfer.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 210. *Erdkäfer: Jütl.* Skovtiggere.

Sulzers Kennz. S. 75. *Erdkäfer.* Chaſſeur des Chenilles. *Reaum.*

— — Geſch. S. 60. der *Laufkäfer;* Le Chaſſeur des Chenilles.

Olaffs Reiſen durch Isl. I. p. 319. e. *Jarnſmidur.*

Neuer Schauplatz der Natur. II. B. pag. 666. *Erdkäfer.*

Füeßlins Verz. ſchweiz. Inſ. S. 18. *Laufkäfer.*

Brunnichii Entom. p. 54. *Dan.* Skovtigger.

Comment. Lipſ. Dec. I. Vol. 3. p. 216. Vol. V. p. 606.

Catholicon C. p. 89. der *Erdkäfer;* der *Raubkäfer; Rupreſtis* Autorum.

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 615. *Erdkäfer.*

Fabric. S. E. p. 235. *Carabus.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 217. *Carabus.*

Scop. Entom. carn. p. 85. *Carabus.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. *Carabus.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. *Cerabus.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 137. *Bupreſtis.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. préf. I. No. 40. pag. 82. Des *Carabes.*

I. *Große Erdkäfer.*

1. *Coriaceus*, der *lederartige Laufkäfer.**)

Müller l. c. S. 353. t. 7. f. 10. der *Lederkäfer.*
Füeßlins Verz. S. 18. No. 357. der *Lederartige.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 210. t. 16.
— — Atlas Dan. I. t. 29.
Act. Nidr. III. 20. *Ueberf.* p. 359.
Schaeff. Icon. t. 36. f. 1. (all. *Füeßl.*)
— — — t. 141. f. 1. (cit. *Müll.* et *de Geer.*)
Fabric. S. E. p. 235. No. 1.
Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 195.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 803.
Ater; *elytris* rugosis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 141. *Bupreſtis* 1. Le *Bupreſte noir chagriné.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 9. No. 4. *Carabe noir chagriné.*

2. α. *Granulatus*, der *körnerichte Laufkäfer.***)

Müller l. c. S. 353. No. 2. die *Körnerwarze.*
Füeßlins Verz. S. 18. No. 358. der *Galonirte.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 210. No. 2.
Sulzers Geſch. p. 62. t. 7. f. 2. der *Galonirte.*
Schaeff. Icon. t. 18. f. 6. t. 156. f. 4.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 616. der *ſchwarze Erdkäfer mit erhöheten Punkten und Streifen auf den Flügeldecken.*
Fabric. S. E. p. 238. No. 14.
Apterus, nigricans; *elytris* aeneis, ſtriatis, interjectis punctis elevatis, longitudinalibus.

Scop.

*) *Non-alatus: Ungeflügelt.*

**) *Ungeflügelt.*

Scop. Entom. carn. No. 263.*)
Poda Mus. graec. p. 45. No. 4. (non *Hortensis.*)
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 143. *Bupr.* 3. Le *Bupreste galonné.*

Bupreſtis niger; *elytris* aeneis, convexe punctatis ſtriatisque.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 88. No. 2. *Carabé à points convexes.*

CARABVS *ſubapterus*, ſupra viridi-aeneus; ſubtus niger; *elytris* tuberculis elongatis triplici ordine: *ſulcis* elevatis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 20. No. 197.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 805.

Niger, *ſupra* aeneus; *elytris* convexe ſtriatis: interjectis *tuberculis* elongatis, *triplici ſerie.*

Variat baſi antennarum et femoribus ferrugineis, vtraque iterum articulis tarſorum anticorum dilatatis (an *maris?*) ſpongioſis, ac elytris apice eroſis.

β. Onomat. hiſt. nat. P. 2. pag. 620. der *ſchwarze Erdkäfer mit grünlichen Flügeldecken, und erhöheten Punkten und Streifen auf denſelben.*

γ. Onomat. hiſt. nat. P. 2. 619. der *ſchwarze Erdkäfer mit kupferfarbigen Flügeldecken und erhabenen Punkten, und Streifen auf denſelben.***)

*) Mirum ſane, ſagt *Skopoli*, quod Ill. *Linn.* punctorum elytri quidem; *linearum* vero elevatarum iisdem interpoſitarum, meminerit nihil.

**) Bey dieſen *Variationen* hat der *Ritter* der *Streifen* oder *Zwiſchenlinien* zwiſchen den Punkten gedacht.

3. *Hortensis*, der *Goldschmidt.**)

Müller l. c. S. 353. t. 7. f. 12. No. 3. der *Hohlpunkt*; *holl.* Goudsmid, (*Goldarbeiter*).

Füeßlins Verz. S. 18. No. 359. der *Hohlpunkt.*

Olaffs Reisen durch Isl. I. p. 319. *Isl. Gullsmidur.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 623. der *purpurfarbige auf schwarz stechende Erdkäfer mit tiefen Punkten und Streifen auf den Flügeldecken.*

Raj. Ins. 96. No. 2. *Cerambyx* purpurea punctata.

Acta Upsal. 1736. p. 19. No. 1. *Carabus* niger; *elytris* sulcatis punctatis.

Schaeff. Icon. t. 11. f. 3.

Fabric. S. E. p. 237. No. 7.

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 198.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 808.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 90. No. 5. t. 3. f. 1. *Carabe noir à points dorés.*

CARABUS *(striatus)* niger; *elytris* striatis margine violaceis; *punctis aureis* excavatis, triplici serie.

4. *Leucophthalmus*, das *Weißauge.*

Müller l. c. S. 354. No. 4.

Füeßlins Verz. S. 18. No. 360.

Act. Nidr. IV. p. 28.

List. scar. angl. p. 390. No. 23. *Scarabaeus* ex toto niger.

Fabric. S. E. p. 240. No. 23. *Apterus*, ater; *elytris* striatis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 199.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 822.

Niger; thorace *lineolis quatuor* posticis excavatis.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 2.

*) *Ungeflügelt.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 617. der *schwarze Erdkäfer mit gestreiften Flügeldecken.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 146. *Bupr.* 7. Le *Bupreste tout noir.*

Ater; *elytro* singulo *striis octo* laevibus; *pedibus* nigris.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 96. No. 12. *Carabé noir canelé.**)

CARABVS *(nigro-striatus) alatus* totus niger nitidus; *elytris* striatis.

5. *Clatratus*, der *gegitterte Laufkäfer.***)

Müller l. c. S. 354. der *Gitterkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 361.

Fabric. S. E. p. 238. No. 15.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 806.

Niger; *elytris* sulcis tribus: *punctis* excavatis aeneis.

6. *Nitens*, der *glänzende Laufkäfer.*†)

Müller l. c. S. 354. No. 6. t. 7. f. 11. der *Erdglänzer.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 362.

Sulzers Gesch. S. 62. t. 7. f. 3. der *Erdglänzer.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 625. der *grüne Erdkäfer mit stumpf eingekerbten Flügeldecken ohne Punkte, und roſtfarbigen Füßen und Fühlhörnern.*

Act. Vpsal. 1736. pag. 19. No. 3. *Carabus* viridis; *elytris* sulcatis laevibus.

Schaeff. Icon. t. 51. f. 1. (all. *Füeßl.*)

Poda Mus. graec. p. 45.

Fabric. S. E. p. 239. No. 17.

Apterus; elytris porcatis, scabris, viridibus; *margine aureo.*

*) Nach dem DE GEER *geflügelt.*

**) *Ungeflügelt.*

†) *Ungeflügelt.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 807.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 91. No. 6. *Carabé doré.*

CARABVS *(aureus)* apterus; capite thoraceque aureis; corpore ſubtus nigro; *elytris* viridi-aeneis, *margine* aureis; ſulcis elevatis nigris.

β. Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 219. No. 785. *Carabus* niger; *elytris* viridibus obtuſe ſulcatis; *pedibus antennisque* nigris.

Raj. Inſ. 96. No. 6. *Cerambyx* dorſo in longas rugulas diviſo, *omnium pulcherrimus.*

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 620. der *ſchwarze Erdkäfer mit grünen, ſtumpf eingekerbten Flügeldecken, und ſchwarzen Füßen und Fühlhörnern.*

7. *Auratus*, der *goldne Laufkäfer.**)

Müller l. c. S. 355. No. 7. der *Goldkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 363. Vulgo *Goldkäfer.*

Fabric. S. E. p. 238. No. 12.**)

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 200.

Friſch Inſ. XIII. p. 25. No. 27. t. 23. †) der *ſchwarze Erdkäfer mit dem geſäumten herzförmigen Halsſchild.* (alleg. *Müllero*).

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 142. *Bupr.* 2. t. 2. f. 5. Le *Bupreſte doré et ſillonné à larges bandes.*

Viridis; *elytris* obtuſe ſulcatis, non punctatis; *pedibus antennisque* ferrugineis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 104. No. 1. *exot.* t. 7. f. 20. *Carabé ſillonné.*

CARA-

*) *Ungeflügelt.*

**) *Fabric.* hat zu dieſem das bey dem vorigen angeführte *Schaeff. citatum* geſetzt.

†) Vom *Linné* bey dem folgenden *Violaceo* angeführt, worinn *Fabric.* und *Füeßlin* gefolget ſind.

CARABVS *(sulcatus)*, *apterus* viridi-aeneus nitidus; *antennis pedibusque* rufis, *abdomine* nigro, *elytris* sulcatis.

8. *Violaceus*, der *violette Laufkäfer.**)

Müller l. c. S. 355. No. 8. die *Goldleiste; holl.* der *Kupferschmidt.*

Füesslins Verz. S. 18. No. 364.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 624. der *blaulicht schwarze Erdkäfer mit glatten gerunzelten Flügeldecken.*

Schaeff. Icon. t. 3. f. 1. t. 88. f. 1.

Act. Nidr. IV. 29.

Act. Upsal. 1736. p. 19. No. 3. *Carabus* nigricans laevis.

Fabric. S. E. p. 236. No. 2.

Alatus, niger; *thoracis elytrorumque* marginibus *violaceis.*

List. Scar. angl. 389. 22. *Scarabaeus* maximus, ex *viola* nigricans.

Müllеri Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 810.

Niger; *thorace* subviolaceo; *elytris* laeviusculis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 144. *Bupr.* 4. *Le Bupreste azuré.*

Bupreſtis totus, nigro-violaceus; *elytris* dense striatis.

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 89. No. 3. *Carabé azuré.*

CARABVS *apterus* aeneo-niger nitidus; *thorace* subviolaceo; *elytris* punctis minutissimis excavatis triplici ordine.

9. *Cephalotes*, der *herzförmige Halsschild.***)

Müller l. c. S. 355. No. 9. der *Blechschmidt.*

Füesslins

*) *Linné* und *Fabric.* geben ihn als *geflügelt*, der Herr *de Geer* aber mit Recht, als *ungeflügelt* an. **) *Ungeflügelt.*

Füeßlins Verz. S. 18. No. 365.
Frisch Inf. XIII. p. 25. No. 26. t. 22. der *schwarze Erdkäfer mit dem herzförmigen Halsschild.*
Sulzers Gesch. t. 7. f. 4. *)
Schaeff. Icon. t. 11. f. 1.
Fabric. S. E. p. 240. No. 22. *Apterus*, ater, laevissimus; *thorace* orbiculato, convexo.
Müllleri Faun. Fridr. p. 20. No. 201.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 834.
Niger, laevis; *thorace* oblongo, postice coarctato.

10. *10-guttatus*, der *kapensische Zehntropf.* **)
Müller l. c. S. 356. No. 10. der *Milchtropf.*
Fabric. S. E. p. 236. No. 3.

11. *Inquisitor*, der *Raupenjäger.* †)
Müller l. c. S. 356. No. 11.
Füeßlins Verz. S. 19. No. 366. der *Raupenjäger.*
Gleditsch Forstwiss. II. p. 794. No. 8. der *Aufpasser.*
Fabric. S. E. p. 239. No. 18. *Alatus.*
Müllleri Faun. Fridr. p. 20. No. 202.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 835.
Viridis; *elytris* aeneis rugose striatis; *punctis* triplici serie; *pedibus antennisque* nigris.
Variat supra totus niger margine elytrorum viridi.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 145. *Bupr.* 6. Le *Bupreste quarré couleur de bronze antique.*

Bupre-

*) Obgleich *Sulzer* und *Füeßlin* bey dieser t. 7. f. 4. des *Linn.* Spinipes No. 20. anführen; so halte ich doch den *Sulzerschen* wegen des vorgestreckten Halsschildes für den *Cephalotes.* Denn das nomen specificum: *Spinipes*, wie *Müller* erinnert Prodr. p. 79. No. 852. kömmt sehr vielen dieser Art zu.

**) *Ungeflügelt.* — *Unabgebildet.* †) *Geflügelt.*

Bupreſtis totus e fuſco-viridi cupreus; *elytris* latis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 94. No. 9. *Carabé inquiſiteur.*

CARABVS *alatus* ſupra aeneo-fuſcus, ſubtus viridi-aureus; *elytris* ſtriatis margine aeneis, punctis excavatis triplici ordine.

Rolander Act. Ac. Suec. 1750. p. 292. Tab. 7. f. 3.

12. *Sycophanta*, der *Puppenräuber*.*)

Müller l. c. S. 357. No. 12. t. 7. f. 13.

Füeßlins Verzeichn. S. 19. No. 367. der *Puppenräuber.*

Sulzers Geſch. pag. 60. 62. t. 7. f. 1. der *Puppenräuber.*

Glaſer von ſchädlichen Raupen p. 74.

Berlin. Magaz. 3. B. S. 5. ff. der *größte europäiſche goldgrüne Baumkäfer.*

Schaeff. Icon. t. 66. f. 6.

Fabric. S. E. p. 239. No. 20. *Alatus*, violaceo-nitens; *elytris* aureis, ſtriatis.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 144. *Bupr.* 5. Le *Bupreſte quarré couleur d'or.*

Nigro-violaceus; *elytris* latis aeneis e viridi purpureis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

de *Geer* Inſ. T. IV. p. 105. No. 2. t. 17. f. 19. *exot. Carabé Sycophante.*

CARABVS *alatus* nitens; *thorace femoribusque* violaceis; *elytris* viridibus ſtriatis; *abdomine* viridi-aureo.

II. *Kleine*

*) *Geflügelt.*

II. *Kleine Erdkäfer.*

13. *Bruprestoïdes*, der *prachtkäferartige Laufkäfer.**)

Müller l. c. S. 358. No. 13. der *Erdflinker.*
Füeßlins Verz. S. 19. No. 368.

14. *Fastigiatus*, der *kapensische Laufkäfer mit zugespitzten Flügeldecken.***)

Müller l. c. S. 14. No. 14. der *Dachkäfer.*
Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 283. *Dachkäfer.*

15. *Lividus*, der *grüngelbe Laufkäfer.*†)

Müller l. c. S. 358. No. 15. der *Blaßrücken.*

16. *Marginatus*, der *Rothrand.*

Müller l. c. S. 359. No. 16.
Füeßlins Verz. S. 19. No. 369.
Pontopp. N. G. v. D. p. 210. t. 16.
— — Atl. Dan. I. t. 29.
Fabric. S. E. p. 245. No. 51.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 162. *Bupr.* 41. Le *Bupreste vert à bordure.*

Viridis, *pedibus elytrorumque* margine exteriore pallide testaceis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 845.

17. *Complanatus*, der *spanische Plattschild.*††)

Müller l. c. S. 359. No. 17.
Fabric. S. E. p. 242. No. 33.

Thorace orbiculato, rufus; *elytris* fasciis duabus nigris.

18. *Crepi-*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

18. *Crepitans*, der *Bombardierkäfer.**)

Müller l. c. S. 359. der — —

Füeßlins Verz. S. 19. No. 370. der *Platzkäfer.*

Sulzers Gesch. S. 60.

Neuer Schauplatz der Nat. II. p. 666.

Bom. Dict. II. p. 158. Le *Bombardier.*

Schaeff. Icon. t. 11. f. 13. (alleg. *Fließl.* sed *Fabric.* t. 10. f. 13.)

Rolander Act. Holm. 1750. pag. 292. t. 7. f. 2. *Cicindela* etc.

Fabric. S. E. p. 242. No. 35.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 151. *Bupr.* 19. Le *Bupreste à tête, corcelet, et pattes rouges et etuis bleus.*

Capite, thorace, pedibusque rubris; *elytris* coeruleo-nigris.

de *Geer* Inf. Tom. IV. pag. 103. No. 22. t. 3. f. 18. *Carabé pétard.*

CARABVS *alatus* ferrugineus, *thorace* angusto; *elytris* cinereo-nigris.

Schwed. Skiut-fluga; *Mouche*, qui tire.

19. *Ame-*

*) *Geflügelt.*

In *Frankreich* unter den Steinen, wie auch in *Schweden* zu Hause. Seine Art, sich gegen seine Feinde, den *Sycophanta* und *Inquisitor* zu vertheidigen, ist merkwürdig. Wenn er verfolgt wird, und nicht mehr entwischen kann, legt er sich, wie todt, nieder. Sobald nun sein Verfolger den Hals aufsperrt und zuschnappen will, läßt er ihm aus dem After einen blauen unangenehmen Dunst mit einem platzenden Geräusch in den Hals fahren, worüber solcher erschrickt und zurückfährt. Mittlerweile gewinnt der kleine Schalk Zeit, sich aus dem Staube zu machen. Ein gleiches soll er thun, wenn man ihn mit einer Stecknadel unter den Flügeldecken kützelt.

19. *Americanus*, der *amerikanische Rostfuß.**)

Müller l. c. S. 360. No. 19. der *Amerikaner.*
Fabric. S. E. p. 242. No. 34.
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 107. *exot.* No. 3. t. 17. f. 21.
Carabé americain.

Alatus niger; thorace, antennis pedibusque ferrugineis; *genubus* nigris; *elytris* ſtriatis.

20. *Spinipes*, der *Stachelfuß.***)

Müller l. c. S. 360. No. 20.
Füeßlins Verz. S. 19. No. 371.
Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 203.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 852.

Niger; *elytris* aeneis; tibiis anticis, medio inciſis.

A Carabo *Spinipede* SCOP. diverſus eſt, an etiam a Carabo *Linn.*?

21. *Cyanocephalus*, der *Blaukopf.*†)

Müller l. c. S. 361. No. 21.
Füeßlins Verz. S. 19. No. 372.
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 618. der *Erdkäfer mit blauem Kopf und Flügeldecken, und rother Bruſt.*
Schaeff. Icon. t. 10. f. 14. (alleg. *Fabric.* ſed *Füeßl.* t. 11. f. 14.)
Fabric. S. E. p. 245. No. 53.
Raj. Inſ. 89. No. 1. *Cantharis* elytris et capite coeruleis, *ſcapulis* croceis.
Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 204.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 856.

Geoffr.

*) *Geflügelt.*

**) v. No. 9. *Cephalotes.* Iſt dieſer nicht derjenige, den *Sulzers* Geſch. t. 7. f. 4. vorgeſtellet hat; ſo iſt er *nicht abgebildet.*]

†) *Geflügelt.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 149. *Bupr.* 16. Le *Bupreſte bleu à corcelet rouge.*

Bupreſtis capite elytrisque coeruleis; *thorace* rubro.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 100. No. 17. t. 3. f. 17. *Carabé tête-bleue.*

Alatus, capite elytrisque viridi-coeruleis; *thorace pedibusque* ferrugineis.

22. *Melanocephalus*, der *Schwarzkopf.**)

Müller l. c. S. 361. No. 22.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 373. der *Schwarzkopf.*

Olaffs Reiſen durch Isl. I. p. 320.

Onomat. hiſt. nat. P. 2. pag. 618. der *Erdkäfer mit ſchwarzem Kopf und Flügeldecken und rother Bruſt.*

Actr. Nidr. III. p. 22. *Ueberſ.* p. 360.

Fabric. S. E. p. 245. No. 52.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 831.

Ferrugineus; *capite*, *elytris*, *abdomineque* nigris.

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 162. *Bupr.* 42. *Bupreſte noir à corcelet rouge.*

Bupreſtis niger; *thorace*, *antennis pedibusque* ferrugineis.

de *Geer* Inf. IV. p. 93. No. 8. *Carabé tête-noire.*

Apterus, niger, nitidus; *elytris* laevibus; *antennis pedibusque* flavo-teſtaceis.

23. *Vaporariorum*, der *Gewächshauslaufkäfer.***)

Müller l. c. S. 361. No. 23. der *Wintergärtner.*

Füeßlins Verz. S. 19. No. 374.

Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 617. der *ſchwarze Erdkäfer mit grauen Flügeldecken gegen der Bruſt.*

Fabric.

*) *Nicht abgebildet. Ungeflügelt.*

**) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 247. No. 61.

Thorace; elytris antice margineque, antennis pedibusque *ferrugineis.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 850.

Nigricans; antennis, thorace, pedibus, elytrisque antice *ferrugineis.*

24. *Latus*, der *Breitbuckel.**)

Müller l. c. S. 362. No. 24.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 375. *Breitbuckel.*

Act. Nidr. III. p. 23. Ueberf. p. 361.

Schaeff. Icon. t. 194. f. 7.

Fabric. S. E. p. 244. No. 44.

Niger; *elytris* ſtriatis, crenatis, *antennis pedibusque* ferrugineis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 20. No. 196.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 854.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 101. No. 18. *Carabé large.*

Alatus, niger, nitidus; *elytris* ſtriatis; *pedibus antennisque* rufis.

25. *Ferrugineus*, der *Glattrücken.***)

Müller l. c. S. 362. No. 25.

Fabric. S. E. p. 244. No. 46.

Ferrugineus; elytris ſtriatis, obſcurioribus.

Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 205.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 855.

Thorace glaberrimo.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 162. *Bupr.* 43. Le *Bupreſte fauve.*

Bupreſtis ferrugineo-lividus, *elytris* punctato-ſtriatis.

de *Geer*

*) *Geflügelt.*

**) *Geflügelt. Nicht abgebildet.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 101. No. 19. *Carabé fauve.*

Alatus flavo-griſeus nitidus; oculis nigris; *elytris* ſtriatis.

26. *Germanus*, die *Violetſpitze.*

Müller l. c. S. 362. No. 26.
Füeßlins Verz. S. 19. No. 376.
Schaeff. Icon. t. 31. f. 13.

27. *Vulgaris*, der *gemeine Laufkäfer.**)

Müller l. c. S. 362. No. 27. der *Pöbelkäfer.*
Füeßlins Verz. S. 19. No. 377.
Olaffs Reiſ. durch Isl. I. p. 319. *Järnſmidur.*
Onomat. hiſt. nat. P. 2. p. 622. der *ſchwarze auf Kupfer ſtechende Erdkäfer mit ſchwarzen Fühlhörnern und Füßen.*

Act. Nidr. III. p. 24. *Ueberſ.* p. 361.
Schaeff. Icon. t. 18. f. 2.
Fabric. S. E. p. 244. No. 42.
Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 206.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 858.

Niger; *ſupra* nigro-aeneus; *antennis* baſi fulvis; *tibiis* piceis.

Variat ater totus; *antennis* baſi fulvis; *pedibus* piceis; *hic* iterum pedibus totis luteis.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 158. *Bupr.* 33. Le *Bupreſte bronzé à deux points enfoncés.*

Bupreſtis fuſco-aeneus; *elytris* ſtriatis, punctis duobus impreſſis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 97. No. 14. *Carabé vulgaire.*

Alatus; *ſupra* viridi-aeneus, nitidus; *ſubtus* niger; *pedibus antennisque* nigris.

*) *Geflügelt.*

28. *Coeruleſcens*, der *Blaurücken.*

Müller l. c. S. 362. No. 28.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 378. der *Bläuling.*

Onomat. hiſt. nat. P. 2. pag. 624. der *kupferfarbige Erdkäfer mit ſechs vertieften Punkten auf den Flügeldecken und rothen Füßen.*

Act. Vpſal. 1736. p. 20. No. 8. *Bupreſtis* capite nigro, collari, elytrisque nigro-aeneis.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 3. 4.

Fabric. S. E. p. 243. No. 39.

Nigro-coeruleſcens; *elytris* ſtriatis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 21. No. 207.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 838.

Viridi-coeruleus; antennis baſi tibiisque rufis.

29. *Cupreus*, der *Kupferrücken.**)

Müller l. c. S. 363. No. 29.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 379. der *Kupferfarbige.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 21. No. 208.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 815.

Niger, ſupra aeneus; *antennis* baſi rubris.

Variat punctis tribus in elytro ſingulo inter ſtriam ſecundam et tertiam impreſſis; *alia* varietas puncto vnico in ſecunda ſtria.

Fabric. S. E. p. 243. No. 40.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 161. *Bupr.* 40. Le *Bupreſte perroquet.* (teſte *Fabric.*)

Totus viridi cupreus; *antennis* nigris.

— — — p. 160. No. 36. Le *Bupreſte* roſette (all. *de Geer*).

Infra niger; *ſupra* nigro-aeneus, *thorace* lato.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 97. No. 13. t. 3. f. 15. *Carabé roſette.*

Alatus,

*) *Geflügelt.*

Alatus, supra viridi-aeneus; subtus niger; *antennis* basi rufis.

30. *Piceus*, der *Pechrücken*.*)

Müller l. c. S. 363. No. 30.
Fabric. S. N. p. 241. No. 29.
Thorace obcordato; *antennis* tibiisque piceis.
Müllerí Faun. Fridr. p. 21. No. 209.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 818.
Schaeff. Icon. t. 18. f. 9.

31. *Velox*, der *Strandjäger*.**)

Müller l. c. S. 363. No. 31.
Fabric. S. E. p. 247. No. 57.
Nigricans; *antennis pedibusque* pallidis; *elytris* obtusissimis.

32. *Multipunctatus*, der *Vielpunkt*.†)

Müller l. c. S. 363. No. 32. der *Punktträger*.
Fabric. S. E. p. 245. No. 48.
Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 853.
Nigro-aeneus; *elytris* punctis impressis inaequalibus.

33. *2-punctatus*, der *Zweypunkt*.††)

Müller l. c. S. 363. No. 33. der *Druckpunkt*.
Fabric. S. E. p. 249. No. 69.
Aeneus; *antennis* nigris; *tibiis* pallidis.

34. *4-pustulatus*, die *Vierblatter*.†††)

Müller l. c. S. 364. No. 34. die *Gelbblatter*.

*) *Ungeflügelt.*
†) *Nicht abgebildet.*
†††) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

35. *6-punctatus*, der *Sechspunkt.**)

Müller l. c. S. 364. No. 35. der *Langpunkt.*
Füeßlins Verz. S. 19. No. 380. der *Sechspunkt.*
Onomat. hist. nat. P. 2. p. 622. der *goldglänzende Erdkäfer mit himmelblauem Kopf und Brust, und purpurfarbenen Flügeldecken.*

Act. Upsal. 1736. pag. 20. No. 6. *Buprestis* capite collarique coeruleo; *elytris* rubro-aeneis.
Schaeff. Icon. t. 66. f. 4.
Müllers Faun. Fridr. p. 21. No. 210.
Fabric. S. E. p. 245. No. 30.
Capite, thoraceque viridibus; *elytris* cupreis.
Bauhon. ballon. p. 212. f. 4. CANTHARIS *auricolor.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 149. *Bupr.* 14. Le *Bupreste à étuis cuivreux.*
Buprestis nitens; *capite thoraceque* viridi; *elytris* cupreis punctulis *duodecim.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 99. No. 16. *Carabé à six points.*
Alatus; capite thoraceque viridi-aureis; *elytris* rubro-aeneis: *punctis sex* impressis.

36. *Meridianus*, der *Mittagskäfer.***)

Müller l. c. S. 364. No. 36. der *Meridian.*
Fabric. S. E. p. 247. No. 62.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 836.
Niger; *elytrorum* basi, sutura, pedibusque *testaceis.*

37. *Testaceus*, der *muschelbraune Laufkäfer.*†)

Müller l. c. S. 365. No. 37. der *Glattflügel.*

Onomat.

*) *Geflügelte.*
†) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 623. der *bleiche muschelfarbige Erdkäfer mit klebrichten Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 248. No. 68.

Capite thoraceque ferrugineis, *elytris* testaceis.

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 153. No. 25. Le *Bupreste fauve à tête noire.*

Testaceus; *capite* nigro.

38. *Vstulatus*, der *Brandflügel.**)

Müller l. c. S. 365. No. 38.

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 619. der *schwarze Erdkäfer mit einem ablangen eisenfarbigen Flecken hinten an den Flügeldecken, und auf beyden Seiten.*

Fabric. S. E. p. 248. No. 66.

Thorace nigro; *elytris* obscuris, pallido-bifasciatis.

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 844.

Niger; *elytris* fuscis; *maculis quatuor*, pedibusque flavis.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 151. *Bupr.* 20. Le *Bupreste quadrille à corcelet rond et etuis striés.*

Niger; *thorace* ovato, nigro, *elytris* striatis; *maculis quatuor* lividis.

39. *Crux major*, der *große Kreuzkäfer.*

Müller l. c. S. 365. No. 39. der *Großkreuz.*

Füeßlins Verz. S. 19. No. 381. *Großkreuz.*

Neuer Schauplatz der Nat. 2. B. S. 247.

Fabric. S. E. p. 246. No. 55.

Thorace orbiculato, rubro; *coleoptris* truncatis, rubris; *cruce nigra.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 150. *Bupr.* 18. Le *Chevalier rouge.*

*) *Nicht abgebildet.*

Niger; *thorace* pedibusque rubris, *elytris* rubris; *cruce nigra.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 861.

Niger, pubescens, *maculis elytrorum quatuor* fulvis.

40. *Crux minor*, der *kleine Kreuzkäfer.*

Müller l. c. S. 366. No. 40. der *Kleinkreuz.*

Füeßlins Verz. S. 19. 382. *Kleinkreuz.*

Sulzers Gesch. S. 63. t. 7. f. 6.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 8. t. 41. f. 13. 14.

Fabric. S. E. p. 246. No. 56.

Thorace orbiculato, rufo; *coleoptris* apice nigris; *macula rufa.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 813.

Niger, glaber; *thorace*, *pedibus elytrorumque* basi et apice luteo-rufis.

41. *4-maculatus*, der *Vierfleck.*

Müller l. c. S. 366. No. 41. die *Weißblatter.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 210.

— — Atl. Dan. I. t. 29.

Fabric. S. E. p. 248. No. 64.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 811.

Luteus; *thorace* rufo; *elytris* elongatis, testaceis; *maculis quatuor* albis.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 152. *Bupr.* 21. Le *Bupreste quadrille à corcelet plat, et étuis lisses.*

Niger; *thorace* plano ferrugineo, *elytris* laevibus; *maculis quatuor lividis.*

42. *Atricapillus*, das *Schwarzköpfchen.**)

Müller l. c. S. 367. No. 42.

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 248. No. 67.

Thorace rotundato, rufo; *elytris* obtusis, testaceis, *capite atro.*

43. *Truncatellus*, der *Stutzflügel.**)
Müller l. c. S. 367. No. 43.

Unabgebildete Laufkäfer.

I. Klasse.

1. No. 10. *10-guttatus.*

II. Klasse.

1. No. 13. *Buprestoïdes.*
2. No. 14. *Fastigiatus.*
3. No. 15. *Lividus.*
4. No. 17. *Complanatus.*
5. No. 20. *Spinipes.*
6. No. 22. *Melanocephalus.*
7. No. 23. *Vaporariorum.*
8. No. 25. *Ferrugineus.*
9. No. 31. *Velox.*
10. No. 32. *Multipunctatus.*
11. No. 33. *2-punctatus.*
12. No. 34. *4-pustulatus.*
13. No. 36. *Meridianus.*
14. No. 37. *Testaceus.*
15. No. 42. *Atricapillus.*
16. No. 43. *Truncatellus.*

*) Nicht abgebildet.

NEUE LAUFKAEFERARTEN.

I. *Große.*

1. *Intricatus*, der *Laufkäfer mit verwickelten Streifen auf den Flügeldecken.**)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 217. No. 780.
Violaceo-niger; *elytris intricatis* elevato-striatis punctatisque.
Pontopp. N. G. v. D. p. 210. No. 10. t. 16.
— — Atl. Dan. I. t. 29.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 75. N. 804.
Elytris intricato-striatis punctatisque.
In *Syst. Linn.* deest.

2. *Punctato-sulcatus*, die *Punktfurche.*

Müller l. c. S. 357. unter No. 12. t. 7. f. 14.
Thorace rubro-cupreo; *elytris* viridibus, punctato-viridi-nitentibus sulcis. *Variatio Sycophantae.*

3. *Nemoralis*, der *Waldlaufkäfer.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 21. No. 211.
Elytris aeneis; *lineolis* intricatis subrugosis; *punctis* cavis triplici serie.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 75. No. 809.
Niger, *elytris* aeneis, rugosulis etc.

4. *Serrator*, der *Kahirische Zahnrand.*

Forskähl Descript. Animal. p. 77. No. 4. *Magnus; apterus.*
Coleoptris ovatis, subplanis, pone truncatis, nigris; *maculis* inaequalibus albis.

In

*) *Skop.* No. 264. ist ungewiss, ob dieses sein *Catenulatus* sey.

In Desertis *Kahirinis* rarior. Sui generis *pulcherrimus*. *Elytrorum* margines subtiliter dentati, quibus, dum femora postica velocissime affricat, *mirum magnumque producit strepitum.*

5. *Rubicundus*, der *russische Erdkäfer mit röthlichen Flügeldecken.*

Lepech. Tageb. II. S. 195. t. 10. f. 1. *russ.* Szemljänoi Shuk.

Apterus, subtus niger; *thorace* violaceo; *elytris* rubicundis, sutura, atque marginibus albis.

6. *6-guttatus*, der *indianische Sechstropf.*

Fabric. S. E. p. 236. No. 4.

Apterus; thorace postice angustato; *elytris* laevibus, atris, punctis duobus griseis.

7. *4-guttatus*, der *kapensische Viertropf.*

Fabric. S. E. p. 236. No. 5.

Apterus; thorace postice attenuato, *elytris* sulcatis, atris; *maculis* duabus griseis remotis.

8. *Tabidus*, der *kapensische schäbichte Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 237. No. 6.

Apterus; thorace postice angustato, ater; *elytris* rugoso-sulcatis.

9. *Calidus*, der *amerikanische dreyreihichte Goldpunkt.*

Fabric. S. E. p. 237. No. 8.

Apterus; niger, *elytris* crenato-striatis; *punctisque aureis*, excavatis, triplici serie.

10. *Retu-*

10. *Retusus*, der *patagonische aufgestumpfte Erzpunkt.*

Fabric. S. E. p. 237. No. 9.
Apterus; elytris striatis, virescentibus; *punctis aeneis*, excavatis, triplici serie, *basi retusis.*

11. *Maderae*, die *maderische Stumpfflügeldecke.*

Fabric. S. E. p. 237. No. 10.
Apterus; ater; *elytris* basi retusis.

12. *Convexus*, der *teutsche convexe Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 238. No. 11.
Apterus; ater, *convexus*, laevis; *thorace* postice emarginato.

13. *Suturalis*, die *Feuerländische Goldnaht.*

Fabric. S. E. p. 238. No. 13.
Apterus; elytris striatis, viridibus; *sutura aurea.*

14. *Porcatus*, der *neuholländische tiefgefurchte Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 239. No. 16.
Apterus; ater; *elytris* striatis, apice granulatis.

15. *Scrutator*, der *virginische Spion.*

Fabric. S. E. p. 239. No. 19.
Alatus; elytris striatis, viridibus, punctis triplici serie; *thorace* cyaneo; margine reflexo, inaurato.

16. *Catenulatus*, *Skopolis Kettenlaufkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 264.

Elytrum porcatum; striis tribus punctorum elevatorum, (in qualibet 15-16), quibus interjacent tres aliae striae elevatae scabriusculae.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 383.

17. *Aeneo-punctatus*, der *schwedische Erzpunkt.*

de *Geer* Ins. T. IV. p. 87. No. 1. t. 3. f. 12. *Carabé bronzé à points dorés.*

Apterus; supra viridi-aeneus obscurus; subtus niger; *elytris punctis* excavatis *aureis*, quadruplici ordine; *sulcis* elevatis.

II. *Kleine Laufkäfer.*

1. *Bimaculatus*, der *ostindische Zweyfleck.*

Linn. Mant. p. 532.

Niger; fascia communi flava interrupta, *antennis pedibus*que testaceis.

Fabric. S. E. p. 243. No. 36.

Niger; *capite; thoracis* maculis duabus, *elytrisque* puncto baseos fasciaque media ferrugineis.

Sulzers Gesch. S. 62 t. 7. f. 5. der *Zweyfleck.*

Müllers Suppl. B. S. 250. 44. der *Zweyfleck.*

2. *Bimaculatus*, der *Degeerische Zweyfleck.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 102. No. 20. *Carabé à deux taches jaunes.*

CARABVS *(bimaculatus) alatus*, supra niger, subtus flavus; *elytris* maculis binis, pedibus antennisque flavis.

An *Müllleri* Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 840. C. *bimaculatus?*

Niger; *capite*, *thorace*, *elytrisque* viridibus; *macula* baseos pedibusque fulvis.

An *Scop.* Ent. carn. No. 274. *Bimaculatus?*
Niger, villosus; *elytri gutta* baseos palpis, antennis, basi, tibiisque rufis.

3. *Bimaculatus*, der *Müllersche Zweyfleck.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 849.
Nigro-coeruleus; *elytris* flavis; *macula* didyma, fusca.

4. *Minimus*, der *Müllersche kleinste Laufkäfer.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 21. No. 212.
Thorace subnigro; *pedibus*, *antennis* elytrisque striatis fuscis.
In *Herbario* meo; vix *pediculi* magnitudine.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 833.

5. *Dorsalis*, der *dänische Grünfleck.*
Pontopp. Atl. D. I. t. 29.
— — N. G. v. D. p. 211. t. 16.
Br. Inf. Siael. p. 29.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 846.
Flavus; *elytris* striatis; capite, thorace, *maculaque* apicis elytrorum *viridi.*

6. *4-guttatus*, der *dänische Viertropf.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 211. t. 16.
Capite, *thoraceque* coeruleo nitido, *pedes* et basis *antennarum* ferruginei; *elytra* fusca, singula *maculis 2 albis*, quarum vna ad basin, altera ad apicem.

7. *Marginatus*, der *Interische gerändelte Laufkäfer.*
Pallas Reis. I. App. No. 39.

Inter

Inter mediocres *major*. Subtus ater; *pedibus* testaceis; *supra* obscure viridis; *elytra* striata; *margine* laterali griseo-lutescente. Circa lacum *Interiensem*.

Müllers Suppl. B. p. 250. t. 45. der *Randkäfer*.

8. *Pictus*, der *gemalte Laufkäfer*.

Pallas Reis. I. App. No. 40.

E mediocribus valde *depressus*. *Thorax* testaceo-rufus. *Caput* cum antennis testaceum. *Pedes* pallide grisei; *elytra* subtiliter striata-grisea. — In campis aridissimis sub *cadaveribus* torrefactis.

Müllers Suppl. B. p. 230. t. 46. der *Eckfleck*.

9. *Sericeus*, der *amerikanische grüne Sammetkopf*.

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 58. No. 58.

Alatus ater; *capite*, *thorace* et *elytris* viridi-nitentibus; *antennis pedibusque* rufis.

10. *Lineatus*, der *nordamerikanische lineirte Laufkäfer*.

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 59. No. 59.

Niger, *thorace* ferrugineo; *elytris* griseis, suturae *linea* communi, alteraque in singuli elytri medio nigra; ante apicem desinente, *pedibus* griseis; *tarsis* nigris.

Fabric. S. E. p. 244. No. 45. *Lineola*.

Thorace subaequali, ferrugineus; *elytris* lineola nigra. In *America* septentrionali.

11. *Striatulus*, der *patagonische Strichlaufkäfer*.

Fabric. S. E. p. 240. No. 24.

Niger; *thoracis* basi vtrinque puncto impresso; *elytris* striatis medio glabris.

12. *Cali-*

12. *Caliginosus*, der *amerikanische düstere Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 240. No. 25.
Ater; *thorace* quadrato, laevi, *antennis* piceis.

13. *Arenarius*, der *cambrische Sandlaufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 241. No. 26.
Pallidus; *elytris* maculis duabus dorsalibus atris.

14. *Bicolor*, der *amerikanische Zweyfarbige.*

Fabric. S. E. p. 241. No. 28.
Supra niger; *subtus* ferrugineus.

15. *Femoralis*, die *afrikanische Rothhüfte.*

Fabric. S. E. p. 241. No. 30.
Capite thoraceque aeneis; *elytris* striatis, obscuribus; *femoribus* rufis.

16. *Madidus*, der *englische gewässerte Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 241. No. 31.
Thorace postice vtrinque impresso, niger; *femoribus* rufis. *Corpus* atrum, quasi *humore inunctum.*

17. *Interruptus*, der *morgenländische unterbrochene Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 242. No. 32.
Ater; *thorace*, postice rotundato, abdomineque *remotis.*

18. *Spinibarbis*, der *englische Dornrücken.*

Fabric. S. E. p. 243. No. 37.
Thorace orbiculato, cyaneus; *ore antennis tibiisque* rufis - dorso *spinis* ciliato.

19. *Pili-*

19. *Pilicornis*, das *englische Borstenhorn.*

Fabric. S. E. p. 243. No. 38.

Thorace rotundato; *elytris* striatis punctisque impressis; *antennis pilosis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 10. Le *Bupreste à six points enfoncés.*

Nigro-viridis; elytro singulo *striis octo, punctis tribus* impressis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 860. *Seticornis.*

Niger; *elytris* aeneis striato-punctatis; *antennis setiferis.*

20. *Carnifex*, das *Feuerländische Blutmaul.*

Fabric. S. E. p. 244. No. 41.

Alatus, viridi-aeneus; *antennis pedibusque* rufis; *thorace* angustato; *ore* ferrugineo.

21. *Azureus*, der *leipziger himmelblaue Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 244. No. 43.

Cyaneus; antennis pedibusque *rubris.*

22. *Pallens*, der *dresdner blasse Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 244. No. 47.

Pallidus; *elytris* striatis.

23. *Aeneus*, der *leipziger kupferfarbige Garten-Laufkäfer.*

Fabric. S. E. p. 245. No. 48.

Subaeneus; *elytris* punctis vagis plurimis impressis.

24. *Flexuosus*, der *ostindische Eckfleck.*

Fabric. S. E. p. 246. No. 54.

Niger; *elytris* ferrugineis; *macula media sinuata,* punctoque apicis, nigris.

25. *Rufescens*, der *englische Fuchs.*

Fabric. S. E. p. 247. No. 58.

Thorace rotundato, ferrugineus, *vertice anoque* nigris.

26. *2-pustulatus*, die *englische Zweyblatter.*

Fabric. S. E. p. 247. No. 59.

Thorace orbiculato; *elytrisque* nigris; *maculis* duabus rufis.

27. *Lunatus*, der *englische Mondfleck.*

Fabric. S. E. p. 247. No. 60.

Thorace orbiculato, rufo; *elytris* flavis: *maculis tribus nigris.*

28. *Comma*, das *amerikanische Comma.*

Fabric. S. E. p. 248. No. 63.

Niger; *thorace* fusco; *elytris* griseis; *macula lineari nigra.*

29. *4-guttatus*, der *englische Viertropf.*

Fabric. S. E. p. 248. No. 65.

Thorace rotundato, atro; *elytris* nigris; *punctis quatuor albis.*

30. *Sex-pustulatus*, die *ostindische Sechsblatter.*

Fabric. S. E. App. p. 825. — 36-37.

Rufus; *elytris* nigris; *punctis sex rubris.*

31. *Elegans*, der *Skopolische zierliche Laufkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 269.

Thorax longitudine sua elytri latitudinem non superans, pone et antice aeque latus. *Pedes* rufi; *corpus alatum.*

32. *Me-*

32. *Metallicus*, der *metallfarbige Laufkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 270.

Supra *aeneus* nitens; *thorace* lateribus conniventibus, vt in *Scarabaeis;* antennis basi fulvis.

33. *Cordatus*, der *Herzschild.*

Scop. Entom. carn. No. 271.

Thorax vere obcordatus.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 384.

34. *Iunceus*, der *Binsenlaufkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 272.

Statura vulgaris, sed *thorax* pone angustior, eodemque modo constructus, vt in *Granulato.*

Füeßlins Verz. S. 19. No. 385.

35. *Marginatus*, der *Braunrand.*

Scop. Ent. carn. No. 275.

Caput et thorax aeneo-viridis coloris; *elytrum* testaceum; margine toto, fasciaque fuscis.

36. *Salicinus*, der *Sahlweidenlaufkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 276.

Niger, punctatus; *elytris* fuscis striatis; antennis pedibusque ferrugineis.

37. *Arenarius*, der *Skopolische Sandlaufkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 277.

Aeneo-fuscus; *thorace* subrotundo, pone dentato; *pedibus* rufis.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 386.

38. *Rufescens*, der *kleine Fuchs.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 103. Fusco-rufus, parvus; *thorace* rotundato; *elytris* striatis.

39. *Lucidus*, der *ungarische glänzende Laufkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 104.
Niger, nitens, parvus; *elytris pedibusque* testaceis.

40. *Fenestratus*, der *Fensterfleck.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 812.
Niger; *elytris* fuscis; *maculis* obliquis flavis, *fenestratis.*

41. *Punctatus*, der *punktirte Laufkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 814.
Niger; tibiis tarsisque piceis; *elytris* punctis impressis, serie flexuosa.

42. *Rufipes*, der *Müllersche Rothfuß.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 816.
Niger; *elytris* aeneis; *pedibus antennisque* fulvis.

43. *Virens*, der *Grünling.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 817.
Niger, *supra* aeneo-viridis.
Schaeff. Icon. t. 18. f. 4.

44. *Nigricans*, der *Schwärzling.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 819.
Ater; *elytris, antennis, palpis pedibusque piceis.*

45. *Agilis*, der *Läufer.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 823.
Piceus; *capite, thorace elytrisque* striatis, nigris.
Act. Nidr. IV. 32.

46. *Coeru-*

46. *Coeruleus*, der *Himmelblaue.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 827.

Niger; *elytris* cyaneis; *antennis*, *palpis pedibusque* fulvis.

47. *Similis*, die *gestreifte etwas punktirte Flügeldecke.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 828.

Niger; thorace postice vtrinque excavato; *elytrorum* striis subpunctatis.

48. *Obscurus*, der *dunkelbraune Laufkäfer.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 829.

Niger; *elytris* pedibusque obscure testaceis.

49. *Aestivus*, der *Sommerlaufkäfer.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 832.

Flavus; *capite* ferrugineo; *thorace elytrisque* nigris.

50. *Flexilis*, der *Gedrehete.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 837.

Flavicans; *capite* nigro; *elytris* lividis.

Act. Nidr. IV. 30.

51. *Laevis*, der *Glatte.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 841.

Aeneus; *capite thoraceque* viridi; *elytris* cupreis absque punctis; *pedibus* piceis.

52. *6-punctatus*, der *Müllersche Sechspunkt.*

Müllerí Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 842.

Niger; supra aeneus; *elytris* punctis tribus longitudinaliter impressis; *pedibus* piceis.

53. *Vernalis*, der *Frühlingslaufkäfer.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 847.
Niger; *antennis*, palpis pedibusque flavis; *elytris* striato-punctatis.

54. *Pullus*, der *Bräunling.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 848.
Niger; *elytris* striatis; *pedibus* piceis.

55. *Ater*, der *ganz Schwarze.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 851.
Niger; *elytris* striatis; *unguibus* subferrugineis.

56. *Atro-rufus*, der *Schwarzfuchs.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 857.
Ater; *subtus* rufus; *elytris* mollibus.
Act. Nidr. IV. 31.

57. *Oricalcicus*, der *Messingglanz.*
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 79. No. 859.
Pallide flavus; *supra* aeneus.

58. *Rufipes*, der *Geoffroische Rothfuß.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 146. *Bupr.* 8. Le *Bupreste noir à pattes rougeâtres.*
Niger; *elytro* singulo *striis octo* punctatis; *pedibus* ferrugineis.
Fabric. S. E. p. 241. No. 27. *Ruficornis.*
Ater; *elytris* sulcatis, laevibus; antennis pedibusque rufis.
Lister Scar. Angl. 390. 24.
Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 78. No. 843. *Cursor.*
Niger; *antennis pedibusque* ferrugineis; *elytris* striato-punctatis.

59. *Rufi-*

59. *Ruficornis*, das *Müllersche Rothhorn.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 9. Le *Bupreſte noir à pattes jaunes.*

Niger; *elytro* ſingulo *ſtriis octo* laevibus; *pedibus lividis.*

Müller Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 826.

Ruficornis; niger, glaber; *elytris* ſtriatis; *antennis, palpis, pedibusque* fulvis.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 95. No. 10. *Carabé noir à antennes rouſſes.*

Alatus, niger; *antennis rufis;* pedibus, corporeque ſubtus fuſco-caſtaneis; *elytris* ſtriatis.

60. *Viridi-punctatus*, der *grünpunktirte Laufkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 147. *Bupr.* 11. Le *Bupreſte vert pointillé à huit ſtries et pattes fauves.*

Viridis, punctatus; *elytro* ſingulo *ſtriis octo*; pedibus pallidis.

61. *Viridi-nitidus*, der *Grünglanz.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 148. *Bupr.* 12. Le *Bupreſte vert liſſe, à huit ſtries et pattes fauves.*

Elytro ſingulo ſtriis octo; *pedibus* pallidis; *punctis tribus* impreſſis.

62. *Viridi-fulvus*, der *Grüngelbe.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 148. *Bupr.* 13. Le *Bupreſte à etuis verts et bruns.*

Viridis; *elytro* ſingulo *ſtriis octo*, pedibus, elytrorumque antica parte et margine *fulvis.*

63. *Viridi-cupreus*, der *Kupferschild.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 149. *Bupr.* 15. Le *Bupreste à corcelet cuivreux.*

Niteris; *capite elytrisque* viridibus; *thorace cupreo;* punctulis duodecim.

64. *Nobilis*, der *rare fontainebleauische schwarze Ritter.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 150. *Bupr.* 17. Le *Chevalier noir.*

Niger; *thorace atro;* elytris rubris, *eruce nigra.*

65. *Striato-quater-maculatus*, der *Vierfleck mit gestreiften Flügeldecken.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 152. *Bupr.* 22. Le *Bupreste quadrille à corcelet plat brun, et etuis striés.*

Niger; *thorace* plane ferrugineo; *elytris striatis;* maculis quatuor lividis.

66. *Nigro-thoracicus*, der *Vierfleck mit schwarzem Halsschilde.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 152. *Bupr.* 23. Le *Bupreste quadrille, à corcelet plat et noir, et etuis striés.* *)

Niger; *thorace plane nigro;* elytris striatis; maculis quatuor lividis.

67. *8-maculatus*, der *Achtfleck.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 153. *Bupr.* 24. Le *Bupreste noir à huit taches fauves.*

Niger; *elytris* striatis; *maculis octo lividis.*

68. *Minu-*

*) Diese beyden No. 65. und 66. sind von des *Linn.* 4-maculato No. 41. sehr wenig verschieden. Der erste in den *gestreiften* Deckschilden; der zweete im *schwarzen* Halskragen.

68. *Minutulus*, der *Geoffroiſche Kleine.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 153. *Bupr.* 26. Le *Bupreſte noir ſans ſtries.*

Totus niger, laevis.

69. *4-punctatus*, der *Geoffroiſche Vierpunkt.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 157. *Bupr.* 32. Le *Bupreſte à quatre points enfoncés.*

Cupreo-viridique variegatus, *punctis quatuor* impreſſis; *pedibus* pallidis.

70. *Tenebrioïdes*, der *mehlkäferartige Laufkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 159. *Bupr.* 34. Le *Bupreſte pareſſeux.*

Ater; *thorace* lato; *elytrorum* ſtriis punctatis.

71. *Latus*, der *Breitſchild.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 159. *Bupr.* 35. Le *Bupreſte verdet.*

Totus viridis; *thorace lato.*

72. *Niger*, der *Trauerlaufkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 160. *Bupr.* 37. Le *Bupreſte en deuil.*

Totus niger; *thorace* lato laevi; *elytrorum* ſtriis laevibus.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 76. No. 820.

Ater; opacus; *palpis antennisque* fulvis; *tibiis tarſisque* ferrugineis.

73. *Nigro-ſericeus.* der *ſchwarze Sammetkäfer.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 160. *Bupr.* 38. Le *Bupreſte noir velouté.*

Ater, *ſubvilloſus*; antennis pedibusque ferrugineis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 825.

Pubescens, niger, tomentosus; *elytris* striatis; *antennis*, *palpis*, *pedibusque* fulvis.

74. *Fuscipes*, der *Braunfuß.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 161. *Bupr.* 39. Le *Bupreste noir à pattes brunes.*

Ater, laevis; *pedibus* antennarumque basi ferrugineis. *)

75. *Rufipes*, der *Degeerische Rothfuß.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 96. No. 11. *Carabé brun à pattes rousses.*

Alatus, fuscus; elytris striatis; *corpore* subtus rufescente; *pedibus antennisque* ferrugineis.

Schaeff. Icon. t. 18. f. 7.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 830? *Fulvus*, totus flavus, nitidus; *elytris* striatis.

76. *Varius*, die *Buntschecke.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 98. No. 15. *Carabé bronzé.*

C. *aeneus; alatus;* corpore ovato brevi *supra* nigro aeneo, *subtus* nigro; *thorace* convexo; *elytris* laevibus; *antennis* basi rufis.

Müllleri Zool. Dan. Prodr. p. 77. No. 824. *Varius*, niger; *elytris* striatis; *antennis* basi rubris.

77. *4-punctatus*, der *Degeerische Vierpunkt.*

de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 102. No. 21. *Carabé à quatre points.*

Alatus, niger nitidus; *elytris* substriatis; *punctis quatuor* impressis.

78. *Pensyl-*

*) Hier sind die übrigen *neuen Bupreſtides* des *Geoffr.* nachgeholt worden, wie ich bey den *Cicindelis* versprochen hatte.

78. *Pensylvanicus*, der *pensylvanische rothbraune Laufkäfer.*

de *Geer* Ins. T. IV. p. 108. *exot.* No. 4. t. 17. f. 22. *Carabé de Pensylvanie.*

Rufo-fuscus; capite obscuro; *antennis*, pedibus corporeque subtus testaceis; *elytris* striatis.

214. GESCHLECHT. Tenebrio; *Mehlkäfer; Schlupfkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. B. 1. Th. S. 367. *Mehlkäfer.*

Börners

*) Die Larven dieser Käfer halten sich im Mehl, im Holz, und wie die Käfer selbst auch in Löchern der Erde, an dunkeln Orten in Küchen, Kellern, Speisekammern und in Mühlen, in den Beckerhäusern, und besonders im *Auskehricht* auf. Man darf des Sommers nur in einem düstern Winkel der Hausflur, oder einer Speisekammer, etwa 14 Tage ein Häufchen Kehricht liegen lassen; so findet man gewiss welche darinnen. Die Käfer haben einen schleichenden Gang, und wandeln in der Finsterniss. Man könnte sie füglich auch *Schattenkäfer* nennen.

Verschiedene Schriftsteller haben einige Chrysomelas, Silphas, Carabos und Dermestides *Linn.* zu diesem Geschlecht gerechnet. So ist nach *Fabric.* S. E. p. 117. No. 5. Chrys. Linn. *Sulphurea* des *Geoffr. Tenebrio lutea:* Tom. I. pag. 351. No. 11. Eben derselbe p. 94. nennet Linn. TENEBR. *laevigat.* No. 29. CHRYSOMELAM *tenebricosam.* Nach dem *de Geer* T. V. p. 32. ist sein TENEBRIO *varioloſus* des *Linn.* ATTELABUS *Cerambοïdes* p. 621. No. 12. Ferner dessen TENEBRIO *rugosus* p. 43. des *Linn.* SILPHA *rugosa* p. 571. No. 16. Ferner dessen TENEBRIO *villosus* p. 44. *Linn.* CHRYSOMELA *hirta* pag. 602. No. 119. Ferner dessen TENEBRIO *hirticornis* pag. 47. des *Linn.* HISPA *muticus* p. 604. No. 4. und DERMESTES *clavicornis* Faun. Suec. ed. 2. No. 413. Ferner dessen TENEBRIO *Boleti* p. 49. des *Linn.* CHRYSOMELA *Boleti* p. 591. No. 36. und des *Geoffr.* DIAPERIS Tom. I. p. 337. No. 1. t. 6. f. 3. Endlich dessen TENEBRIO *Surinamensis* p. 54. des *Linn.* DERMESTES *Surinamensis* p. 565. No. 29.

Börners Samml. etc. I. S. 477. *Mehlkäfer.*
Eberhards Thiergesch. S. 197. *Mehlkäfer.*
Beckmanns Anfangsgr. der N. H. S. 95. gen. 11. *Hausschabe.*
Hanovs Seltenh. der N. I. S. 341. No. 2.
Sulzers Kennz. S. 91. *Hausschabe.*
— — Gesch. S. 63. *Schlupf- Schliefkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 211.
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 19. *Schlupfkäfer.*
Lessers Theol. der Ins. p. 109. f. *Mehlkäfer* p. 89. 283.
Brünnichii Entom. p. 49. *Tenebrio;* dän. *Skrubbe.*
Comment. Lips. Dec. I. Vol. V. p. 608.
Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 555. *Scarabaeoli pistrinarii; Mehlkäfer; Mühlkäfer. Hesych.* Mylakrídes, Mylakríae; *Dioscor. Silph.* artokopeíoon.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 224.
Scop. Entom. carn. p. 81.
— Ann. 5. hist. nat. p. 108.
Bomar. Dict. des Anim. XI. 218.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 74.
Fabric. S. E. p. 249. *Scarites;* p. 250. *Sepidium;* p. 251. *Pimelia;* p. 253. *Scaurus;* p. 254. *Blaps;* p. 255. *Tenebrio;* p. 257. *Helops;* p. 258. *Erodius.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 345. *Tenebrion.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. préf. XI. No. 57. Tom. V. p. 29. Des *Tenebrions.*
Ionston hist. nat. Ins. p. 111. t. 16.
BLATTA *mollis, molendinaria, foetida.* (*Molitor* et *mortisag.* Linn.)

I. *Geflügelte.*

1. *Gigas,* der *surinamische Riese.*
Müller l. c. S. 368. No. 1.
Sulzers Gesch. S. 64. t. 7. f. 7. der *Bergriese.*

2. *Moli-*

2. ***Molitor***, der *europäische Müllerkäfer.**)

Müller l. c. S. 368. t. 8. f. 1. 2.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 387. der *Müller.*

Börners Samml. 1. pag. 478. In den *Häusern der Becker und Müller.*

Frisch Ins. 3. Th. S. 1. t. 1. Von dem *gelben Mehlwurm und dem schwarzen Käfer daraus.***)

Sulzers Gesch. S. 63. der *Müller.*

Pontopp. N. G. v. D. S. 211. *Bilde.*

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 45. *Attelabus* ater, oblongus depressus, die *schwarze Pfützenwanze.*†)

Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 547. *Mordella* antennarum etc.

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 513. BLATTA *frumentacea; Sitophagus, Blatta mollis* Dalechamp. Ein *Mehlwurm.* In *pistrinis* et apud *pistores* in *farina. Lusciniae has avidissime legunt, quibus facile capiuntur. A morbis familiaribus eas liberant.*

Schaeff. Icon. t. 66. f. 1. (teste *Fabric. Füeßlin* et *de Geer*).††)

Fabric. S. E. p. 255. *Tenebrio* 2.

Oblongus, piceus; *elytris* striatis.

Raj.

*) *Schwenkfeld* wuste schon, dass die Larven dieses Käfers ein Leckerbissen der *Nachtigallen* wären, und dass sie solche, wie die Hühner die *Spinnen*, um sich von gewissen *Krankheiten* zu kuriren, überaus gern frässen.

**) *Linné* hat *Frischens* 4. Th. und *Geoffr.* I. p. 34. t. 6. unrichtig angeführt. Im leztern muss es pag. 349. No. 6. heissen. Ich habe angemerkt, dass alle *Linn.* Druckfehler und Unrichtigkeiten in *Fabric.* S. E. stehen geblieben.

†) Im 2ten Theile der *Onomat.* hist. nat. heissen die *Mordellae* noch *Pfützenwanzen.*

††) Nach *Mülleri* Zool. Dan. Prodr. pag. 74. No. 792. ist dieser *Schäfferschc* Ten. *culinaris* Linn. No. 5.

Raj. Inf. p. 4. *Larva.* Vermis farinarius.
Müllerí Faun. Fridr. p. 21. No. 213. *Totus niger.*
— — Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 794.
Ater; *elytris* punctis distantibus striatis.
Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 349. No. 6. Le *Tenebrion à neuf stries lisses.*
Atra, oblonga; *elytris* striis novem laevibus.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 34. No. 3. t. 2. f. 4. *Tenebrion de la farine.*
Alatus, nigro-fuscus, *subtus* castaneus; *corpore* oblongo; *elytris* striatis.

3. *Chalybeus*, der *guineische Stahlmehlkäfer.*
Müller l. c. S. 369. No. 3. der *guineische Stahlkäfer.*
Fabric. S. E. p. 255. *Tenebrio* 3.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 53. *exot.* No. 4. t. 13. f. 11. *Ténébrion verd-cuivreux.*
Aeneus; alatus, niger; *elytris* striato-punctatis, aeneis, coerulescentibus.

4. *Mauritanicus*, der *algierische Zahnschild.*
Müller l. c. S. 369. No. 4.
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 52. *exot.* No. 2. t. 13. f. 9. *Ténebrion maure.*
Alatus, nigro-fuscus nitidus; *elytris* punctato-striatis; *thoracis* marginibus antice posticeque, *dente angulatis.*

5. *Culinaris*, der *Küchengast.*
Müller l. c. S. 370. No. 5.
Füeßlins Verz. schweiz. Inf. S. 19. No. 389. der *Küchengast.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 546. *Mordella* ferrugineo-rufa etc.

Müllerí

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 792.
Oblongus, ferrugineus; *elytris* striatis.*)

6. *Barbarus*, der *afrikanische Tellerschild.***)
Müller l. c. S. 370. der *Afrikaner.*

7. *Fossor*, der *Sandgräber.*
Müller l. c. S. 370. No. 7. der *Hügelgräber.*
Füeßlins Verz. S. 19. No. 390. der *Gräber.*
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 962. *Fossor* (Tenebrio) der *Schattenkäfer mit gespaltnen Pfoten.*
Fabric. S. E. p. 249. *Scarites* 3. *Arenarius.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 543. *Mordella* rufa, tibiis anticis dentatis.
Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 793. Niger, *antennis pedibusque rufis.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 350. No. 1. t. 13. f. 1. 2. *Attelabe laboureur.*
ATTELABVS *(Fossor)*, niger nitidus; *elytris* sulcatis; *tibiis* anticis *palmato-spinosis.*†)

8. *Cur-*

*) Derselbe hat No. 797. noch einen *Culinarem* angeführt: Ferrugineus; *elytris* striatis. Vermuthlich nur eine Abänderung des ersten. Nach ihm ist dies der *Schäfferschе* Icon. t. 66. f. 1. und nicht *Molitor* No. 2. Mithin ist dieser auch *abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) Der Herr *de Geer* hat l. c. bewiesen, dass er nicht unter die *Tenebriones*, sondern *Attelabos* gehöre.

Bey dem *Geoffr.* Ins. T. I. p. 347. No. 2. t. 6. f. 6. kömmt auch ein *Sabulosus* vor, der aber *ungeflügelt* ist, und dieser wohl nicht seyn mögte. S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 14. 3. Kl. No. 1.

8. *Cursor*, der *Stubenläufer.**)

Müller l. c. S. 370. No. 8.
Onomat. hist. nat. P. 3. p. 531. *Cursor* (Tenebrio) der *Läufer.*
Fabric. S. E. p. 249. *Scarites* 4.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 798.
Fuscus; *thorace* oblongo, tricarinato, rugoso, vtrinque denticulato; *elytris* substriatis.

9. *Erraticus*, der *Schwärmer.***)

Müller l. c. S. 371. der *Streifer.*

10. *Pallens*, der *muschelfahle mit schwarzen Augen.****)

Müller l. c. S. 371. No. 10. *Blaßrücken.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. No. 531.
Carabus pallide testaceus, oculis nigris.

11. *Depressus*, die *schwedische Plattbrust.*†)

Müller l. c. S. 371. No. 11. die *Plattbrust.*

12. *Minutus*, das *upsalische kleine Mehlkäferchen.*††)

Müller l. c. S. 371. No. 12. die *Mignatur.*
Fabric. S. E. p. 250. *Scarites* 6.
Clavicornis, piceus; *antennis clavatis.*

13. *Quisquilius*, der *Kehrichtkäfer.*†††)

Müller l. c. S. 372. das *Roßmaul.*
Fabric. S. E. p. 238. *Helops* 8.
Niger; *antennis pedibusque* ferrugineis.

II. *Unge*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*
†††) *Nicht abgebildet.*

II. *Ungeflügelte.*

14. *Gigas*, der *spanische Riese.*

Müller l. c. S. 372. No. 14.

Sulzers Gesch. S. 64. t. 7. f. 9. der *spanische Riese.*

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 1.

Nigra; *thorace* rotundato; *elytris* laevibus, obtusis.

15. *Mortisagus*, der *Todtenprophet.**)

Müller l. c. S. 372. No. 15. t. 8. f. 3. der *Stinker.*

Füesslins Verz. S. 19. No. 332. der *Stinker.*

Sulzers Kennz. t. 7. f. 52. (all. *Füesslin*, also nicht nach dem LINN. *Molitor.*)

Onomat. hist. nat. P. 2. p. 216. BLATTA *foetida*, die *Hausschabe.*

Frisch Ins. XIII. p. 27. No. 29. t. 25. der *schwarze stinkende Erd- und Mistkäfer.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 822. Suec. *Skrobba.*

It. Oel. p. 62. *Tenebrio* primus.

Schaeff. Elem. t. 124. f. 1. *Tenebrio, Mehlkäfer.*

— — Icon. t. 37. f. 6. (alleg. *Füesslin*, *Fabric.* et *de Geer*).

— — — t. 60. f. 13. (cit. *Fabric.* et *Müllero*).

Dal. pharm. p. 91. *Blatta* officinarum.

List. loqu. p. 388. No. 21. *Scarabaeus* e toto niger, minime nitens, *foetidus?*

Raj. Ins. 90. No. 12. *Scarabaeus* major, totus niger; *abdomine* longo; *elytris* veluti caudatis.

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 513. *Blattae foetidae; Silpha foetens*, σπονδήλη, *Nonn. Erdschaben.*

Insectum odore invisum, *acuta clune*, Cimicum modo *putidum* —

Fabric.

*) *Forskähl* Descr. Animal. p. 79. No. 10. frägt bey seinem *Polychrestus*: An *mortisagus*? S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 9.

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 3.
Atra; *coleoptris mucronatis*, laevibus.
Poda Mus. graec. p. 47.
Scop. Entom. carn. No. 252.
Niger, *apterus;* elytris latere inflexis et abdomen itidem tegentibus, acuminatis; *acumine trigono.*
Müllert Faun. Fridr. p. 21. No. 214.
Apterus; coleoptris mucronatis.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 799.
Niger; *elytris* punctatis, apice mucronatis.
Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 346. No. 1. Le *Tenebrion tisse à prolongement.*
Atra, *aptera;* coleoptris laevibus, pone acuminatis.
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 31. No. 1. *Tenébrion à etuis en pointe.*
Acuminatus, apterus, coleoptris pone acuminatis.

16. *Grossus*, der *afrikanische dicke genervte Mehlkäfer.**)

Müller l. c. S. 373. No. 16. der *Nervenschild.*

17. *Muricatus*, der *spanische Stachelschild.***)

Müller l. c. S. 373. No. 17. der *Stachelschild.*
Fabric. S. E. p. 251. *Pimelia* 4.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 352.? (all. *Fabric.*). Le *Ténébrion canelé.*
Atra; *aptera*, rotundata; *elytris sulcis tribus elevatis.*

18. *Gibbus*,

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.* *Forskähl* Descr. Animal. pag. 80. No. 12. frägt bey seinem *Alexandrinus:* An *muricatus Linn.*? S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 11.

18. *Gibbus*, der *hökrichte Mehlkäfer.*

Müller l. c. S. 373. No. 18.

Fabric. S. E. pag. 240. No. 22. CARABVS *cephalotes.* β.

Scop. Ent. carn. No. 253. *Ventricosus.*

Nigricans; *apterus;* elytris apice deflexis connatis; *abdomine* ovato, turgido.

Parum differt a Linn. *gibbo.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 800.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 51. *exot.* No. 1. t. 13. f. 8. *Tenébrion convexe.*

Apterus niger laeviſſimus; *thorace* orbiculato; *elytrisque* valde elevatis *convexis.*

19. *Coeruleus*, der *himmelblaue Mehlkäfer.*

Müller l. c. S. 373. No. 19. der *Blauling.*

Fabric. S. E. p. 257. *Helops* 1.

— — *elytris ſtriatis.*

20. *Roſtratus*, der *Geſchnäbelte.**)

Müller l. c. S. 373. No. 20. der *Schnabelbohrer.*

Fabric. S. E. p. 240. No. 21.

CARABVS *apterus; elytris* laevibus, nigris; *thorace* anguſtiori; *capite* anguſtiſſimo.

Elytra deflexa, vti in *Tenebrionibus.*

21. *Collaris*, der *afrikaniſche Dickhals.***)

Müller l. c. S. 373. No. 21. der *Dickhals.*

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 11.

Nigra; *elytris* laevibus etc.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

22. *Angulatus*, der *aegyptische gewinkelte Mehlkäfer.**)

Müller l. c. S. 374. No. 22. die *Eckfläche.*

An *Fabricii* S. E. p. 252. *Pimelia 6 angulata?*

Elytris spinosis; *linea* elevata laterali, *serrata.*

Lepechins Tageb. I. pag. 262. h. TENEBRIO *angulatus*, die *viereckigte Hausschabe am Ufer des Lawla.*

23. *Linearis*, der *schwedische schmale Mehlkäfer.***)

Müller l. c. S. 374. No. 23. die *Linie.*

24. *Spinosus*, die *Stachelbrust.*†)

Müller l. c. S. 374. No. 24.

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 8.

Thorace marginato; *marginibus* antice posticeque *spinosis*; elytris striis elevatis, laevibus.

25. *Caraboïdes*, der *laufkäferartige Mehlkäfer.*

Müller l. c. S. 374. No. 25. der *Bastardkäfer.*

Füesslins Verz. S. 20. No. 394.

Sulzers Kennz. t. 7. f. 53. *Talpa* (all. *Füessl.*)

Frisch Ins. XIII. p. 25. No. 26. t. 22. der *schwarze Erdkäfer mit dem herzförmigen Halsschild.* (alleg. *Geoffr.* I. pag. 265. No. 19. et *Linn.* Faun. Suec. ed. 2. No. 825.)

Schaeff. Elem. t. 1. f. 6. (all. *Füessl.*)

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 8.

— — *elytris striatis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 64. No. 5. (all. *Fabric.*)

Platycerus fuscus; *elytris* striatis.

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 265. *Chryfomela* 19. La *Chryfomele à un feul étui.*

Atro-purpurea; elytris coadunatis; *alis nullis.**)

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 801.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 97. No. 7. t. 3. f. 13. *Carabé noir à etuis collés.*

CARABVS *coadunatus*, *apterus*, niger totus; *corpore* ovato brevi; *elytris* coadunatis fcabriufculis.

26. *Silphoïdes*, der *todtengräberartige mauritanifche Mehlkäfer.***)

Müller l. c. S. 375. No. 26. der *Baftardtodtengräber.*

27. *Rugofus*, der *Runzelfchild.****)

Müller l. c. S. 375. No. 27.

28. *Variabilis*, der *franzöfifche Hochpunkt.*†)

Müller l. c. S. 375. No. 28. der *Hochpunkt.*

29. *Laevigatus*, der *afrikanifche Glattfchild.*††)

Müller l. c. S. 376. No. 29. der *Glattfchild.*

*) *Geoffr.* hat felbft bey diefer feiner *Chryfom.* 19. *Linn.* Faun. Suec. ed. 1. No. 595. (die der Ritter hier bey dem *Caraboïdes* citirt), ingleichen *Frifch* 13. p. 25. t. 22. angeführt. *Fabric.* aber S. E. p. 94. glaubt: es fey diefe *Geoffr. Chryfomele* des LINN. Tenebrio *laevigatus* No. 29. den er l. c. CHRYSOMELAM *tenebricofam* nennet. Der *Lefer* kann fich doch nun einigermafsen in diefer Verwirrung finden.

Forfkähl Defcr. Anim. p. 79. No. 7. frägt bey feinem Tenebr. *laevis*: An *Caraboïdes?* S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 6.

**) *Nicht abgebildet.*

***) *Nicht abgebildet.* S. unter den *neuen* 3. Kl. No. 10.

†) *Nicht abgebildet.* ††) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 94. *Chrysomela* 1.

Tenebricosa, ovata, *aptera*, atra; *antennis pedibusque violaceis.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 265. No. 19. (alleg. *Fabric.* v. *Linn.* T. *carab.* No. 25.)

30. *Latipes*, der *afrikanische Breitfuß.**)
Müller l. c. S. 376. No. 30. der *Breitfuß.*

31. *Tibialis*, der *afrikanische Plattfuß.***)
Müller l. c. S. 376. No. 31. der *Plattfuß.*

32. *Femoralis*, der *Dickschenkel.*†)
Müller l. c. S. 376. No. 32.

33. *Striatulus*, die *spanische Strichdecke.*††
Müller l. c. S. 377. No. 33. die *Strichdecke.*

I. *Geflügelte unabgebildete.*

1. No. 6. *Barbarus.*
2. No. 8. *Cursor.*
3. No. 9. *Erraticus.*
4. No. 10. *Pallens.*
5. No. 11. *Depressus.*
6. No. 12. *Minutus.*
7. No. 13. *Quisquilius.*

II. *Ungeflügelte ungeflügelte.*

1. No. 16. *Grossus.*
2. No. 17. *Muricatus.*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*

3. No. 20. *Rostratus.*
4. No. 21. *Collaris.*
5. No. 22. *Angulatus.*
6. No. 23. *Linearis.*
7. No. 24. *Spinosus.*
8. No. 26. *Silphoïdes.*
9. No. 27. *Rugosus.*
10. No. 28. *Variabilis.*
11. No. 29. *Laevigatus.*
12. No. 30. *Latipes.*
13. No. 31. *Tibialis.*
14. No. 32. *Femoralis.*
15. No. 33. *Striatulus.*

NEUE MEHLKAEFERARTEN.

I. *Geflügelte.*

1. *Lanipes*, der *Wollfuß.*

Linn. Mant. p. 533.

Alatus, aeneus; *elytris* subbifido-mucronatis; plantis subtus hirsutis.

Fabric. S. E. p. 257. *Helops* 2.

Aeneus; *elytris striatis*, acuminatis.

Scop. Entom. carn. No. 255.

AENEVS, *(apterus)*, superne aeneus; *elytris* mucronatis, striatis; *manibus mediis* rufo villo barbatis.*)

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 349. No. 5. Le *Tenébrion bronzé.*

Nigro-cuprea; *elytro* singulo striis octo; *coleoptris* pone acuminatis.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 388.

*) *Skopoli* giebt ihn doch für *ungeflügelt* aus.

2. *Viridis*, der *amerikanische Drurische Grün-ling.*

Drury Inf. Tom. II. p. 64. t. 34. f. 5.

TENEBRIO *femoratus, alatus*; totus viridis; *capite* parvo, depreſſo, gibboſo-quadrato; *elytris* laevibus, crenatis; *femoribus* craſſis.

Sulzers Geſch. S. 64. t. 7. f. 8. der *Grüne.*

3. *Buparius*, (*maxilloſus*), der *gibraltariſche Schlupfkäfer mit hervorſtehenden Kinnladen.*

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 61. No. 61.

Alatus, ater, glaber; *thorace* lunato; *maxillis* validis, dentatis, longitudine capitis.

4. *Triſtis*, der *Skopoliſche Trauerſchlupfkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 256.

Alatus, niger; ſubopacus, totus punctis excavatis varioloſus.

5. *Pomonae*, der *Schlupfkäfer auf den Obſtbäumen.*

Scop. Ent. carn. No. 257.

Alatus, ſupra piceus, infra niger; *elytris* ſtriatis: *ſtriis* elevatis quinis.

Larvae duo tresve, reticulo laxo tectae, latent in folio convoluto.

6. *Capreae*, der *Sahlweidenſchlupfkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 258.

Alatus, teſtaceo thorace et elytris, alibi niger; thorace punctis impreſſis.

Füeßlins Verz. S. 19. No. 391.

7. *Flavus*, der *gelbe Schlupfkäfer auf den schirmtragenden Pflanzen.*

Scop. Ent. carn. No. 260.
Alatus, totus flavus, oculis nigris.

8. *Boleti*, der *Schlupfkäfer auf den Baumschwämmen.**)

Scop. Ent. carn. No. 261.
Alatus, ferrugineus; *elytris* nigris; margine undique ferrugineo.

9. *Aestivus*, der *Sommerschlupfkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 795.
Alatus, niger; *palpis pedibusque* flavis.

10. *Striatus*, der *Strichafter.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 74. No. 796.
Alatus, niger; *abdomine* subtus dense striato.

11. *Festinans*, der *schwedische Flüchtling.*

Müllers Suppl. B. p. 252. t. 13. a.
Magnitudine *pediculi; alatus*, totus niger, glaber; *thorace* ferrugineo *Cicindeloïde;* femoribus clavatis.**)

12. *Globosus*, die *russische Hausschabe mit kuglichter Brust.*

Lepechins Tageb. II. p. 209. t. 11. f. 34.
Alatus, ater; *thorace globoso*, scabris lineis duabus elevatis.

*) Conf. CHRYSOM. Linn. *Boleti* p. 591. No. 36.
**) *Linnens*, sagt Herr M. *aber wo?*

13. *Incurvatus*, die *ausgebogene Hausschabe.*

Lepechins Tageb. II. p. 210. t. 11. f. 25.

Alatus, totus, piceus; *elytris* striatis, medio transversaliter impressis.

14. *Arundinaceus*, das *Forskählische Schlupfkäferchen im Nilrohr.*

Forskähl Descr. Anim. etc. p. 78. No. 5. *) t. 24. f. B.

Alatus; obscure ferrugineus, villosus; *antennarum* tribus extimis articulis orbiculatis, majoribus, pallidioribus.

15. *Laevi-*

*) Descriptio ope *Microscopii* facta. Weil die Stelle so wichtige Nachrichten enthält, will ich sie hersetzen:

In Insulis Niloticis *Kahirae* reperi initio Iunii 1762 in culmo *Arundinis niloticae*, inter corticem et medullam, *farinam nigro-bruneam*, in qua paulo profundius *Vermiculi albi* habitabant, *Tenebrionis* hujus, sine dubio *Larvae*, et pulveris illius *architecti.* Quo altius descendebatur, eo durior, pallidior, magisque cohaerens *farina* inventa est, donec demum in infimo caule manebat medulla adhuc alba et intacta. Haec enim arundo pulpa repletur albida, quae vero jam in summitate culmi, cortice delapso extravasata, arida, sinuosa protumuit. Media pars simili modo exarida vndosis pliciş corrugabatur, quarum sinu haerebat ista farina.

Suspicor *spicas segetum* effici *nigras* et quasi adustas *ejusdem hujus Insecti*, vel haud *absimilis* arrosione; illas quippe aggreditur eo tempore, quo in culmo adhuc demersae sunt, vbi plus pabuli invenit, quam in segetibus ipsis, quarum medulla culmi parcior est, corticique adhaerent. Fieri ergo potest, vt sementum hac *farina*, et latente in illa *Insectorum progenie* inquinatum, terrae dum committitur, *noxam lata vicinia* diffundat. Si res ita se habeat, *animal istud* inter *nocentissima*, et hanc ob caussam *maxime notanda* numerabitur. *Minima saepe Insecta gravissimam inferunt perniciem.*

15. *Laevi-octo-striatus*, der *glatte Achtstrich.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 348. No. 4. *) Le *Ténebrion à huit stries lisses.*

Nigro-fusca, ovata; *elytro* singulo *striis octo laevibus.*

16. *Nigro-laevis*, der *Schwarzglatte.*

Geoffr. Inf, Tom. I. pag. 351. No. 8. Le *Tenébrion noir lisse.*

Nigra, *tota laevis; coleoptris* pone rotundatis.

17. *Fulvo-villosus*, der *Braungelbrauche.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 351. No. 9. Le *Tenébrion fauve velu.*

Tota ferruginea, *subvillosa.*

18. *Fulvo-laevis*, der *Braungelbglatte.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 351. No. 10. Le *Tenébrion fauve lisse.*

Tota *ferruginea laevis.*

19. *Lignarius*, der *Holzschlupfkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 38. No. 4. t. 2. f. 15. *Tenébrion du bois.*

Alatus; thorace cavitatibus duabus; *elytris* violaceis f. rufis; *antennis pedibusque* ferrugineis.

20. *Lardarius*, der *Speckschlupfkäfer.*

de *Geer* Inf. Tom. V. pag. 45. No. 7. t. 2. f. 25. 26. *Tenébrion du lard.*

Alatus;

*) Da *Geoffr.* ausdrücklich sagt, wenn ein Tenebr. *apterus* ist; so glaub' ich, dass diejenigen, bey denen ers nicht sagt, *geflügelt* sind.

Alatus; oblongus flavo-fulvus, *oculis* nigris; *elytris* striis punctatis.

21. *Montanus*, der *Bergschlupfkäfer.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 102.
Totus ater; *alatus*; *elytris* opacis.

II. *Ungeflügelte.*

1. *Vncinus*, der *spanische Hüfthaken.*

Forsteri nov. sp. Ins. p. 60. No. 60.
Apterus, niger; *thorace* marginato, subaequali; *elytris* striato-punctatis, angulatisque; *femoribus* anticis clavatis, maximis, *biuncinatis.*

2. *Buprestoïdes*, der *Skopolische prachtkäferartige Schlupfkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 254.
Apterus, atro coerulescens, punctatus; *capite* deflexo; *thorace* lato, pone rotundato.

3. *Buprestoïdes Irtinensis*, der *Pallasische Flugsandschlupfkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 44.
Magnit. *Fossoris*, ovalis depressus, *apterus*, ater, glaber; *clypeus* convexus, vtrinque marginatus; *elytra* connata laevissima; in *arenis fluctuantibus* ad *Irtin.*
Müllers Suppl. B. p. 253. t. 35. der *Erdmehlkäfer.*

4. *Leucogrammus*, die *Weissschrift.*

Pallas Reis. II. App. No. 43.
Apterus; ater, nitidulus, ovatus, subtus gibbus; forma et magn. Ten. *muricato* simillimus; *clypeus* punctis prominulis scaberrimus; *elytra* coalita.
Müllers Suppl. B. p. 253. t. 34.

5. *Aegy-*

5. *Aegyptius*, der *aegyptische Stumpfschild.*

Forskähl Descr. Animal. p. 78. No. 6.

Apterus; thorace subrotundo, antice et pone truncato; *elytris* obsolete punctatis; *striis tribus* elevatis, laevibus dorso planiusculo.

6. *Laevis*, der *alexandrinische glatte Krautschlupfkäfer.**)

Forskähl Descr. Animal. p. 78. No. 7.

Apterus, nitens; *thorace* suborbiculato, marginato; *elytris* laevibus marginatis.

7. *Hispidus*, der *kahirische Stachelschlupfkäfer.***)

Forskähl Descr. Animal. p. 79. No. 8.

Apterus; totus supra *setis hispidus; thorace* teretiusculo.

8. *Vulgaris*, der *Feldschwärmer.*

Forskähl Descr. Animal. p. 79. No. 9.

Apterus; ater; *elytris* latere carinatis, singulis serie *tuberculorum* duplici; *thorace* planiusculo, pone spinoso; *margine* acuto.

9. *Polychrestus*, der *Arzneyschlupfkäfer.*†)

Forskähl Descr. Animal. p. 79. No. 10.

Apterus; elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.

10. *Co-*

*) cf. LINN. *Caraboïd.* No. 25. **) cf. 3. Kl. No. 7.

†) cf. *Linn. mortisagum* No. 15.

Obs. 1) *Foeminae* Turcarum liberae atque servientes albae *artem saginandi* invenerunt in his *Tenebrionibus;* dum *tres* quovis mane et vespere *butyro coctos* comedunt simul cum liquamine.

Obs. 2.)

10. *Cothurnatus*, der *Stelzfuß.*

Forskähl Descr. Animal. p. 80. No. 11.

Apterus, niger; *thorace* laevi, vtrinque antice vnidentato; *elytris* tuberculatis, striis 2 elatis.

11. *Alexandrinus*, der *alexandrinische Frühlingsschlupfkäfer.**)

Forskähl Descr. Animal. p. 80. No. 12.

Niger; *thorace* spina vtrinque obtusa, antice gibbo supra caput; *coleoptris* obtusis, striis 4 aculeatis.

12. *Spinosus*, die *Stacheldecke.*

Forskähl Descr. Animal. p. 80. No. 13.

Apterus, niger; *thorace* teretiusculo; *elytris* margine laterali serratis singulis striis tribus *spinosis*, interjectis *tuberculis* acutis.

13. *Agricola*, der *Ackermann.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 108. No. 101.

Rufescens; *thorace capiteque* nigris.

14. *Sabu-*

Obs. 2.) Contra *Aurium dolorem. Tenebriones* aliquot coque cum oleo puro: huius 2 aut 3 guttulas auri infunde; promta medicina, vixque tribus vicibus repetita curat.

Obs. 3.) Contra *Morsum scorpionis. Tenebriones* 4 vel 5 vivos, hoc enim palmarium est, in aquae copia sufficienti coque operte, spatio $\frac{1}{3}$ horae. Sic decoctum obtinetur colore rubicundo et sapore *Coffeae.* Scorpione laesus bibat scyphulam vnam vel alteram, vulnerique *Tenebrionem dissectum* imponat: praesentissimo auxilio dolor avertitur, qui in his oris intensissimus esse solet per 24 horas, postea sponte cessat; rarissime enim Scorpionis morsus *lethalis* est.

*) cf. LINN. *muricatum* No. 17.

14. *Sabulosus*, der *Sandschlupfkäfer.**)

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 347. No. 2. t. 6. f. 6. Le *Ténébrion ridé.*

Atra, *aptera; coleoptris* rugosis, pone acuminatis.

Füeßlins Verz. S. 20. No. 393.

15. *Strio-punctatus*, der *Geoffroische Strichpunkt.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 348. No. 3. Le *Ténébrion à stries jumelles.*

Nigra; *aptera; elytrorum* striis octo punctatis per paria dispositis.

III. *Neue Schlupfkäfer aus Fabric. S. E. wobey aber nicht angegeben ist, ob sie geflügelt, oder ungeflügelt sind.*

1. *Subterraneus*, der *amerikanische Erdwühler.***)

Fabric. S. E. p. 249. *Scarites* 1.

Ater; *pedibus anticis palmato-digitatis; capite* sulcato.

2. *Cyaneus*, der *neuholländische himmelblaue Schlupfkäfer.*

Fabric. S. E. p. 249. *Scarites* 2.

Glaberrimus; antennis pedibusque nigris.

3. *Arabs*, der *arabische Sägeschild.*

Fabric. S. E. p. 250. *Scarites* 5.

Niger; *thorace serrato;* antennis pedibusque testaceis.

4. *Tricuspidatus*, der *arabische dreygespitzte Brustschild.*

Fabric.

*) cf. LINN. *Fossor* No. 7. **) *Ibid.*

Fabric. S. E. p. 250. *Sepidium* 1.
Thorace tricuspidato; corpore griseo.

5. *Cristatus*, der *aegyptische Federbuschschild.*

Fabric. S. E. p. 250. *Sepidium* 2.
Thorace tricuspidato, *cristato;* corpore variegato.

6. *Striatus*, die *indianische braunroth gestreifte Flügeldecke.*

Fabric. S. E. p. 251. *Pimelia* 1.
Atra, glabra; *elytris striis quatuor rufis.*

7. *Hispidus*, der *arabische Stachelschlupfkäfer.**)

Fabric. S. E. p. 251. *Pimelia* 2.
Atra; *corpore* muricato, *hispido.*

8. *Longipes*, der *arabische Langfuß.*

Fabric. S. E. p. 251. *Pimelia* 3.
Atra; *elytris* connatis, muricatis, *pedibus longioribus.*

9. *Scaber*, die *kapensische Höckerdecke.*

Fabric. S. E. p. 251. *Pimelia* 5.
Atra; *elytris scabris;* antennis pedibusque fuscis.

10. *Rugosus*, die *orientalische Runzeldecke.***)

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 7.
Thorace scabro; *elytris* rugosis, antice angustioribus.

11. *Refle-*

*) cf. 2. Kl. No. 7. **) cf. LINN. *rugosus* No. 27.

11. *Reflexus*, der *orientalische Schlupfkäfer mit zurückgebogenen Schildränden.*

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 9.

Thorace marginato; *marginibus reflexis*; elytris muricatis; *linea* laterali carinata, laevi.

12. *Carinatus*, der *französische Schlupfkäfer mit drey erhabenen Linien auf den Flügeldecken.*

Fabric. S. E. p. 252. *Pimelia* 10.

Nigra; *thorace* orbiculato; elytris *lineis elevatis tribus*, laevibus.

13. *Glaber*, die *orientalische Glattdecke.*

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 12.

Thorace rotundato; *elytris glaberrimis.*

14. *Angustatus*, der *orientalische hinten verengete Halsschild.*

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 13.

Glabra; *thorace postice angustato*, *elytris* acuminatis.

15. *Orbiculatus*, der *orientalische Tellerschild.*

Fabric. S. E. p. 253. *Pimelia* 14.

Glabra; *thorace orbiculato*; *elytris* acuminatis.

16. *Atratus*, der *aegyptische Mohr.*

Fabric. S. E. p. 253. *Scaurus* 1.

Totus ater; glaber; *thorace* suborbiculato; plano, punctato; *elytris* connatis, obtusis, striato-punctatis.

17. *Sulcatus*, die *orientalische gefurchte Flügeldecke.*

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 2.

Coleoptris mucronatis, *sulcatis.*

18. *Excavatus*, der *madraſpatariſche Hohlpunkt.*

Fabric. S. E. p. 254. *Blaps* 4.
Thorace poſtice angulato; *elytris* excavato-punctatis, acutiuſculis.
Petiv. Gazoph. t. 92. f. 14.
Act. Angl. 271. 861. No. 13.

19. *Serratus*, der *afrikaniſche Sägefuß.*

Fabric. S. E. p. 255. *Tenebrio* 1.
Ater, glaber; *elytris* ſtriatis; *tibiis poſticis ſerratis.*

20. *Atratus*, der *nordamerikaniſche Schwärzling.*

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 4.
Oblongus, ater; *elytris* ſulcatis, accutiuſculis.

21. *Abbreviatus*, der *indianiſche Hökerkopf.*

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 5.
Ovatus, ater; *elytris* ſtriatis; *capite* tuberculato.

22. *Cornutus*, der *ſmirnaiſche zweygehörnte Halsſchild.*

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 6.
Thoracis marginibus crenatis angulisque prominulis; *thorace bicorni.*

23. *Sanguinipes*, der *neuholländiſche Rothfuß.*

Fabric. S. E. p. 256. *Tenebrio* 7.
Ater; *antennis pedibusque ſanguineis.*

24. *Serratus*, der *engliſche gezackte Schlupfkäfer.*

Fabric. S. E. p. 257. *Helops* 3.
Niger; digitis ferrugineis, *palpis* porrectis.

25. *Equestris*, der *brasilianische Ritter.*

Fabric. S. E. p. 257. *Helops* 4.
Ater; *elytris* fascia abbreviata, aurea.

26. *Rufipes*, der *neuholländische Rostfuß.*

Fabric. S. E. p. 258. *Helops* 5.
Niger; *elytris*, antennis pedibusque *ferrugineis.*

27. *Luridus*, der *brasilianische Grüngelbliche.*

Fabric. S. E. p. 258. *Helops* 6.
Ater; *pedibus fuscis.*

28. *Ater*, der *leipziger ganz schwarze Schlupfkäfer.*

Fabric. S. E. p. 258. *Helops* 7.
Ater; *elytris* striatis.

29. *Glaber*, der *kleine schwarze europäische Kehrichtschlupfkäfer.*

Fabric. S. E. p. 258. *Helops* 9. Ater, laevis.

30. *Gibbus*, der *arabische Buckel.*

Fabric. S. E. p. 258. *Erodius* 1.
Gibbus, ater; *elytris* lineis elevatis tribus.

31. *Planus*, der *arabische Flache.*

Fabric. S. E. p. 259. *Erodius* 2.
Ater; *elytris* linea elevata, vnica.

32. Minutus, das *kleine orientalische Schlupfkäferchen.*

Fabric. S. E. p. 259. *Erodius* 3.
Ater; *elytris* laevissimis.

215. GESCHLECHT. Meloë; der *Afterkäfer; Maywurmkäfer.**)

Müllers Linn. N. S. 5. B. 1. Th. S. 378. *Maykäfer. holl.* Mey-Torr.

Börners Samml. I. p. 478. *Maywurm.*

Eberhards Thiergesch. p. 203. §. 230. der *Maywurmkäfer.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. p. 95. der *Maywurm.*

Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 20. der *Afterkäfer.*

Sulzers Kennz. S. 92. *Maywurm.*

— — Gesch. S. 65. der *Mayenkäfer; le Proscarabé.*

Neuer Schauplatz der Natur 3. B. S. 123. der *Maywurm;* Meloë.

Schäffers weichschaalichter Kronen- und Keulenkäfer. 4. Regensb. 1763. p. 2. *Maywurm.*

Swammerd. B. der N. p. 119. *spanische Fliegen oder Goldkäfer.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 148. *Meloë.*

Jonston hist. nat. Ins. p. 99. *Proscarabaeus; Pinguiculus; Anticantharus; Oleocantharus; Meloë; Vermis majalis. Tab. XV.*

Bomar. Diction. IX. p. 335.

Comment. Lipsi. Dec. I. Vol. V. p. 608.

Cathol. Litt. E. p. 221.

Pon-

*) *Linné* hat dieses Geschlecht von den *Cantharidibus* abgesondert, und die eigentlichen *spanischen Fliegen (Mel. vesicator.)* dazu gerechnet.

Diese Insekten finden sich im Frühjahre auf den Wiesen, und im Grase; daher man sie auch *Grasküfer* nennen könnte. Sie haben vorzügliche *Arzneykräfte.* Der Name *Maykäfer* ist dem SCARAB. *Melolontha* gar zu eigen; daher mögte für dieses Geschlecht *Maywurmkäfer* oder *Mayling* wohl der bequemste seyn.

Pontopp. N. G. v. D. p. 211.
Brünnichii Entom. p. 50. 51. Dän. *Oliebille.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 227.
Scop. Entom. carn. p. 59.
— Ann. 5. hist. nat. p. 103.
Fabric. S. E. p. 259. *Meloë;* p. 260. *Lytta;* p. 261. *Mylabris;* p. 262. *Cerocoma.*
Müllleri Faun. Fridr. p. 22.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 96.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 339. *Cantharis;* p. 356. *Notoxus;* p. 357. *Cerocoma;* p. 377. *Meloë, Proscarabé.*
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 1. Des *Cantharides.*

I. *Ungeflügelte mit abgekürzten Flügeldecken.*

1. *Proscarabaeus,* der *Zwitterkäfer.**)
Müller l. c. S. 379. No. 1. t. 8. f. 4.
Füeßlins Verz. S. 20. N. 395. der *Wiesen- und Feldafterkäfer.*
Sulzers Kennz. t. 7. f. 54.
— — Gesch. p. 65. t. 7. f. 10. *Zwitterkäfer.*
Franz von Paula Schrank Beytr. zur N. G. S. 72.
MELOE *Proscarabaeus.***)
Schaeff. Elem. t. 82. *Mayenwurmkäfer.*
Lessers Theol. der Inf. p. 69. a. der *Mayling; Maykäfer; Maywurm; Proscarabaeus; Oleocantharus;* p. 283. u. *Maywürmer;* p. 370. x. *Scarabaeus majalis, unctuosus.*
Derrh. Physicoth. 8. B. 4. Kap. p. 920. No. 8. *Hemicoleopteri.*
Frisch Inf. VI. p. 14. t. 6, f. 5. vom *Majenwurm.*

*) Dies ist eigentlich der Alten *Proscarabaeus* und *Anticantharus.*

**) In *Ungarn* so gros als ein *Schröter.*

Onomat. hist. nat. P. 5. 149. der *Maywurm; Maywurmkäfer; Scarabé onctueux de Marechauz.*

Hoefnag. Ins. 2. t. 9.

Charlet. Onom. p. 46. The *Oyl-Beetle, Oyl-Clock.*

Geoffr. mat. med. VI. p. 554-557. *Anticantharus.*

List. Goed. No. 120. *Audax femella; Devoratrix.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 554. *Scarabaeus vnctuosus; Scarabaeus majalis; Cantharis vnctuosa;* Ein *Schmalzkäfer; Erdkäfer; Meyländer; Mayling; Meywurm.*

Catholicon F. pag. 221. *Proscarabaeus; Escarbot; Scarabée onctueux.*

Poda Mus. graec. p. 47.

Fabric. S. E. p. 259. *Meloë* 1.

List. Scar. anglic. 392. No. 27.

SCARABAEVS *mollis*, e nigra viola nitens.

Schroed. pharm. 5. p. 345. CANTHARVS *vnctuosus.*

Müllerі Faun. Fridr. p. 22. No. 216.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1079. *Dan.* Olin-Biller.

Proscarabaeus atro-violaceus.

Variat elytris rugosulis et absque rugis; *capite* et *thorace* plus minus punctatis; *thoraceque* postice marginato, vel absque margine.

Geoffr. Ins. Tom. I. p. 377. *Meloë* 1. t. 7. f. 4. Le *Proscarabé.* — *Scarabé* onctueux.

de *Geer* Ins. Tom. V. p. 3. *Cantharis* 1. t. f. 1. *Foemina. Cantharide Proscarabé.*

CANTHARIS *(Proscarabaeus)* aptera, violaceo-nigra.

Drury Ins. Tom. I. préf. p. 8. *Oil-Beetle.*

2. *Majalis*, die *zwote Art des Maywurms, mit röthlichen Ringen.*

Müller l. c. S. 380. No. 2. der *Maywurm.*

Füeßlins

Füeßlins Verz. S. 20. No. 396. *Maywurm.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 211. t. 16.
— — Atl. Dan. I. t. 29.
Fr. von P. Schrank Beytr. zur N. G. p. 73.
Frisch Inf. VI. p. 14. t. 6. f. 4. Ein *Weiblein von den grünlichen und Goldfarben.*
Schaeff. Icon. t. 3. f. 5. (all. *Füeßl.*)
Fabric. S. E. p. 259. *Meloë* 2.
Müllеri Faun. Fridr. p. 22. No. 215.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1080.
Niger; segmentis abdominis *dorso rubris.*

II. *Geflügelte mit ganzen Deckschilden.*

3. *Vesicatorius,* die *eigentliche spanische Fliege.**)
Müller l. c. S. 380. No. 380. t. 8. f. 6. die *spanische Fliege; (Blasenzieher).*
Füeßlins Verz. S. 20. No. 397. die *spanische Fliege.*
Lessers Theol. der Inf. p. 70. m. *spanische Fliegen* oder *Käfer:* CANTHARIDES *Aldrovandi;* p. 283. d; p. 310. e; p. 379. f; p. 473. ff.
Eberhards Thiergesch. p. 197. §. 221. die *sogenannte spanische Fliege;* der *Pflasterkäfer; Cantharis.*
Merklins Thierr. p. 687.
Börners Stadt- und Landwirthsch. II. p. 287.
Preuß. Sammler I. pag. 460. *spanische Fliegen in Preußen.*
Neuer Schaupl. der Nat. 3. B. p. 123. *spanische Fliegen.*
Neue berlin. Mannichfalt. 3. Jahrg. p. 50.
Gleditsch Forstwiss. I. p. 343. die *große spanische Fliege;* p. 891. No. 3; p. 937. No. 6; p. 949. No. 2. CANTHARIS *officinalis;* p. 1509. No. 7. der *Laub- und Graskäfer; spanische Fliege.*

*) Der Franzosen *Cantharide; Mouche d'Espagne.*

Sulzers Kennz. t. 7. f. 55. *Maywurm.*

Swammerd. B. der N. pag. 119. *spanische Fliegen; Goldkäfer.*

Charlet. Onomast. p. 47. *spanish Flies.*

Geoffr. mat. med. VI. p. 349-369.

Lemery Mat. Lex. 226.

Bomar. Dict. des An. II. p. 355.

Catholicon. C. p. 71. *Canthariде.* vulgo CANTHARIS *officinarum;* ein *kleiner grüner glänzender giftiger Käfer.*

Podá Mus. graec. p. 47.

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 154. *Mouche Canthariде; Mouche d'Espagne; spanische Fliegen; spanische Mücken.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. pag. 520. *Cantharis; Musca viridis Hispanica;* Eine *spanische Mücke; Fliege; meiländischer Käfer; Goldwürmlein.*

Schaeff. Elem. t. 33. *Meloë vesicat.; Cantharis; Pflasterkäfer.*

— — Icon. t. 47. f. 1.

Müllеri Faun. Fridr. p. 22. No. 217.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 80. No. 869.

CANTHARIS *vesicatoria*, viridissima nitens; *capite* postice gibbo; *antennis* nigris. *Dan.* Spansk-Flue.

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 1.

Viridis; *antennis* nigris.

Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. V. 607. Suppl. 176. V. 425.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 341. No. 1. t. 6. f. 5. La *Canthariде des boutiques.*

Viridi-aurata; *antennis* nigris.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 12. No. 2. t. 1. f. 9. *Canthariде vesicatoire.*

CANTHARIS *(vesicatoria), alata*, viridi-aurea nitidissima; *antennis* nigris.

Forstenii

Forstenii disquis. medica, *Cantharidum* historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens. Argentor. 8. 1776.

Bernh. *Albini* Diss. de *Cantharidibus*. Francof. 1686.

Ioh. Dan. *Geyeri* Thargelus etc. — discursus de *Cantharidibus c. fig.* Lipsi. 1687.

de *Muralto* de *Cantharide viridi* χλωροχρύσω. Misc. N. C. Ann. 1683. p. 46.

Stenzelii Diss. de *cantharidibus* prosperae adversaeque valetudinis auctoribus; von *spanischen Fliegen*. 4. Witt. 1740.

Wedelii Diss. de *Cantharidibus*. Ienae 1717.

Groenvelt de tuto *Cantharidum* in medicina vsu interno. 8. Lond. 1698.

Whitaker Diss. de *Cantharidibus*. Lugd. Bat. 1718.

Drury Ins. Tom. I. préf. p. 9.

Linn. Amoen. acad. Vol. VI. p. 132.

4. *Syriacus*, die *syrische grünlich blaue Flügeldecke.**)

Müller l. c. S. 381. No. 4. der *Syrier*.

Lepechins Tageb. I. p. 221. *spanische Fliegen (syrische Landsleute) auf dem Schlingbaume. (Spiraea crenata.)*

5. *Cichorii*, der *Zichorienafterkäfer*.

Müller l. c. S. 381. No. 5. der *Zichorienkäfer*.

Füeßlins Verz. S. 20. No. 398. MELOE *fasciatus*, der *bandirte Afterkäfer.***) fig. I. a, b, c, d, e.

Sulzers Gesch. p. 66. t. 7. f. 11. der *Zichorienkäfer*; a das *Weibchen*.

*) *Nicht abgebildet.*

**) Diese haben die Alten stets unter *Meloë* verstanden. *Füeßlin* selbst hält alle seine Exemplare für einerley Gattung.

Lepechins Tageb. I. p. 202. die *wegwarten-spanischen Fliegen.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 152.

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 2.

Nigra; elytris flavis; *fasciis tribus nigris.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 83.*)

Niger; *elytris* flavis; *apice et fasciis duabus nigris.*

Gronov. Gazoph. 622.

Linn. Amoen. acad. Vol. V. p. 252. t. 3. f. 188. 5.

— — — Vol. VI. p. 137. No. 4.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 17. No. 2. t. 13. f. 2. *Cantharide de la Cichorée.*

CANTHARIS *(Cichorii); alata*, nigra, hirsuta; *elytris* fasciis tribus transversis flavis; *antennis clavatis*, longitudine thoracis.

6. *4-punctatus*, der *Vierpunkt.***)

Müller l. c. S. 382. No. 6. der *Mondfleck.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 153.

7. *Capensis*, der *kapensische Sechsfleck.*†)

Müller l. c. S. 382. No. 7. der *Hottentot.*

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 3.

8. *Chrysomeloïdes*, der *surinämische chrysomelenartige Afterkäfer.*††)

Müller l. c. S. 382. No. 8. das *Bastardgoldhähnchen.*

9. *Bima-*

*) *Scop.* macht gegen den *Linneischen* Beysatz in seiner Beschreibung: *antennis clavatis*, die gegründete Erinnerung: *Antennae clavatae* referunt ad genus *Attelabi.* S. unter den *neuen* No. 21.

**) *Nicht abgebildet.*

†) *Nicht abgebildet.*

††) *Nicht abgebildet.*

9. *Bimaculatus*, der *Zweyfleck.*

Müller l. c. S. 382. No. 9. das *Punktum.*
Onomat. hist. nat. P. 5. p. 151.
Fabric. S. E. p. 127. *Apalus* 1.
de *Geer* Ins. Tom. 5. p. 23. No. 2. t. 1. f. 18. CARDINALE *à deux points noirs.*

PYROCHROA *(bimaculata)* nigra, *thorace* orbiculato depresso; *elytris* fulvis puncto nigro; *antennis* simplicibus.

10. *Afer*, der *afrikanische Rothschild.**)

Müller l. c. S. 383. No. 10. der *Barbar.*

11. *Algiricus*, der *Algierer mit muschelbraunen Flügeldecken.***)

Müller l. c. S. 383. No. 11. der *Algierer.*
Sulzers Gesch. p. 66. t. 7. f. 12. der *Algierer.*

12. *Schaefferi*, *Schäffers weichschaalichter Kronen- und Keulenkäfer.*

Müller l. c. S. 383. No. 12. der *Kronenkäfer.*
Füeßlins Verz. S. 20. No. 399. *Schäffers Afterkäfer.*
Schäffers weichschaalige Kronen- und Keulenkäfer. 1763. (Abh. von Ins. II. 289.)
Lepechins Tageb. I. p. 202.
Sulzers Gesch. pag. 66. t. 7. f. 13. b. c. der *Kolbenkamm.*
Onomat. hist. nat. P. 5. p. 154.
Schaeff. Icon. t. 53. f. 8. 9.
Fabric. S. E. p. 262. *Cerocoma* 1.

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.*

**) An *Algira Linn.*? frägt *Pallas* in seinen Reisen II. App. No. 51. S. unter den *neuen* 2. Kl. No. 3. *Clematides.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 358. t. 6. f. 9. La *Cerocome*; *Cerocoma*; *Federbuſchkäfer.*
de *Geer* Inf. Tom. V. p. 3.

13. *Marci*, der *Markusafterkäfer.**)
Müller l. c. S. 383. No. 13. der *Markuskäfer.*
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 152.

14. *Monocerus*, das *Einhorn.*
Müller l. c. S. 384. No. 14.
Füeßlins Verz. S. 20. No. 400. das *Einhorn.*
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 153.
Catholicon A. p. 596. der *einhörnige Meywurm.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 639.
ATTELABVS *monoceros.*
Fabric. S. E. p. 158. *Notoxus* 2.
Thorace in *cornu* ſupra caput protenſo.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 356. t. 6. f. 8. *Notoxus.*

15. *Floralis*, der *Blumenmaywurm.***)
Müller l. c. S. 384. No. 15. der *Blumenlecker.*
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 152.
Fabric. S. E. p. 126. *Lagria* 12.
Nigra; *thorace* ferrugineo.

16. *Antherinus*, der *Blüthenmaywurm.*†)
Müller l. c. S. 384. No. 16. der *Blüthenſauger.*
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 151.
Fabric. S. E. p. 126. *Lagria* 11.
Nigra; *elytris* faſciis duabus ferrugineis.

Unab-

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*

Unabgebildete Maywurmkäfer.

II. Klasse.

1. No. 4. *Syriacus.*
2. No. 6. *4-punctatus.*
3. No. 7. *Capensis.*
4. No. 8. *Chrysomeloïdes.*
5. No. 10. *Afer.*
6. No. 13. *Marci.*
7. No. 15. *Floralis.*
8. No. 16. *Antherinus.*

NEUE MAYWVRMKAEFERARTEN.

II. *Geflügelte mit ganzen Flügeldecken.*

1. *Gouani*, das *kleine schwarze französische Maywurmkäferchen.*

Linn. Add. p. 1068. No. 11.
Alatus, ater; *elytris* fascia apiceque sanguineis.
Müllers Suppl. B. p. 255. 17. der *Schwarzkäfer.*

2. *Pectinatus*, *Lepechins Federkamm.*

Lepechins Tageb. II. p. 200. u. t. 11. f. 26. Eine *spanische Fliege mit federigen Fühlhörnern.*
MELOE *antennis pectinatis; corpore* atrato; *fronte* rubra.

3. *Clematides*, der *Waldreben-Maywurmkäfer.**)

Pallas Reis. II. App. No. 51.
Forma simillima *Vesicator.* *Caput*, *thorax*, *artus* chalybeato-atra, nitida; *elytra* dilute testacea vel grisea immaculata, mollissima.
Müllers Suppl. B. p. 257. t. 23.

4. *Tri-*

*) v. *Linn.* No. 11. *Algiricus.*

4. *Trifascis*, das *kaspische Dreyband.*

Pallas Reisen II. App. No. 52.

Magnitudo fere M. *Schaefferi*, et similior *Cichorii*; antennae subclavatae; *corpus* totum virescente chalybeum, sericeum, cano-lanuginosum; *elytra* griseo-pallida.

Versus *mare Caspium.*

Müllers Suppl. B. p. 258. t. 24.

5. *Ocellata*, die *kaspische Augendecke.*

Pallas Reis. II. App. No. 53.

Duplo major praecedente; corpus cano-lanuginosum, nigrum; *pedes* testacei; *caput*, thoraxque lanugine cano-flavescente colorata; *elytra* nigro-punctata; *puncta* pallide marginata; hinc *oculos* referunt.

Versus *mare Caspium.*

Müllers Suppl. B. p. 358. t. 25. das *Mayauge.*

6. *Festiva*, der *geschmückte Maywurmkäfer am Irtis.*

Pallas Reis. II. App. No. 53.

Pulcherrima; antennae tenues, *caput*, *thorax*, *corpus* cyaneo-atra, nitida, lanugine fusca; *elytra* subcompressa, modo coccinea.

Müllers Suppl. B. p. 359. t. 26. der *Rosenkäfer.*

7. *Lutea*, der *irtische leimfahle Maywurmkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 54.

Magnitudo *Syriaci*, atra-lanuginosa; *elytra* ventricosa, subcompressa, intense lutea: ad Irtin.

Müllers Suppl. B. p. 259. t. 27. der *gelbe Maykäfer.*

8. *Atrata*, der *schwärzliche Maywurm.*

Pallas Reis. II. App. No. 55.

Magni-

Magnitudo *Trifasciidis;* tota aterrima; *elytra* fascia versus apicem vndulata; *antennae* subclavatae.

Müllers Suppl. B. pag. 260. t. 28. der *geschwärzte Maykäfer.*

9. *Vralensis*, der *uralische Maywurmkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 56.

Magnitudo vix *Muscae carnar.* Tota atra, parum nitida, sed laevis et glaberrima; forma *Proscarabaei*, sed *elytra* longiora.

Müllers S. B. p. 360. t. 29. der *uralische Maykäfer.*

10. *Erytrocephalus*, der *wolgaische Rothkopf.*

Pallas Reis. I. App. No. 46. *)

Magnitudo *Vesicator.* Niger, subtus canus; *caput rubrum;* oculis, macula verticis, ore antennisque *nigris.*

Müllers Suppl. B. p. 255. t. 18.

11. *Fenestrata*, der *jaikische Maywurmkäfer mit gegitterten Flügeldecken.*

Pallas Reis. II. App. No. 47.

Facies *Cantharidis;* corpus mediocre, totum glabrum, testaceo-pallidum; *thorax* depressus; *elytra* grisea; *antennae* filiformes.

Ad *Jaikum inter flores.*

Müllers Suppl. B. p. 256. t. 19. der *Fensterkäfer.*

12. *Quadrimaculata*, der *Vierfleck.*

Pallas Reis. II. App. No. 48.

Nigra, glabra, solo *pectore* pubescente. *Elytra* grisco-lutea, nigra *bimaculata;* maculae subquadratae; *antennae* filiformes.

Müllers Suppl. B. p. 256. t. 20.

13. *Necy-*

*) v. No. 17.

13. *Necydalea*, der *afterbockartige Maywurm.*

Pallas Reis. II. App. No. 49.

Nigra tota, praeter *elytra* intense *rubra;* abdomine paulo breviora.

Omnes praecedentes *oleum odoratum exsudant.*

Müllers Suppl. B. p. 256. t. 21. der *Maybock.*

14. *Sibirica*, der *sibirische Feldmaywurmkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 50.

Corpus totum atrum, vix nitidum, glaberrimum, *Vesicator.* subaequale. *Caput rubrum*, oculis, ore, antennis nigris.

Müllers Suppl. B. p. 257. t. 22. der *Sibirier.*

15. *Cinereus*, der *aschgraue amerikanische Maywurmkäfer.*

Forsteri nov. sp. Ins. Cent. I. p. 62. No. 62. *Alatus, cinereus;* antennis *elytrisque* atris, margine cinereis.

16. *Cinnaberinus*, der *Skopolische zinnoberrothe Maywurmkäfer.*

Scop. Entom. carn. No. 186.

Elytra et caput vtrinque; thorax superne *rubra;* oculi, antennae, thorax subtus, abdomen totum, pedesque nigri.

17. *Rufidorsum*, der *wiener Rothrücken.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 81.

Coeruleus, alatus; *dorso rufo*, nitido.

18. *Erytrocephalus*, der *Skopolische Fuchskopf.**)

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 103. No. 82.

Niger; *capite rufo.*

19. *Mar*

*) An *Pall.* Erytrocephalus? No. 9.

19. *Marginatus*, der *kapensische Aschrand.*

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 2.
Atra; *elytrorum* marginibus cineraſcentibus.

20. *Vittatus*, der *amerikanische gelbbandirte Mayewurmkäfer.*

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 3.
Elytris nigris; marginibus *vittaque* flavis.

21. *Atratus*, der *amerikanische ungefleckte ganz schwarze Mayewurmkäfer.*

Fabric. S. E. p. 260. *Lytta* 4.
Atra, immaculata.

22. *Fasciatus*, die *indianische Gelbstreife.*

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 1. *)
Nigra; elytris *fascia media flava.*

23. *3-maculatus*, der *Morgenländische.*

Fabric. S. E. p. 261. *Mylabris* 4.
Nigra; *coleoptris* flavis, fasciaque punctoque communi fuscis.

24. *Nitidula*, der *englische grünglänzende Mayewurmkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 826. 1-2.
Lytta viridi-aenea; *elytris* testaceis.

25. *Immaculata*, der *ungefleckte indianische Mayewurmkäfer.*

Fabric. S. E. App. p. 826. 1-3.
Mylabris atra; *elytris* testaceis, *immaculatis.*

26. *Subvil-*

*) v. *Linn. M. Cichorii* No. 5.

26. *Subvillosus*, das *gelbliche rauche Maywurmkäferchen.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 343. *Cantharis* 5. La *Cantharide jaune veloutée.*

Flavescens, *subvillosa;* elytris attenuatis.

27. *Flavo-elytratus*, die *gelbe Flügeldecke.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 6. La *Cantharide noire à etuis jaunes.*

Subvillosa, nigra; *elytris flavis*, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

28. *Nigro-acuminatus*, die *Schwarzspitze.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 7. La *Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.*

Testacea; *elytris apice nigris.*

29. *Formicarius*, der *ameisenartige Maywurmkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 344. *Cantharis* 8. La *Cantharide fourmi.*

Fusca; elytris antice; *thoraceque* elongato rubris.

30. *Pensylvanicus*, der *schwarze pensylvanische Maywurmkäfer.**)

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 16. *exot.* No. 1. t. 13. f. 1. *Cantharide de Pensylvanie.*

Alata nigra tota.

*) In der Rezension des *Fabric.* S. E. in *Beckmanns* phys. ockon. Bibl. 7. B. 2. St. p. 288. heifst es: „Wir glauben, dafs sich dies Geschlecht erweitern liefse, indem wir welche besitzen, die durch die stahlblaue oder schwarze Farbe, durch die Flügelscheiden, die den Leib entweder ganz oder zur Hälfte bedekken, durch das Verhältnifs des Brufstücks, und die Gestalt der Fühlhörner, sich unterscheiden.“

216. GESCHLECHT. Mordella; *Erdflohkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. B. 1. Th. S. 385. *Erdflöhe.*

Börners Samml. I. p. 460. *Erdfloh;* p. 478. *Pflanzenkäfer; Erdfloh.*

Beckmanns Anfangsgr. der N. H. p. 95. gen. 12. *Erdfloh.*

Eberhards Thiergesch. p. 197. §. 221. No. 5. der *Flohkäfer.*

 Sulzers

*) Diese Insekten heissen bey den meisten Schriftstellern auch *Erdflöhe.* Ob sie aber wohl den jungen Pflanzen ebenfalls Schaden thun; so sind es doch die *eigentlichen Erdflöhe,* die wahre Plage der Gärtner, CHRYSOMELAE *saltatoriae oleraceae* Linn. No. 51. nicht. Sie sind auch *viel seltener* als diese, und ihre *Larven* sowohl, als ihre ganze *Verwandlung* ist noch unbekannt.

Man hüte sich ja, dasjenige Insekt, was die Alten *Mordella* nennen, mit diesem für einerley zu halten. Jenes gehöret zum *Wanzengeschlecht.* S.

Ionston. hist. nat. Ins. p. 40. Cap. VI. de *Orsodacna* (GAZAE *Mordella. Aldrov.* Ins. lib. II. c. 13.) et *Cimicibus sylvestribus.* et p. 112. Cap. XI. *Forficula* Priscis *Mordella. Schwenkfeld* Theriotr. Silef. p. 544. ORSODACNA *Arist. Mordella;* ein *Eyterfliege, Blatterbeisser* (Pustulas puerorum appetens).

Andere verstehen dadurch die *Wassernymphen,* oder *Libellas.* S. *Swammerdamms* B. der N. p. 90. *Mordella* oder *Orsodacna,* Adr. *Iunii* die Mouffet *Libella,* Aldrov. aber *Perla* nennet. *Holl.* Rambout, Scarbout, Nayer, Puystebyter (in Deutschland *Jüngferchen, Schittebold, Grasmetze*). S. *Lessers* Theol. der Ins. p. 68. m. *Mordellae, Orsodacnae, Blatterbeisser. Holl.* Puystebyters, Rombouts.

Eine solche ist auch unstreitig die *Mordella,* davon *Loewenh.* in epist. physiol. XXXV. p. 342. behauptet, dass sie 25088 Augen habe.

Wie *Linné* selbst einige *Tenebriones, Attelabos, Chrysomelas* und *Cimices* wieder unter die *Mordellas* gebracht hat: davon S. *Quomat.* hist. nat. P. 5. p. 245. 246. 247.

Sulzers Kennz. S. 77. *Erdfloh; Kohlfresser.*
— — Gesch. S. 67. der *Erdflohkäfer;* la *Mordelle.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. S. 21. *Erdflohkäfer.*
Neuer Schaupl. der N. 2. B. p. 665. *Erdflöhe.*
Onomat. hist. nat. Part. 5. pag. 244. der *Flohkäfer; Erdfloh.*
Bomar. Dict. des An. VII. p. 155.
Schwenkf. Theriotr. Silef. p. 550. *Pulex terrestris, Erdfloh.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 228.
Müllери Faun. Fridr. p. 22.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 84.
Fabric. S. E. p. 262.
Brünnichii Entom. p. 51. *Jordloppe.*
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 353. La *Mordelle.*
de *Geer* Ins. Tom. V. p. 27. *Mordelle.*

1. *Paradoxa*, der *Erdflohkäfer mit gerieftem Brustschilde.**)

Müller l. c. S. 385. die *Brustrinne.*
Onomat. hist. Nat. P. 5. pag. 247. der *große Flohkäfer.*
Fabric. S. E. p. 262. No. 2.

2. *Aculeata*, der *Stachelflohkäfer.*

Müller l. c. S. 386. No. 2. t. 8. f. 5. der *Stachelfloh.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 404. *Stachelflohkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 211. t. 16.
Lepechins Tageb. II. p. 209. t. 10. f. 15. der *fleckichte Erdfloh.*
Mordella aterrima; *elytrorum* punctulis 12 argenteis, *ano in aculeum desinente.* An *Varietas aculeatae? Linn.*

Swam-

*) *Nicht abgebildet.*

Swammerd. B. der N. p. 120. Ein *Käferchen, dessen Schwanz mit einer Stachel.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 244. der *Flohkäfer mit dem Stachel.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 22. No. 218.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 917.

Schaeff. Icon. t. 127. f. 7.

Fabric. S. E. p. 263. No. 5.

Ano aculeato; corpore atro immaculato.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 353. No. 1. t. 6. f. 7. La *Mordelle noire à pointe.*

Atra, *caudata*, vnicolor.

de *Geer* Inf. Tom. V. p. 28. No. 1. *Mordelle à tarrière.*

Poda Muf. graec. p. 47.

3. *Humeralis*, die *Gelbschulter.**)

Müller l. c. S. 386. No. 3. die *Gelbseite.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 246. der *Flohkäfer mit gelben Schultern.*

Fabric. S. E. p. 264. No. 9.

Atra; *ore*, *lateribus thoracis* pedibusque flavis.

4. *Frontalis*, die *Gelbstirn.***)

Müller l. c. S. 386. No. 4.

Füeßlins Verz. S. 21. No. 405. *Gelbstirn.*

Onomat. hist. nat. P. 5. p. 246. der *Flohkäfer mit der gelben Stirn.*

Fabric. S. E. p. 264. No. 10.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 915.

Atra; *fronte*, antennarum basi, pedibusque anticis *flavis.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

5. *Thoracica*, die *Gelbbruſt*.*)

Müller l. c. S. 386. No. 5.
Fließlins Verz. S. 21. No. 406. *Gelbbruſt*.
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 248. der *Flohkäfer mit gelber Bruſt*.
Fabric. S. E. p. 264. No. 11.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 916.
Nigra; capite, thorace pedibusque flavis.

6. *Flava*, der *ſchwefelgelbe Erdflohkäfer*.**)

Müller l. c. S. 386. No. 6. der *Schwefelkäferfloh*.
Onomat. hiſt. nat. P. 5. p. 245. der *gelbe Flohkäfer*.
Fabric. S. E. p. 264. No. 12.
Mülleri Fann. Fridr. p. 22. No. 219.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 84. No. 918.

Unabgebildete Erdflohkäfer.

1. No. 1. *Paradoxa*.
2. No. 3. *Humeralis*.
3. No. 4. *Frontalis*.
4. No. 5. *Thoracica*.
5. No. 6. *Flava*.

Neue Erdflohkäferarten.

1. *Teſtacea*, der *engliſche muſchelbraune Erdflohkäfer*.

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 63. No. 63.
Capite nigro; *thorace* fuſco; in floribus *Crataegi Oxyacanthae*.

2. *Melanopa*, der *Forſterſche Schwarzfuß*.

Forſteri nov. ſp. Inſ. Cent. I. p. 64. No. 64.
Nigra; *elytris*, *thorace*, *capite*, *pedibusque* teſtaceis.

3. *Faſciata*,

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

3. *Fasciata*, die *englische Schwarzbinde.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 65. No. 65.

Atra; *elytris* testaceis, apice nigris; *fasciaque nigra* in medio.

4. *Clavicornis*, das *englische Keulhorn.*

Forsteri nov. sp. Inf. Cent. I. p. 66. No. 66.

Picea tota; *antennis clavatis*; in floribus *Rhei-Rhabarbari.*

5. *Perlata*, der *graubündtenische Perlenpunkt.*

Sulzers Gesch. p. 67. t. 7. f. 14.

Nitide-nigra; subpilosa; *thorace* postice perlato-marginato; *elytro* singulo quatuor *maculis perlatis.*

Füesslins Verz. S. 21. No. 402.

6. *Bicolor*, der *zweyfarbige Erdflohkäfer.*

Sulzers Gesch. p. 67. t. 7. f. 15.

Capite nitide-nigro; *ore* rubro; *antennis* fulvis; *thorace pedibusque* anticis rufis; *elytris* nigris.

An varietas rara M. *Thoracicae Linn.*?

Füesslins Verz. S. 21. No. 403.

7. *Tricuspidata*, der *jaikische Erdflohkäfer mit dreygespitzter Brust.*

Lepechins Tageb. I. p. 311. b. t. 19. f. 8. Eine *besondere Art Erdflöhe auf dem Korispermum.*

Corpore flavo; *elytris* punctis tribus nigris; lamina abdominali cyanea; *thorace* postice *tricuspidato.*

8. *Ferruginea*, das *ostindianische Kammhorn.*

Fabric. S. E. p. 262. No. 1.

Antennis pectinatis; rufa, pectore, ano pedibusque nigris.

9. *Pectinata*, das *amerikanische Kammhorn.*

Fabric. S. E. p. 263. No. 3.
Antennis pectinatis; rufa; *elytris* nigris.

10. *Sex-maculata*, der *amerikanische Sechsfleck.*

Fabric. S. E. p. 263. No. 4.
Atra; *thorace ferrugineo;* elytris testaceis; *maculis tribus nigris.*

11. *8-punctata*, der *nordamerikanische Achtpunkt.*

Fabric. S. E. p. 263. No. 7.
Ano aculeato; elytris nigris; *punctis quatuor flavis*, primo lunato.

12. *Abdominalis*, der *teutsche Gelbafter.*

Fabric. S. E. p. 264. No. 8.
Ano aculeato; nigra; thorace *abdomineque fulvis.*

13. *Fasciata*, die *Geoffroische Goldbinde.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 353. No. 2. La *Mordelle veloutée à pointe.*
Atra, *caudata; fasciis villoso-aureis.*
Fabric. S. E. p. 263. No. 6.
Ano aculeato; nigra; *elytris* fasciis duabus cinereis.

14. *Rufipes*, der *Rothfuß.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 355. No. 5. La *Mordelle brune à pattes fauves.*
Fusca; *pedibus ferrugineis.*

217. GESCHLECT. Staphylinus; *Raubkäfer.**)

Müllers L. N. S. 5. B. 1. Th. S. 387. *Raubkäfer.*
Börners Samml. 1. p. 479. *Raubkäfer.*
Beckmanns Anfangsgr. der N. H. pag. 96. gen. 13. *Raubkäfer.*
Eberhards Thiergesch. p. 203. §. 229. *Raubkäfer.*
Glaser von schädl. Raupen p. 74. *Raupentödter.*
Sulzers Kennz. p. 86. *Raubkäfer.*
— — Gesch. p. 67. *Raubkäfer*; le *Staphylin.*
Schäffers neuentdeckte Theile etc. p. 24.
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. p. 21. *Raubkäfer.*
Brunnichii Entom. p. 51. *Dan.* Rovbille.

*) Diese Insekten und Käfer heissen bey vielen Schriftstellern: z. E. durchgehends in den Actis Upsal. *Forficulae.*

Sie gehören unter die gefräßigsten *Raubinsekten*, und ihre *Larven* wohnen unter der Erde. Wenn man im Winter Blumentöpfe in der Stube hat, und sie begiesst; so kommen lauter kleine weisse *Staphylinenlarven* auf die Oberfläche.

Die *Käfer* beissen gewaltig, dass es schmerzt. Sie haben hinten am Schwanze zween fischblasenähnliche Theile, die sie zur Wehr herausstrecken, wenn sie in Gefahr sind. S. *Schäffers* neuentdeckte Theile etc. S. 25.

Linné hat keine Eintheilung derselben gemacht; der sel. *Müller* aber theilt sie ein 1. in Raubkäfer von mittlerer Grösse, 2. in kleine Raubkäfer. Von der erstern 7: von der zweyten Art 19 Arten beym Linné, und der Staatsrath *Müller* in vier Klassen, nach der Gestalt des *Halsschildes.*

1. *Thorace aequali:* postice et antice aequali latitudine;
2. *Thorace* postice latiore;
3. *Thorace* postice angustiore;
4. *Thorace* cylindraceo.

Verschiedene Arten, als der *Murinus*, *Erythropterus* sind im *Pferdemist* anzutreffen; aber in einer ganz andern Absicht als die *Scarabaei stercorarii:* nämlich blos denen darinn befindlichen Insekten nachzuspühren.

Scop. Entom. carn. p. 99.
— Ann. 5. hist. nat. p. 109.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 230.
Müllerі Faun. Fridr. p. 23.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 97.
Fabric. S. E. p. 264. *Staphylinus.* p. 267. *Oxyporus.* p. 268. *Paederus.*
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 359. Le *Staphylin.*
de *Geer* Inf. Tom. IV. préf. IV. No. 36. p. 9. Des *Staphylins.*
Ionston. hist. nat. Inf. p. 127. Artic. VIII. de *Staphylino* t. XVII.

1. *Hirtus*, der *haarichte Raubkäfer.*

Müller l. c. S. 388. No. 1. der *Bärenräuber.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 407. der *Haarichte.*
Schäffers neuentdeckte Theile etc. S. 25. t. 2. f. 12. a, a. der *rauhe halbgeflügelte Raubkäfer.*
— — Icon. t. 36. f. 6.
Sulzers Gesch. p. 69. t. 7. f. 16. der *Bärenräuber.*
Acta Upsal. 1736. p. 15. No. 1. *Forficula hirsuta,* nigra, nitida; capite, collo, cinguloque ventris flavis.
Fabric. S. E. p. 264. *Staphylinus* 1.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1091.
Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 363. No. 7. Le *Staphylin Bourdon.*
Niger villosus; capite thorace anoque *pilis fulvo-aureis.*
de *Geer* Inf. T. IV. p. 20. No. 5. *Staphylin bourdon.*
STAPHYLINUS *(bombylius) hirsutus*, niger; capite, thorace abdominisque apice viridi-flavis nitidis.

2. *Murinus*, der *mausefahle Pferdemist-Raubkäfer.*

Müller l. c. S. 388. No. 2. der *Misträuber.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 408. *Mausefarbiger.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 265. *Staphylinus* 2.
Müllerі Faun. Fridr. p. 23. No. 221.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1115.
Cinereo-nebulosus, pubescens; *punctis nigris.*
Scop. Entom. carn. No. 302.
Fimetarius, villosus, *cinerascens*; nigro-nebulosus.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 362. No. 6. Le *Staphylin velouté.*
Villosus; e *fusco cinereoque* viridi-tessellatus.
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 12. No. 1. t. 1. f. 1. *Staphylin velouté pointu.*
Villosus; griseo-fusco virescens, nigro-nebulosus; *abdomine* conico, *maculis nigris*; capite maximo.

3. *Maxillosus*, der *Raubkäfer mit großen Kinnladen.**)

Müller l. c. S. 388. No. 3. t. 8. f. 8. der *Großkiefer.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 409. *Großkiefer.*
Act. Upsal. 1736. p. 15. No. 2. 3. *Forficula* collari nigro; *elytris* nebulosis.
Müllerі Faun. Fridr. p. 23. No. 222.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1114.
STAPHYLINUS *balteatus* niger, pubescens, fasciis cinereis.
Isl. Joetun-Oxe; Jaette-Stoud.
Schaeff. Icon. t. 80. f. 1. (alleg. *Müllero*).
— — — t. 20. f. 1. (all. *de Geer*).**)

Act.

*) Das von *Linn. Fabric.* und *Füeßl.* hierbey angeführte Citatum des *Geoffr.* I. p. 360. No. 1. t. 7. f. 1. ist falsch, und gehört zu des Staatsr. M. *olens* Prodr. No. 1090, oder zu des *de Geer major* Tom. IV. p. 17. No. 3. wohin auch die vom *Linn.* hierbey citirte Schriftsteller *Rajus* und *Mouffet* gehören. S. unter den *neuen* No. 19.

**) Des *Schaeff.* Icon. t. 20. f. 1. hat *Füeßlin* bey seinem *neuen Fasciatus* No. 410. angeführt.

Act. Nidr. III. 25. *Uebers.* p. 362.
Iter Isl. 688. c.
— — *Uebers.* I. p. 319. c. *Joetun-Oexe; Riesenochse.*
Fabric. S. E. p. 265. No. 3.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 362. No. 5. (alleg. *de Geer*).
Le *Staphylin nebuleux.*
Niger; *elytris abdomineque* cinereo-nebulosis.
de *Geer* Ins. Tom. IV. pag. 18. No. 4. t. 1. f. 7. 8.
Staphylin à bande cendrée.
STAPHYLINUS *(balteatus)*, niger, nitidus; *abdomine* subtus elytrisque fascia transversali griseo-cinerea; *punctis* nigris.
Gronov. Zooph. p. 173. No. 630.
Staphylinus ater; *elytris* fascia cinerea transversa lata lobata.

4. *Erytropterus*, der *Rothflügel.*

Müller l. c. S. 389. No. 4.
Füeßlins Verz. S. 21. No. 411. *Rothflügel.*
Frisch Ins. V. p. 49. No. 25. t. 25. Ein *kurzflüglichter Raubkäfer mit seinem Zangenwurm.*
Act. Nidros. III. p. 404. t. 4. f. 8. *Uibers.* p. 362.
Acta Upsal. 1736. p. 15. No. 6. *Forficula* collari nigro; *ventre* atro; *elytris* testaceis.
Poda Mus. graec. p. 48.
Mülleri Faun. Fridr. p. 23. No. 223.
-- — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1092.
Niger, opacus; *elytris pedibusque rufis.*
Fabric. S. E. p. 265. *Staphyl.* 5.
Geoffr. Ins. Tom. I. p. 364. No. 9.
Le *Staphylin à étuis couleur de rouille.*
de *Geer* Ins. Tom. IV. p. 21. No. 6. *Staphylin à étuis roux.*

5. *Poli-*

5. *Politus*, der *polirte glatte Raubkäfer.*

Müller l. c. S. 390. No. 5. der *Polirer.*
Fueßlins Verz. S. 21. No. 412. der *Polirte.*
Act. Nidr. III. 27. *Ueberf.* p. 363.
Acta Vpſal. 1736. pag. 16. No. 7. *Forficula* collari nigro; *ventre* atro; *elytris* coeruleſcentibus.
Schaeff. Icon. t. 39. f. 12.
Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 7.
Mülleri Faun. Fridr. p. 23. No. 224.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1108.
Niger; *capite thoraceque* nitidis, *punctatis.*
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 361. No. 3. (alleg. *de Geer*).
Le *petit Staphylin noir.*
Ater; extremo *antennarum* articulo ſubgloboſo; *elytris* thorace brevioribus.
de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 22. No. 7. *Petit Staphylin noir.*
Niger nitidus; *antennis* obſcure fuſcis; *abdomine elongato.*

6. *Rufus*, der *Raubkäfer mit rothbraunen Fühlhörnern.*

Müller l. c. S. 390. No. 6. das *Wedelfühlhorn.*
Acta Vpſal. 1736. p. 15. No. 8. *Forficula* collari teſtaceo; *elytris* ventreque teſtaceis; *apicibus nigris.*
Schaeff. Icon. t. 35. f. 3. (all. *Fabric.*).
— — — t. 85. f. 3. (all. *de Geer* et *Müll.*).
Poda Muſ. graec. p. 49.
Fabric. S. E. p. 267. *Oxyporus* 1.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1116.
Niger; *antennis*, *thorace abdomineque* antice rufis; *elytris* baſi pedibusque flavis.
Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 370. No. 22. Le *Staphylin jaune à tête, etuis, et anus noirs.*
Flavus; capite, elytris abdomineque pone nigris.

de *Geer*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 24. No. 10. t. 1. f. 11. 12. *Staphylin roux à extremités noires.*

Capite; elytrorum abdominisque poſticis nigris.

7. *Lunulatus*, der *Halbmond.**)

Müller l. c. S. 390. No. 7.

Fabric. S. E. p. 268. *Oxyporus* 2.

Flavus; *elytris* nigris; baſi apiceque pallidis.

Müllerі Faun. Fridr. p. 23. No. 225.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1104.

Flavus; *capite, antennarum, elytrorumque medio;* abdominis poſtico nigris.

8. *Riparius*, der *Uferraubkäfer.*

Müller l. c. S. 391. No. 8. der *Uferräuber.*

Füeßlins Verz. S. 21. No. 413. der *Geſellige.*

Schaeff. Icon. t. 71. f. 3.

Scop. Entom. carn. No. 308. STAPHYLINUS *gregarius.*

Caput; elytra, abdominis apex, femora apice, nigro-coeruleo colore tincta gerit, alibi fulvus.

Fabric. S. E. p. 268. *Paederus* 1.

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99 No. 1125.

Rufus; *elytris* coeruleis; *capite abdomine femorumque* apice nigris.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 369. No. 21. Le *Staphylin rouge à tête noire, et étuis bleus.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 28. No. 14. t. 1. f. 18. *Staphylin des rivages.*

9. *Obtuſus*, der *kleine abgeſtumpfte Raubkäfer.***)

Müller l. c. S. 391. No. 9. der *Stumpf.*

Füeßlins

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins Verz. S. 21. No. 414.
Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 10.
Testaceus; *elytris* antice *anoque* nigris.

10. *Lignorum*, der *Raubkäfer in faulem Holz.**)
Müller l. c. S. 391. No. 10. der *Holzdieb.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1120.

11. *Silphoïdes*, der *todtengräberartige Raubkäfer.***)
Müller l. c. S. 391. No. 11. der *Gräberräuber.*

12. *Subterraneus*, der *Raubkäfer in Kellern.****)
Müller l. c. S. 392. No. 12. der *Kellerräuber.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1111.
Niger; *elytris* macula oblonga, subferruginea.

13. *Flavescens*, der *schwarze Raubkäfer mit gelblichen Flügelränden.*†)
Müller l. c. S. 392. No. 13. der *Gelbrand.*
Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 9.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1113.

14. *Elongatus*, der *Langschild.*††)
Müller l. c. S. 392. No. 14.
Fabric. S. E. p. 268. *Paederius* 2.

15. *2-guttatus*, der *gelbbraune Zweytropf.*†††)
Müller l. c. S. 392. No. 15. das *Großauge.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1124.

16. *2-pu-*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.* Oft an feuchten *Weinfässern im Keller.*
***) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.* ††) *Nicht abgebildet.*
†††) *Nicht abgebildet.*

16. *2-pustulatus*, die *rostfarbige Zweyblatter.**)
Müller l. c. S. 393. No. 16. der *Rostpunkt.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 416. *Rostpunkt.*
Fabric. S. E. p. 266. *Staphylinus* 11.

17. *Cantharellus*, der *afterscheinkäferartige Raubkäfer.***)
Müller l. c. S. 393. No. 17. der *Fliegenräuber.*

18. *Littoreus*, der *Strandraubkäfer.****)
Müller l. c. S. 393. No. 18. der *Strandräuber.*

19. *Sanguineus*, der *Blutflügel.*†)
Müller l. c. S. 393. No. 19.
Act. Upsal. 1736. pag. 15. No. 12. *Forficula* nigra; *elytris* sanguineis.

20. *Caraboïdes*, der *laufkäferartige Raubkäfer.*††)
Müller l. c. S. 393. No. 20. der *Gelbschild.*
Fabric. S. E. p. 267. *Staphyl.* 18.
Flavus; *immaculatus.*
de *Geer* Inf. T. IV. p. 25. No. 12. *Staphylin fauve.*
STAPHYLINUS *(fulvus)* rufo-flavus, postice niger; *elytris* pedibusque testaceis; *antennis* longitudine corporis.

21. *Chrysomelinus*, der *blattkäferartige Raubkäfer.*†††)
Müller l. c. S. 394. No. 21. das *Räuberhähnchen.*
Füeßlins Verz. S. 21. No. 417.
Act. Nidr. III. 28. *Uebers.* p. 364.

Fabric.

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*
†) *Nicht abgebildet.*
††) *Nicht abgebildet.*
†††) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 267. *Staphil.* 16.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98 No. 1105. Niger; *thorace elytrisque* fulvis; *pedibus luteis.*

Geoffr. Ins. Tom. I. pag. 368. No. 18. Le *Staphylin couleur de paille.*

(v. *Chrysom.* Linn. No. 21.)

22. *Flavipes*, der *gelbfüßichte Raubkäfer.**)

Müller l. c. S. 394. No. 22. der *Gelbfuß.*

Füeßlins Verz. S. 21. No. 418.

Act. Nidr. III. 34? (all. *Müll.*)

Mülleri Faun. Fridr. p. 23. No. 226.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1099.

Fabric. S. E. p. 268. *Oxyporus* 3.

Niger; *elytris tibiisque* fuscis.

23. *Fuscipes*, der *Braunfuß.***)

Müller l. c. S. 394. No. 23.

Fabric. S. E. p. 266. *Staphyl.* 12.

Ater; *elytris pedibusque* testaceis.

24. *Rufipes*, der *Rothfuß.*

Müller l. c. S. 394. No. 24.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wissensch. 30. Th. p. 191. t. 4. f. 1.

Act. Nidr. III. 29. *Uebers.* p. 364.

Act. Upsal. 1736. p. 15. No. 10. *Forficula* tota atra.

Mülleri Faun. Fridr. p. 23. No. 227.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1098.

Niger; *elytris* thorace duplo-longioribus brunneis; *pedibus flavis.*

Maris et *foeminae* nulla differentia.

Geoffr.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 367. No. 15. Le *Staphylin noir à corcelet liſſe et bordé.*

Niger; *thorace* marginato laevi, *pedibus rufis.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 24. No. 11. t. 1. f. 14. *Staphylin noir à grands étuis.*

Ovatus glaber niger nitidus, *pedibus* rufis; *elytris* amplis, abdominis apice truncato.

Fabric. S. E. p. 267. *Staphyl.* 17.

25. *Piceus*, der *pechſchwarze Raubkäfer.* *)

Müller l. c. S. 394. No. 25. die *Pechdecke.*

Fabric. S. E. p. 267. *Staphyl.* 20.

Niger; *thorace* depreſſo; *lineis* elevatis tribus.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1094.

STAPHYLINUS (*ſulcatus*) niger; *thorace* ſulcato; *elytris* fuſcis; *pedibus pallidis.* St. *piceus* LINN.?

26. *Boleti*, der *Raubkäfer in den Löcherſchwämmen.*

Müller l. c. S. 395. No. 26. der *Schwammniſtler.*

Scop. Entom. carn. No. 305.

Fuſcus; antennis lividis aut ferrugineis; *elytra* marginata; *abdomen* ſuperne villoſum.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1093. Fuſcus; *capite* nigro; *elytris*, *antennis*, *pedibusque* lividis.

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 26. No. 13. t. 1. f. 15. *Staphylin de l'Agaric.*

Fuſcus; *antennis pedibusque* flavo-lividis pallidis.

Unabgebildete Raubkäfer.

1. No. 7. *Lunulatus.*
2. No. 9. *Obtuſus.*
3. No. 10. *Lignorum.*
4. No. 11. *Silphoïdes.*

5. No.

*) *Nicht abgebildet.*

5. No. 12. *Subterraneus.*
6. No. 13. *Flavescens.*
7. No. 14. *Elongatus.*
8. No. 15. *2-guttatus.*
9. No. 16. *2-pustulatus.*
10. No. 17. *Cantharellus.*
11. No. 18. *Littoreus.*
12. No. 19. *Sanguineus.*
13. No. 20. *Caraboïdes.*
14. No. 21. *Chrysomelinus.*
15. No. 22. *Flavipes.*
16. No. 23. *Fuscipes.*
17. No. 25. *Piceus.*

Neue Raubkäferarten.

1. *Buphthalmos*, der *großäugigte Raubkäfer.**)

Fr. von Paula Schrank Beytr. zur N. G. p. 72. §. 21.

Niger, immaculatus; *oculis magnis exsertis.*

2. *Spinipes*, der *Stachelfuß.*

Pontopp. N. G. v. D. p. 211. No. 9. t. 16.

Totus niger; exceptis marginibus *elytrorum* omnibus; *pedes* testacei, *tibiis* spinosis; magnitudo *cimicis lectularii.*

3. *Tataricus*, der *große tatarische Raubkäfer.*

Pallas Reis. II. App. No. 74.

E *maximis* europaeis; sed gracilis, longus, glaberrimus totus. *Caput* thorace latius, ovatum. *Forcipes* insignes simplices. *Thorax* cylindraceus; *elytra* subtilissime punctata; totus ater, nitidulus; *alae albidae.*

Ad lacum salsum *Inderiensem.*

Müllers S. B. p. 261. t. 7. a. der *tatarische Räuber.*

*) v. No. 27.

4. *Fasciatus*, der *bandirte Raubkäfer.*

Füeßlins Verz. S. 21. No. 410.
Sulzers Kennz. t. 7. f. 49. *Anonymus.*
Nigro-cyaneus; *elytra* seminigra, et semi-argentata.
Schaeff. Icon. t. 20. f. 1. (v. No. 3. *maxillos.* LINN.)

5. *Oculatus*, der *neuholländische Raubkäfer mit zwey großen gelben Augenflecken am Kopfe.*

Fabric. S. E. p. 265. *Staphylinus* 4.
Ater, nitidus; *capite utrinque macula fulva.*

6. *Erythrocephalus*, der *neuholländische Fuchskopf.*

Fabric. S. E. p. 265. *Staphyl.* 6.
Ater; *capite rufo;* elytris violaceis.

7. *Hypnorum*, der *englische Raubkäfer mit braungerändeltem Halsschilde.*

Fabric. S. E. p. 266. *Staphyl.* 13.
Ater, laevis; *thoracis* lateribus *elytris pedibusque* testaceis.
Paulo minor *Fuscipede.*

8. *Merdarius*, der *englische Kothraubkäfer.*

Fabric. S. E. p. 266. *Staphyl.* 14.
Ater; *thorace*, *elytris pedibusque* rufis.

9. *Atricapillus*, das *englische Schwarzköpfchen.*

Fabric. S. E. p. 267. *Staphyl.* 15.
Thorace rufo; *elytris* fuscis; puncto baseos margineque postico albis.

10. *Rugosus*, die *englische Runzeldecke.*

Fabric. S. E. p. 267. *Staphyl.* 19.
Niger; *thorace elytrisque* rugosis.

11. *Ophthalmicus*, das *Fleckauge in den Wäldern.*

Scop. Entom. carn. No. 300.

Atro-coeruleus, punctatus; *oculis macula pallidiore lunulata suffusis.*

12. *Fulvipes*, der *Waldraubkäfer mit braungelblichen Füßen.**)

Scop. Entom. carn. No. 301.

Atro-coeruleus; *palpis pedibusque fulvis.*

13. *Clavicornis*, der *Raubkäfer mit keulförmigen Fühlhörnern unter der Birnbaumrinde.*

Scop. Entom. carn. No. 303.

Niger; *antennarum* articulis tribus vltimis crassioribus; *pedes rufi.*

14. *Brassicae*, der *Kohlraubkäfer.*

Scop. Ent. carn. No. 309.

Ferrugineus; *capite et corpore* nigris; *antennae* extrorsum crassiores, villosae; *elytra* punctata.

15. *Arnicae*, der *Raubkäfer auf dem Wolferley.*

Scop. Ent. carn. No. 310.

Niger; *thorace antennisque* ferrugineis; *pedibus* testaceis.

16. *Hellebori*, der *Raubkäfer auf der Nießwurz.*

Scop. Ent. carn. No. 311.

Niger; *elytris*, *antennis pedibusque* ferrugineis.

17. *Fossor*, der *schemnitzische Raubkäfer in den Grubenschwämmen.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 109. No. 105.

Fusco-rufus; *elytris* apice *pedibusque* rufis.

*) v. No. 22. 23. 24. *Linn.*

18. *Subterraneus*, der *Bergmann.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 109. No. 106.
Coeruleſcens, villoſus; *tarſis* rufis.
In *Cuniculis Fodinarum* ad ligna.

19. *Olens*, der *größte und riechende Raubkäfer.**)

Müllleri Faun. Fridr. p. 23. No. 228.
Olens; totus niger; *capite thoraceque* ſcabriuſculo. *Maximus*, MAXILLOSO enim *duplo major.*

— — Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1090.
Olens; ater, opacus; antennis decreſcentibus.

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 360. No. 1. t. 7. f. 1. Le *grand Staphylin noir liſſe.*
Ater; extremo *antennarum* articulo lunulato.

de *Geer* Inſ. T. IV. p. 17. No. 3. *Grand Staphylin noir.*
Major; niger totus; *alis* rufeſcentibus; *abdomine* elongato planiuſculo.

Raj. Inſ. p. 109. No. 1. STAPHYLINUS *major*, totus niger.
Mouffet Inſ. p. 197.

20. *Niger*, der *ſchwarze kleine Raubkäfer auf dem Felde.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 23. No. 229.
Totus niger; capite thoraceque nitido, non punctato. Vix magnitudine *capitis* praecedentis.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1109.

21. *Marginatus*, der *Müllerſche gerändelte Halsſchild.*

Müllleri Faun. Fridr. p. 23. No. 230.
Niger; *thorace* faſcia laterali pedibusque rufis.

— Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1100.

Niger;

*) Alſo keinesweges des LINN. *maxilloſus* No. 3.

Niger; *thoracis* margine, *pedibusque* flavis; *elytris* glaucis.

Act. Nidr. IV. 13.

An *Fabric.* S. E. p. 266. *Staphyl.* 8.?

Ater; *thoracis* lateribus pedibusque flavis.

22. *Cursor*, der *Müllersche Läufer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1095.

Niger; *thorace* depresso; litura duplici; *elytris pedibusque* flavis.

23. *Minor*, das *kleine schwarze Raubkäferchen mit leimfahlen Füßen.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1096.

Niger, glaber; *elytris* pallide fuscis; *pedibus luteis.*

24. *Agarici*, der *Blätterschwammraubkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1097.

Luteus; *capite* nigro; *abdomine* rufo.

25. *Latus*, der *breite Raubkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1101.

Niger; *elytrorum* summo margine postico, *pedibusque* flavis.

26. *Penetrans*, der *Eindringer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 97. No. 1102.

Niger; *antennis*, *elytris pedibusque* castaneis.

27. *Vernalis*, der *Frühlingsraubkäfer.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1103. Fulvus; *elytris* antice, *abdomineque* postice nigris; medio rufo.

Facies St. *Chrysomelini.*

28. *Marginalis*, die *Müllersche gelbe Afterspitze.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1107.

Niger; *thoracis* marginibus; *elytris*, *pedibus*, *apiceque abdominis* flavis.

29. *Fusci-cornis*, das *Fuchshorn.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 98 No. 1112.

Niger; *capite*, *thoraceque* nitidis; *elytris* margine inferiore; *antennisque* lividis.

30. *Floreus*, der *Blumenraubkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1117.

Niger; *thorace* convexo, punctulato; *elytris pedibusque* flavis.

31. *Fracticornis*, das *Bruchhorn.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1118.

Linearis, niger; *antennis pedibusque* fuscis; infimo *antennarum* articulo atro.

32. *Formicarius*, der *ameisenartige Raubkäfer.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1119.

Linearis, niger; infimo *antennarum* articulo atro.

Variat rufus 1. capite abdomineque nigris 2. capite, thorace abdomineque nigris; 3. capite, thorace, elytris abdomineque nigris.

33. *Punctatus*, der *Müllersche Punktirte.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1121.

Atro-coeruleus; *femoribus* testaceis.

Act. Nidr. IV. 36.

34. *Striatus*, der *gestrichte Halsschild.*

Müllerі Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1122.

Ater; *thorace* punctato et *striato.*

Act. Nidr. IV. 35.

35. *Glaber*,

35. *Glaber*, die *Glattdecke.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 364. No. 10. Le *Staphylin noir à étuis fauves et liſſes.*

Niger, nitens; *pedibus elytrisque* laevibus teſtaceis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1106. Niger; *antennis, pedibus elytrisque* laevibus, rufo-fuſcis.

36. *Aeneus*, der *grünlicherzfarbige Raubkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 367. No. 17. Le *Staphylin à étuis bronzés.*

Niger; *elytris* nigro-aeneis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 98. No. 1110. Niger; *capite thoraceque* nitido; *elytris* aeneo-virentibus.

de *Geer* Inf. Tom. IV. p. 23. No. 9. *Staphylin à étuis bronzés.*

STAPHYLINUS *(aeneus)*, glaber, aeneo-viridis, nitidus; *abdomine pedibusque* nigris.

37. *Oculatus*, das *Gelbauge.**)

Geoffr. Inf. T. I. p. 371. No. 24. Le *Staphylin Junon.*

Ater; *oculis* prominentibus craſſis — *Idem; elytro* ſingulo *puncto flavo.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 99. No. 1123. Niger; *thorace* cylindriaceo; *elytrisque* ſcabris.

38. *Atro-coeruleſcens*, der *ſchwarzblaue Raubkäfer.*

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 361. No. 2. Le *Staphylin bleu.*

Extremo *antennarum* articulo lunulato; magnitudine fere *olentis:* No. 19.

39. *Longo-elytratus*, die *Langdecke.*

Geoffr. Inf. Tom. I. pag. 362. No. 4. Le *Staphylin noir à longs étuis.*

Ater; *elytris* thorace duplo *longioribus.*

*) v. No. 1.

40. *Flavo-cephalus*, der *Gelbkopf.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. pag. 363. No. 8. Le *Staphylin à téte jaune.*

Pubeſcens; *capite* flavo; *thorace* elytrisque fuſco nigroque nebuloſis, *punctis* impreſſis.

41. *Punctulatus*, die *punktirte Flügeldecke.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 365. No. 11. Le *Staphylin à étuis marons pointillés.*

Niger, nitens; *pedibus coleoptrisque* teſtaceis; *elytris punctatis.*

42. *Curtulus*, die *kurze Flügeldecke.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 365. No. 12. Le *Staphylin à étuis très courts.*

Niger, nitens; *pedibus elytrisque* fuſcis punctatis; *thorace* plano marginato.

43. *Longo-maculatus*, der *Langfleck.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 366. No. 13. Le *Staphylin applati à étuis bruns.*

Niger, nitens; *antennis*, *pedibus elytris*, *anoque* teſtaceis; *thorace* marginato.

44. *Fuſco-maculatus*, der *Braunfleck.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 366. No. 14. Le *Staphylin à pattes fauves, et étuis pointillés.*

Niger; punctatus; *antennis pedibusque* ferrugineis.

45. *Marginato-ſulcatus*, der *gerändelte und gefurchte Halsſchild.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 367. No. 16. Le *Staphylin noir à corcelet ſillonné et borde.*

Niger; *thorace* marginato-ſulcato; *pedibus* rufis.

46. *Flavo-*

46. *Flavo-marginatus*, der *Raubkäfer mit braunen gelbgerändelten Flügeldecken.**)

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 368. No. 19. Le *Staphylin à étuis bordés de jaune.*

Niger; *elytris* fuſcis; *margine* flavo.

47. *Flavo-maculatus*, der *Gelbfleck.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 369. No. 20. Le *Staphylin noir à taches jaunes.*

Niger; *thorace* vtrinque, ſinguloque *elytro*, *macula flava.*

48. *Rubro-thoracicus*, der *Rothſchild.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 370. No. 23. Le *Staphylin noir à corcelet rouge.*

Atro-coeruleſcens; *thorace* rubro.

49. *Subclavatus*, die *Halbkeule.*

Geoffr. Inſ. Tom. I. p. 371. No. 25. Le *Staphylin à antennes en demi-maſſues.*

Antennis ſubclavatis.

50. *Pubeſcens*, der *Bär.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. p. 17. No. 2. *Staphylin velouté arrondi.*

Villoſus, nigro-fuſcus; *maculis* nigris viridi griſeisque nitidis, *corpore* ſubtus argenteo; *abdominis* apice ſubrotundato.

51. *Aeneo-cephalus*, der *Raubkäfer mit erzfarbigem Kopfe.*

de *Geer* Inſ. Tom. IV. pag. 22. No. 8. *Staphylin à corcelet bronzé.*

Obſcure fuſcus; *capite thoraceque* aeneis nitidis; *tibiis pedibusque* rufo-fuſcis.

*) Iſt ungleich gröſser, als *Flaveſcens* LINN. No. 13.

218. GESCHLECHT. Forficula; *Oehrling; Ohrwurm.**)

Müllers L. N. S. 5. Th. 1. B. S. 396. *Ohrwürmer.*
Börners Samml. etc. I. p. 479. *Ohrwurm, Oehrling.*
Beckmanns Anfangsgr. der N. H. pag. 99. gen. 23. *Zangenkäfer* oder *Ohrwurm.*
Eberhards Thiergesch. pag. 204. §. 232. der *Ohrkäfer.*
Sulzers Kennz. S. 88. *Ohrwurm.*
— — Gesch. p. 69. *Zangenkäfer.*
Füeßlins Verz. schweiz. Ins. p. 21. *Zangenkäfer.*
Pontopp. N. G. v. D. p. 212. XXIII. *Forficula.*
Bonnets und anderer etc. S. 156. 547.
Lesters Theol. der Ins. p. 178. x. *Ohrellen;* p. 69. z. Forficulae; Forbicinae; Auriculariae; Velliculae. *Gall.* Aureilliers; Perce-oreilles; *Ohrwurm;* p. 265. m. *Ohrellen;* p. 373. *Ohrellen.*
Berlin. Samml. 8. B. p. 342.

Hamb.

*) Bey den Alten hiefs dies Insekt *Forficula; Forbicina; Forcipula; Mordella; Vellicula.* *Jonston* frägt: An haec Graecorum *Orsodacna?*

Ihre Naturgeschichte ist bekannt. Sie legen ihre Eyer in die Erde, in Mist, unter Baumrinde u. s. w. Die herauskommende Larve ist anfänglich ganz weifs, sieht schon eben so aus, wie der grofse Ohrwurm, hat aber *keine Flügel*, die sie erst nach überstandnen Häutungen bekömmt. Gefährliche Feinde der Blumen; besonders der Nelken, und der reifen Obstfrüchte. Sie sind erstaunlich gefräfsig, und man hat Beyspiele, dafs sich einer seinen eignen Unterleib abgefressen hat. Ihre *Flügel* sind überaus *künstlich* gefaltet. S. *Swammerd.* B. d. N. p. 110. *Bonnets* und anderer etc. Abhandl. aus der Insektol. Anh. p. 547.

Der *Wasserohrwurm* des *Jonstons*, oder der *Wasserflob* des *Mouffets* ist sicher die *Nymphe* der *Libelle*, oder des *Schillebolds*, S. *Swammerd.* B. d. N. p. 90.

Hamb. Magaz. XII. p. 90-92.

Swammerd. B. der N. p. 93. 110. *Ohrwurm.*

Onomat. hist. nat. P. II. p. 86. *Auricularia; Vermis auricularis;* der *Ohrwurm; Ohrengrübler.*

— — — P. III. p. 911. das *Ohrenwieselchen.*

Koelr. Diss. de Inf. coleopt. p. 38.

Act. Nidr. III. p. 364.

Bomar. Dict. des Anim. VIII. pag. 334. *Forbicin; Perce-oreille.*

Charlet. Onom. 48. 50. *Vellicula; Earwigg.*

Gazett. salut. 1775. No. 4. p. 30.

Catholicon A. p. 663. *Auricularia;* der *Ohrenwurm; Ohrenhöler;* der *Ohrbohrer.* F. p. 263. *Forficula; Perce-oreille;* der *Zangenkäfer; Ohrwurm; Ohrenhüller; Oehrling.*

Schwenkfeld Theriotr. Silef. p. 536. *Fullo; Forbicina* Vl. Aldrov. *Vermis auricularis;* Ein *Ohrling; Oehrlin; Ohrwürmle.*

Ionston hist. nat. Inf. p. 112. de *Forficula.*

Latin. recentior. *Auricularia;* Priscis *Mordella; Vellicula.*

Gall. Aureillier; Perce-oreille.

German. Ohrenwurm.

Belgis Orenvuetel.

Angl. Eaarewig.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 234.

Müllleri Faun. Fridr. p. 24.

— — Zool. Dan. Prodr. p. 96.

Scop. Entom. carn. p. 103.

Fabric. S. E. pag. 269. II. *Vlonata.* gen. 84. *Forficula.*

Geoffr. Inf. T. I. p. 374. *Forficula;* la *Perce-oreille.*

de *Geer* Inf. Tom. III. p. 543. Des *Perce-oreilles.*

Commentar. Lipf. Dec. I. Vol. IV. 108. V. 608.

Brunnichii Entom. p. 57. Dan. *Oretvift.*

1. *Auricularia*, der *große Ohrwurm.*

Müller l. c. S. 396. t. 8. f. 9.
Füeßlins Verz. S. 21. No. 419.
Sulzers Gesch. pag. 70. t. 7. f. 17. der *große Ohrwurm.*
Schaeff. Elem. t. 63. *Ohrkäfer.*
— — Icon. t. 144. f. 3. 4.
Frisch Inf. VIII. p. 31. t. 15. f. 1. 2. vom *Ohrwurm.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. No. 860.
Suecis: Twestiert, Oernmalk.
Act. Vpsal. 1736. p. 15. No. 4. et 6. *Forficula* mollis cinerea, cauda forcipata (*Larva*).
Catholicon F. pag. 263. No. 1. *Holl.* Oorkruiper; Oorworm.
Pontopp. N. G. v. D. p. 212. No. 1. Auricularia: Oeretvist; Oereorm; in *Jütl.* Quinkelstiert: *Ohrwurm*; *Ohrhöllen.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 24. No. 231.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1088.
FORFICVLA *major*, ferruginea, *elytris* testaceis; macula *alarum* alba. *Dan.* Oretvist.
Forcipes ferruginei: in *mare dentati;* in *foemina* minores et *absque dentibus.*
Act. Nidr. III. 30. *Uebers.* p. 364.
Fabric. S. E. p. 269. No. 1.
Elytris apice albis; *antennis* 14 articulatis.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 375. No. 1. t. 7. f. 3. Le *grand perce-oreille.*
Antennarum articulis 14.
de *Geer* Inf. Tom. III. pag. 545. No. 1. t. 25. f. 16. *Grand perce-oreille.*
FORFICVLA (*major*) fusca; *pedibus* testaceis; *antennis* articulis 14.

2. *Minor,*

2. *Minor*, der *kleinere Ohrwurm.*

Müller l. c. S. 398. No. 2.
Füeßlins Verz. S. 21. No. 419.
Fabric. S. E. p. 269. No. 2.
Elytris testaceis, immaculatis, *antennis* 10 articulatis.
Mülleri Faun. Fridr. p. 24. No. 232.
— — Zool. Dan. Prodr. p. 96. No. 1089.
Schaeff. Icon. t. 41. f. 12. 13.
Geoffr. Inf. Tom. I. p. 376. No. 2. Le *petit perce-oreille.*
Antennarum articulis *vndecim.*
Catholicon F. p. 264. der *kleinere Zangenkäfer.*
de *Geer* Inf. Tom. III. p. 553. No. 2. t. 25. f. 26. 27. *Petit perce-oreille.*
FORFICVLA (*minor*), fusca; capite, *thoraceque* nigris; *pedibus* flavis; *antennis* articulis vndecim.

Neue Oehrlingsarten.

1. *Riparia*, der *Strandöhrling.*

Pallas Reis. II. App. No. 75.
Auricularia duplo major; pallide grisea, molliuscula. *Thorax* marginatus; *forfices* rectiusculi, subulati, *dente vnico* circa medium.
In ripis arenosis ad *Irtin.*
Müllers Suppl. B. p. 262. t. 3. der *Uferohrwurm.*

2. *Flexuosa*, der *kayennische Oehrling mit gebogenen Zangen.*

Fabric. S. E. p. 269. No. 3.
Forcipe flexuosa; *elytris* punctis duobus flavis.
Magnitud. Auricul.

3. *Den-*

3. *Dentata*, der *maderiſche Oehrling mit unten gezähnelten Zangen.*

Fabric. S. E. p. 270. No. 4.

Magnitudo *Auricullariae.* *Antennis* decem articulatis; fuſca; *thoracis* marginibus *pedibusque* pallidis; *forcipe baſi dentata.*

4. *Parallela*, der *maderiſche geradzangigte Oehrling.*

Fabric. S. E. p. 270. No. 5.

Minor praecedente; nigra; *thoracis* marginibus; *elytris pedibusque* pallidis, *forcipe recta* inermi.

5. *Morio*, der *otaheitiſche ſchwarze Oehrling.*

Fabric. S. E. p. 270. No. 6.

Atra; *antennis* faſcia alba; *Magna.* *Antennae* longae, 18 articulatae.

6. *Pallipes*, der *blaßfüßige Oehrling auf den Inſeln des grünen Vorgebürges.*

Fabric. S. E. p. 270. No. 7.

Magna; forcipe elongata, vnidenta, nigra; *pedibus* albis.

Bayerische Staatsbibliothek München

1000.–
Okt. 84

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Goeze, Johann August Ephraim,

Entomologische Beyträge Zu Des Ritter Linné Zwölften Ausgabe Des Natursystems

Bd.: Erster Theil

Leipzig 1777

Zool. 212-1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307320-5
VD18 80328806